

О. Мавланов

БИОЛОГИЯ (ЗООЛОГИЯ)

Жалпы орто билим берүүчү мектептердин
7-классы үчүн окуу китеbi

Кайра иштөлгөн жана толукталган
төртүнчү басылышы

*Өзбекстан Республикасынын Элге билим берүү
министрлиги тарабынан бекитилген*

«O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi»
Мамлекеттик илимий басма үйү

Ташкент–2017

УЎК:59=811.512.154

КВК 28.6ya72

Жооптуу редактору:

Азимов Д. А. – *ӨзР ИА академиги, биология илимдеринин доктору, профессор.*

Рецензенттер:

Халматов В. Р. – *ӨзР өсүмдүктөр жана жаныбардар дүйнөсүр генофонду институтунун ага илимий кызметкери, биология илимдеринин кандидаты;*

Азимов И. Т. – *Низами атындагы ТМПУ «Биологияны окутуу методикасы» кафедрасынын улук окутуучусу;*

Хайтбаева С. Р. – *Ташкент шаары Чиланзар районундагы 178-мектептин жогорку категориялуу биология мугалими;*

Икрамов О. – *Ташкент шаары Шайхантахур районундагы 102-мектептин биология мугалими.*

Кылмабаттуу окуучу!

Сен Өбекстаныбыздын көрөгөч көзү, жаркыраган келечегисиң. Биология сени түркүн-түмөн жаныбарлар дүйнөсүнө алып кирет. Ал сага жаныбарлардын түзүлүшү жана жашоосу жөнүндө билим берет. Сени активдүү билим алууга жана өз алдынча ой жүгүрттүүгө үйрөтөт. Сен аны күнт коюп окусаң, жаныбарлардын жашоо-тиричилиги жөнүндө көптөгөн нерселерди билүп аласың. Билгендерин болсо сага келечекте кесип тандоодо жардам берет. Өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүн мыкты билген адам аны сүйөт жана аздектейт.

Илимдин чокуларын карай тарткан сапарың байсалдуу болсун!

Автор

Шарттуу белгилер:



– *билимиңди
сынап көр;*



– *ыраастоочу жоопторду
аныкта;*



– *жуптап
жаз;*



– *суроого жооп тап,
табышмакты тап.*

**Респубикалык максаттуу китең фондунун каражаттары эсебинен
басылды.**

© Мавланов, 2005, 2017.

© «O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi»

Мамлекеттик илимий басма үйү, 2005, 2013.

ISBN 978-9943-07-223-7

АЛГЫ СӨЗ

Өлкөбүздүн жаратылышы абдан кооз, анын жаныбарлар дүйнөсү болсо түркүн-түмөн. Жаныбарларды адам баласынын арышы жеткен бардық жерлерден: гүлдөп-жайнаган өрөөндөрдөн тарта, ак карлуу бийик чокулардан, көк мелжиген имараттар катарлашып, жашоотиричилек кайнап турган шаарлардан, ошондой эле тирилик жоктой көрүнгөн от күйкалаган күмдүү чөлдөрдөн кездештируүгө болот.

Мамлекетибиздин дарыялары менен көлдөрүндө балыктын 70 ке жакын түрү, бир клеткалуулардан баштап курт-кумурскаларга чейин болгон түркүн-түркүн топторду өз ичине алган омурткасыз жаныбарлардын миндеген түрлөрү кездешет. Чексиз чөлдөрүндө, дарыя өрөөндөрүндө, улуу тоо кыркалары менен оазистеринде сойлоп жүрүүчүлөрдүн 60 ка жакын, сүт эмүүчүлөрдүн 100 гө жакын, канаттуулардын 400 дөн ашуун түрү, 11 000 түрдөн ашуун курт-кумурскалар, жүздөгөн жөргөмүш сымалдар жана башка жаныбарлар кенири тараалган.

Мекенибиздин жаныбарлар дүйнөсү байыртадан калыптанып келген. Жаныбарлардын бир канча түрлөрү баштап ушул өлкөдө пайда болгон; башка түрлөрү кошуна аймактардан келип калган. Арап осетр балыгы, жалган күрөк түмшук балык, түркстан агамасы, түркстан геккону, кум оролмо жыланы (удав), ичке манжалуу талаа чыгканы, көк суур жана башка көптөгөн түрлөр Өзбекстандын аймагында тараалган болуп, башка өлкөлөрдө дээрлик кездешпейт.

Өлкөбүздө жаныбарларды коргоого, жоголуп бара жаткан түрлөрдү сактап калууга жана өрчүтүүга өзгөчө көнүл бурулууда. Бул маанилүү иш Өзбекстан Республикасынын Конституциясында да чагылдырылган. Бирок өкмөтүбүз тарабынан гана ишке ашырылып жаткан иш-аракеттердин өзү жаныбарлар дүйнөсүн коргоо үчүн жетиштүү эмес. Бул аракетке жалпы элдин көнүлүн буруу керек. Ал үчүн ар бир окуучу өз мекенинин табигый байлыктарынын бири болгон жаныбарлар дүйнөсүн асырап-абайлоого, коргоо боюнча иш-чараларды мыкты билүүгө жана аларга сөзсүз баш ийүүгө тишиш.

Окуу китебинде негизги түшүнүктөр жана терминдер курсив аркылуу ажыратып көрсөтүлгөн. Параграфтардын аягында билимди текшерүү үчүн суроолор, өз алдынча аткаруу үчүн тапшырмалар берилген.



ЖАНЫБАРЛАР ЖӨНҮНДӨ ЖАЛПЫ МААЛЫМАТ

Главаны окуп, жаныбарлардын түзүлүшү, жашоо өзгөчөлүктөрү, жаратылыши жана адамдын турмушундагы мааниси, аларды классификациялоо жөнүндө түшүнүккө ээ болууң керек.

1-§

Зоология предмети жана анын милдеттери

Зоология – жаныбарларды үйрөнүүчү илим. Зоология (*zoop* – жаныбар, *logos* – илим) – жаныбарлардын түзүлүшүн, жашоосун, көбөйүшүн жана өрчүшүн үйрөнөт. Алардын түрлөрүн жана таралышын; жаратылыш жана адамдын турмушундагы маанисин, келип чыгышын үйрөнүү зоологиянын милдетине кирет.

Зоология бир топ илимдерден куралган. Алардан кээ бирлери жаныбарлардын түзүлүшүн, көбөйүшүн жана өрчүшүн, жердин бетинде таралышын, башкалары – өз алдынча топторун үйрөнөт.

Зоология – эң байыркы илим. Зоология боюнча эң алгачкы илимий чыгармаларды эрабыздан IV кылым мурда Аристотель жазган. Аларда 500 гө жакын жаныбарларга мүнөздөмө берилген. 16–17-кылымдарда жашаган голландиялык Антон Левенгук микроскоптук жаныбарларды ачкан. Швед окумуштуусу Карл Линней 18-кылымда жаныбарларды түр, уруу, түркүм, класстарга бөлүп үйрөнүүн сунуштаган. Ч. Дарвин 19-кылымдын ортолорунда жаныбарларды үйрөнүү аркылуу өзүнүн дүйнөлүк мааниге ээ эволюциялык окуусун жаратты. Зоология медицина, мал чарбасы жана эл чарбасынын башка тармактары менен тыгыз байланышта.

Зоологиянын өнүгүшүнө Өзбекстандык окумуштуулар да чоң салым кошушкан. Д. Н. Кашкаров биринчилерден болуп жаныбарлардын экологиясын үйрөнүүнү баштап берди. Л. М. Исаев менен П. Ф. Боровскийлердин изилдөөлөрү Орто Азияда ришта, безек, лейшмания сыйктуу кооптуу мите жаныбарларынын түгөтүлүшүнө негиз болду. Т. З. Захидов, О. П. Богданов жана башка окумуштуулар омурткалуу жаныбарларды; А. М. Мухаммадиев, В.


В. Яхонтов, А. Т. Тулаганов, Ж. А. Азимов, М. А. Султанов жана С. Н. Алимухамедовдор омурткасыз жаныбарларды үйрөнүшкөн.

Жаныбарлардың көп түрдүүлүгү, жашаган чөйрөсү. Жер жүзүндө жаныбарлардын 2,5 млн го жакын түрү тараган. Кургактык, аба, топурак, суу көлмөлөрү жаныбарлар үчүн негизги жашоо чөйрөсү саналат. Мите жаныбарлар үчүн адам, жаныбар же өсүмдүктүн организми жашоо чөйрөсү болот. Жаныбарлардын түзүлүшү, жашоо өзгөчөлүктөрү белгилүү чөйрөгө ынгайлашкан болот. Мисалы, суу жаныбарларынын көөдөнү сүйрү формада, буттары калактарга айланган. Кургакта жашаган жаныбарлардын денелери жалпак, буттары жакшы өрчүгөн болот. Жашоо чөйрөсүнүн курамдык бөлүктөрүн түзгөн нымдуулукка, температурага, жарыкка жана башкаларга экологиялык факторлор дейилет.

Жаныбарлардын дene өлчөмдөрү түрдүүчө болот (1-сүрөт). Салмагы 150 тоннага жеткен гигант киттерден тартып, микроскоптон гана көрүнгөн, узундугу миллиметрдин ондон бир, атүгүл жүздөн бир үлүшүнө барабар түрлөрү да бар.

Жаныбарлардын мааниси. Жаныбарлар жаратылышта жана адамдын турмушунда чоң мааниге ээ. Көптөгөн жаныбарлар жашыл өсүмдүктөр менен азыктанат. Аларга чөп жечү жаныбарлар дейилет. Башка жаныбарларды жеген жаныбарлар жырткыч, адамдын, башка жаныбардын жана өсүмдүктүн ткандарында жашаган жаныбарлар болсо мите эсептелет.

Чөп жечү жаныбарлар өсүмдүк жана алардын калдыктарын майдалап, чиришин тездетет. Алардын ишкердиги натыйжасында өсүмдүк үчүн зарыл минералдык заттар чогулат; топурактын



түшүмдүүлүгү жогорулайт. Алардын арасында жаныбарлардын тарптарын жана таштандыларды, органикалык калдыктар менен микроорганизмдерди суудан фильтрлеп азыктанган түрлөрү көп кездешет. Мындай жаныбарларга *табигый санитарлар* дейилет.

Үй жаныбарлары эт жана сүт берип гана калbastan, өнөр жай үчүн тери, жибек жана башка продуктуларды берет. Бал аарылар, көпөлөктөр өсүмдүктөрдү чандатып, алардын түшүмдүүлүгүн жогорулатууга жардам берет. Курт-кумурска жечү жана жырткыч жаныбарлар: күштар, жарганаттар, бакалар, таш бакалар токой жана айыл чарба зиянкечтерин кырып, пайда келтиришет.

Алардын арасынан адамдарга, мал чарбачылыгына жана өсүмдүктөргө зиян келтирген түрлөрү да кездешет. Кан соргуч курт-кумурскалар жана кенелер мителик кылуу менен бирге, өлөт, келте жана безгек ооруларын таратат. Ибн Сина өзүнүн “Медицинанын канондору” аттуу чыгармасында оору пайда кылган жаныбарлардан сактануу жөнүндө жазып калтырган.

Жаныбарларды коргоо. Адамзат байыртадан жапайы жаныбарларга аң уулаган; териси жана башка продуктуларынан пайдаланган; аларды колго үйрөткөн; алардан үй сакчысы жана жумушчу күчү иретинде пайдаланган. Калк санынын көбөйүшү, аң куралдарынын өркүндөтүлүшү жана жаныбарлар үчүн зарыл табигый шарттын бузулушу натыйжасында европа туру (бодо малдардын тукум башаты), тарпан (жылкылардын тукум башаты), Стеллеров малы (дениз жаныбары) сыйктуулар жоголуп кетти; Пржевальский жылкысы, зубр, бизон, сайгак, хангүл сыйктуу жаныбарлар үчүн кырылып кетүү коопу туулду. Мындай жагдай жаныбарларды, алар жашаган чөйрөнү коргоого алууну талап кылат.

Республикасыздын аймагында сейрек кездешүүчү жана аз сандуу жаныбарларды асырап калуу жана көбөйтүү максатында Бадайтоказы, Кызыл кум, Зарафшан, Сурхан жана Гисар мамлекеттик коруктартары, Чаткал биосфералык коругу, бир топ улуттук парктар жана заказнектер түзүлгөн. Өзбекстан Республикасы Кызыл китебинин акыркы 2009-жылкы басылымына сейрек кездешүүчү жана саны азайып бара жаткан жаныбарлардын 184 түрү киргизилген.



1. Зоологияда К. Линнейдин кандай кызматтары бар?
2. Жашоо чөйрөсүн жана анын факторлорун эмнелер түзөт?
3. Азыктануу боюнча жаныбарлар кандай топторго бөлүнөт?
4. Кандай жаныбарларга табигый санитарлар дейилет?

2-§. Жаныбарлар организминин түзүлүшү, алардын классификациялоо

7

5. Кандай жаныбарларга жырткыч дейиilet?
6. Кандай жаныбарларга мите дейиilet?
7. Жаныбарлардын азайып барышынын себептери эмнеде?



1. К. Линней:
 - а) эволюциялык окууну жаратты;
 - б) түр, уруу, түркүм жана класстарды сунуш кылган;
 - в) жаныбарлардын эмбриондук өрчүшүн үйрөнгөн.

2. Т. З. Захидов жана О. П. Богдановдор:
 - а) омурткалуу жаныбарларды үйрөнүшкөн;
 - б) жаныбарлар экологиясын үйрөнүүнү баштап беришкен;
 - в) омурткасыз жаныбарларды үйрөнүшкөн.

Жаныбарлардын топторун жана өзгөчөлүктөрүн жуптап жаз.

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| а) табигый санитарлар; | 1) оору жуктурушат; |
| б) кан соргучтар; | 2) калдыктар менен азыктанат; |
| д) аарылар, көпөлөктөр. | 3) гүлдөрдү чандатышат. |

***Сөздүк дептеринде жазып ал.***

Жашоо чөйрөсү, экологиялык фактор, чөп жечү, жырткыч, мите, табигый санитарлар, корук, улуттук парк, «Кызыл китең».

Туура жооптор: 1б, 2а.

Жуптап жазуунун жооптору: а-2, б-1, д-3.

2-§

Жаныбарлар организминин түзүлүшү, аларды классификациялоо

Жаныбарлардын өсүмдүктөргө окшоштугу, алардан айырмасы. Жаныбарлардын организми да өсүмдүктөр сыйктуу клеткалардан түзүлгөн. Клеткалар клетка мембранасынан (кабыгы), анын ичиндеги цитоплазмада жайлашкан вакуолдордон, башка органоиддерден жана ядродон турат. Жаныбарлар менен өсүмдүктөр клеткаларынын химиялык курамы да окшош келет. Ошону менен бирге жаныбарлардын клеткасы кабыгынын жука болушу, жашыл түс берген хлоропласттардын болбостугу менен өсүмдүктөрдөн айырмаланат. Жаныбарлар фотосинтез кыла алышпайт; өсүмдүктөр пайда кылган органикалык заттар менен азыктанышат. Бирок бир клеткалуу жаныбарлардын арасында өсүмдүктөр сыйктуу фотосинтез кылуу касиетине ээ болгон түрлөрү да бар.


Көптөгөн жаныбарлардын атайын кыймыл органдары болот, бирок отурак жашаган жана мите жаныбарлар аракеттенбейт. Өсүмдүктөрдүн ичинен хламидоманаданын шапалакчаларынын жардамында активдүү аракеттенгенин билесин.

Ткандар жана органдар. Көп клеткалуу жаныбарлардын организми түрдүү милдеттерди аткарған клеткалардан турат. Клеткалар тоголок, куб сымал, ийик сымал, жылдыз сымал, кирпиктүү жана башка формаларда болушу мүмкүн (2-сүрөт). Бири-бирине окшош түзүлгөн жана бирдей милдетти аткарған клеткалар ткандарды, ткандар болсо органдарды түзөт. Бир клеткалуу жана төмөн түзүлүштөгү көп клеткалуу жаныбарлардын организминде ткандар менен органдары өрчүбөгөн.

Жаныбардын организми эпителий, бириктириүүчү, булчун жана нерв ткандарынан түзүлгөн. Эпителий жыш жайлашкан жалпак куб сымал же цилиндр сымал клеткалардан турат. Эпителий организмди жагымсыз шарттардан сактайт жана анын иш-аракетин башкарған заттарды иштеп чыгарат. Теринин сырты жана ичегинин ички бети эпителий менен капиталган.

Бириктириүүчү ткань өз алдынча турган клеткалар менен органдардын ортосун толтуруп турат. Анын суюк (кан), тыгыз (сөөк, кемирчек), көндөйлүү (паренхима) түрлөрү бар. Ал органдарды өзара байланыштыруу (байламта), кычкылтекти жана азық заттарды ташшуу (кан), запас азық заттарды чогултуу (паренхима), таяныч (сөөк, кемирчек) милдеттерин аткарат.

Булчун тканы жыйрылуу касиетине ээ булчун түйүндөрүнөн түзүлгөн. Булчундар аракеттенүү милдетин аткарат.



2 сүрөт. Жаныбарлардын клеткасы:

- 1 – нерв клеткасы;
- 2, 3, 4 – эпителий клеткалары;
- 5 – бириктириүүчү ткандын клеткалары;
- 6 – жумуртка клеткасы;
- 7 – булчун клеткасы.

Нерв тканы жылдыз сымал нерв клеткаларынан жана алардын арасындаги аралык заттан турат. Баш мээ, жүлүн жана алардан келген нерв түйүндөрү нерв тканы болуп эсептелет. Нерв ткандары тышкы чөйрөдөн жана ички органдардан келген таасирди кабыл алуу, еткөрүү жана аларга жооп берүү милдетин аткарат.

Органдар жана органдар системасы. Организмде ткандар органдарды түзөт. Ар бир орган бир неча түрдүү ткандардан турат, бирок бирдей милдетти аткарууга ылайыкташкан болот. Мисалы, ичеги бириктируүчүү, нерв, булчун жана эпителий ткандарынан түзүлгөн болуп, тамак синириүү милдетин аткарат. Организмде өз ара байланышкан жана окшош милдеттерди аткарған органдар биргеликте органдар системасын түзүшөт. Мисалы: ооз көндөйү, кулкун, кызыл өнгөч, карын жана ичеги биргеликте тамак синириүү системасын түзөт. Жаныбарлардын организминде тамак синириүү, аракеттенүү, бөлүп чыгаруу, дем алуу, жыныстык, нерв, сезим-туюм органдары системалары бар.

Жаныбарлардын классификациясы. Өз ара окшоштугуна жана текстештиги боюнча жаныбарлар бир нече системалык топторго ажыратылат. Жаныбарларды мындаи бөлүштүрүүгө *классификациялоо* дейилет. Аларда да өсүмдүктөр сыйктуу эң кичине системалык бирдик *түр* саналат. Бир түргө таандык жаныбарлардын түзүлүшү жашоо шарттары да окшош болот.

Өз ара жакын түрлөр урууларга, уруулар *тукумдарга*, тукумдар *туркүмдөргө*, *туркүмдөр класстарга*, класстар болсо *тинтерге* бириктирилет. Бардык типтер биргеликте *жаныбарлар* дүйнөсүн түзүшөт. Мындан тышкary жаныбарлар дүйнөсү клеткалык түзүлүшү боюнча бир клеткалууларга жана көп клеткалууларга; омуртка сөөгүнүн өрчүгөндүгүнө карай омурткасыздарга жана омурткалуулар (хордалуулар)га бөлүнөт. Омурткасыздар 20 дан көп, омурткалуулар болсо бир гана типтен турушат.

Дене температурасынын кандай болушуна карай бардык жаныбарлар жылуу жана муздак кандууларга бөлүнөт. Муздак кандуулардын дене температурасы тышкы чөйрө температурасынын таасиринде өзгөрүп турат. Аларга бардык омурткасыз жаныбарлар жана хордалуулар тибинен балыктар, жерде-сууда жашоочулар, ошондой эле сойлоп жүрүүчүлөр класстары кирет. Жылуу кандуулардын дене температурасы түрүктүү болот, башкача айтканда тышкы чөйрөнүн таасиринен көз каранды болбойт. Аларга

хордалуулар тибинин канаттуулар жана сүт эмүүчүлөр класстары кирет.

Системалык топтор латин тилинде аталат. Түрлөр эки атальш (уруунун жана түрдүн аттары), түрдөн жогору болгон топтор бир гана атальш менен аталат. Жаныбарларды классификациялоо менен систематика илими алектенет.



1. Жаныбарлар жана өсүмдүктөрдүн кандай окшоштуктары бар?
2. Жаныбардын организми кандай тканадардан турат?
3. Эпителий тканы кандай клеткалардан турат?
4. Бириктириүүчү тканын кандай түрлөрү бар?
5. Булчун тканы кандайча түзүлгөн?
6. Нерв тканы кандайча түзүлгөн?
7. Жаныбардын организминде кандай органдар системасы бар?



1. Түзүлүшү, аткарған милдети бирдей болгон клеткалар:

 - a) органдарды; б) тканадарды; в) органдар системасын түзөт.

2. Жаныбарлар дүйнөсүндөгү эң жогорку системалык топ—бул:

 - a) түр; б) түркүм; в) тип; г) класс.

3. Эки латинче атальш менен аталған топ:

 - a) түр; б) уруу; в) тип; г) тукум.



- Тканадарды алар аткарған милдеттери менен бирге жуптап жаз.
- | | |
|-------------------|-------------------------|
| а) эпителий; | 1) азық заттарды ташуу; |
| б) булчун; | 2) таасирди кабыл алуу; |
| в) бириктириүүчү; | 3) коргоо; |
| г) нерв. | 4) кыймылга келтирүү. |

Эң кичинесинен баштап тартиби менен көрсөт.

- а) түркүм; б) тукум; в) тип; г) түр; д) класс; е) уруу.

Сөздүк дептериңе жазып ал.

Клетка мембранны, органдар, эпителий, органдар системасы, бириктириүүчү ткань, классификация, булчун тканы, омурткалуулар, нерв тканы, омурткасыздар.

Туура жооптор: 1б, 2в, 3а.

Жуптап жазуунун жооптору: а-3, б-4, в-1, г-2.

Тартипти билдирген жооптор: 1г, 2е, 3б, 4а, 5д, 6в.

**II
ГЛАВА**

БИР КЛЕТКАЛУУЛАР, ЖЕ ЭҢ ЖӨНӨКӨЙ ЖАНЫБАРЛАР


Бир клеткалуулардын денеси өз алдынча жашоо касиетине ээ бир клеткадан турат. Алардын клеткасында бөлүп чыгаруу жана сицируү вакуолалары, кыймыл органоиддери, ядросу болот.

3-§


Жалган буттуулар классы

Жалган буттуулар – эң жөнөкөй түзүлгөн бир клеткалуулар. Кадимки амёба алардын тирүү өкүлүү саналат.

Жашоо чөйрөлөрү жана түзүлүшү. Амёба төгүлгөн жалбырактар жана чөп-чарлар менен булганган көлмөлөрдө суунун түбүндө жашайт. Денесинин чондугу 0,2–0,5 мм, түссүз болот. Амёбанын клеткасынын формасы ар дайым өзгөрүп турат. Башка клеткалар сыйктуу амёбанын денеси да коюу килкилдек заттан, б. а. цитоплазмадан турат. Цитоплазмада бир ядро жана клетканын органоиддери жайлышкан (3, 4-сүрөттөр). *Клетканын мембранны* цитоплазманы тышкы чөйрөдөн ажыратып турат.



3-сүрөт. Кадимки амёбанын микроскоптон көрүнүшү.



4-сүрөт. Кадимки амёбанын түзүлүшү:
1 – жалган бутчалар; 2 – цитоплазма; 3 – таамак сицируүчү вакуоль; 4 – ядро; 5 – жыйы-луучу вакуоль; 6 – курчап алынган азык.


Аракеттениши. Амёбанын клеткасынын сыртында калың катуу кабык болбогондуктан цитоплазмасы кайсы жакка агып өтсө, денесинин ошол жагы түртүп чыгып, «жалган бут» деп аталган өсүндүн пайда кылат. Амёбанын кыймылын бир тамчы суунун агышына окшотууга болот. Жалган буттар тынымсыз пайда болуп жана жоголуп тургандыктан амёбанын денесинин формасы да өзгөрүп турат.

Тамактанышы. Амёба бактерия, майда балыр жана органикалык калдыктар менен азыктанат. Кыймылдагы амёбада азыкка туш келгенде бир нече жалган буттар пайда болот. Алар азыкты курчап алып, аны цитоплазмага өткөрөт. Цитоплазмадан сицируү зили ажырашы менен азыктын айланасында кичинекей ыйлаакча – тамак сицируү вакуолу пайда болот. Тамак сицируүчү зилдин таасиринде азык заттар сицирилет. Азыктын сиңбеген бөлүгү цитоплазмадан тышка чыгарып жиберилет.

Дем альши. Амёба сууда эриген кычкылтек менен дем алат. Анын цитоплазмасына кычкылтек суу менен кошо тынымсыз өтүп турат. Кычкылтектин жардамында цитоплазмадагы азык заттар бөлүнүп, амёбанын жашоосу үчүн зарыл энергия жана зат алмашуунун зыяндуу продуктулары пайда болот. Цитоплазмадагы суунун ашыкча бөлүгү зыяндуу продуктулар менен бирге *жыйрылуучу вакуолдун* көндөйүнө өтөт. Вакуоль жыйрылганда анын ичиндеги суюктук клетканан чыгарып жиберилет. Мына ушундай жол менен амёбанын организми менен тышкы чөйрөнүн ортосунда зат алмашуу процесси жүрүп турат.

Дүүлүгүшү. Жөнөкөй түзүлгөн болсо да амёба жаныбарлардын организмине мунөздүү касиеттерге ээ. Кээ бир таасирлердин жардамында амёбанын денесинин формасы өзгөргөндүгүн көрүүгө болот. Эгерде амёбалуу сууга азыраак аш тузу кошулса, ал бардык жалган буттарын тартып алып, шар сымал формага кирет. Бул кубулуш амёбанын дүүлүгүшүн көрсөтөт.

Көбөйүшү. Амёба экиге бөлүнүү жолу менен жыныссыз көбөйөт (5-сүрөт). Ал үчүн ядронун көлөмү чоююп барып, кабыгы жемирилет. Цитоплазмага чыккан ядронун заттары эки жакка тен бөлүнөт. Заматта клетканын эки жагында бирден ядро пайда болот. Амёбанын денеси да чоюлуп, ортосунан ичкерет жана экиге ажырайт. Мына ушундай жол менен бир амёбадан эки жаңы амёба пайда болот. Мындай көбөйүү

**5-сүрөт. Амёбанын болунуп көбөйшү:**

1 – бөлүнө баштаган клетка; 2, 3, 4 – клетканын жана анын ядросунун экиге бөлүнүшү; 5 – пайда болгон эки жаңы клетка.

учурунда жыныстык клеткалар катышпагандыктан жыныссыз көбөйүү деп аталаат.

Циста пайда кылуу. Суук түшкөндө же суу кургап калганда амёба кыймылдан токтоп, тоголоктонот; анын клеткасынын сыртында калың кабык – циста пайда болот. Амёба цистанын ичинде ыңгайсыз шарттын таасиринен сактанат. Ыңгайлуу шарт түзүлгөндө амёба цистадан чыгып, жашоо тиричилигин улантат.

Жалган буттуулардын көп түрдүүлүгү. Дениздерде аkitаш раковиналуу жалган буттуулардан фораминиферлер, кремний (кум) скелеттүү нурлуулар көп кездешет. Миллиондогон жылдар мурда жашап, кырылып кеткен фораминиферлер раковиналарынын калдыктары аkitаш кендерин пайда кылган. Нурлуулардын скелет калдыктарынан металлдарды жылмакайлоодо пайдаланылат. Кээ бир жалган буттуулар кооптуу мите саналат. Мисалы, адамдын жана сүт эмүүчүлөрдүн ичегисинде жайлашкан ич өткөк амёбасы ичегини бүлүнтүп, кандуу ич өткөктү пайда кылат.



1. Амёбанын клеткасы кандай түзүлгөн?
2. Амёбанын жалган буттары кандайча пайда болот?
3. Амёба кандайча азыктанат?
4. Жыйрылуучу вакуоль кандай кызмат аткарат?
5. Амёбанын дүүлүгүшү кандайча пайда болот?
6. Амёба кандайча көбөйт?
7. Жалган буттуулар кандай мааниге ээ?
8. Эмне үчүн ашыкча суу чыгарылып турушу керек?



1. Жалган буттуулардын кыймыл органдары:
 - а) цитоплазманын убактылуу ёсундүлөрү;
 - б) клетканын мембранасынан пайда болот;
 - в) жалган буттардан жана кирпикчелерден турат.
2. Амёбанын азыкты курчап ала турган органоиди:
 - а) тамак синириүү вакуолу;
 - б) клетканын мембранасы;
 - в) жалган буттары.



Органоиддерди милдеттери менен жуптап жаз.

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| а) жалган буттар; | 1) ашыкча сууну чыгарат; |
| б) жыйрылуучу вакуоль; | 2) клетканы коргойт; |
| в) тамак синириүүчү вакуоль; | 3) азыкты сицирет; |
| г) клетканын кабыгы. | 4) аракеттенүү. |

Сөздүк дептериңе жазып ал.

Бир клеткалуулар, жалган бут, жалган буттуулар, тамак синириүү вакуолу, жыйрылуучу вакуоль, бөлүп чыгаруу, дем алуу, дүүлүгүү, фораминиферлер, нурлуулар, ич өткөк амёбасы, циста.



Суроого жооп тап. Жыйрылуучу вакуоль жалган буттуулардын клеткасы ичиндеги басымды жөнгө салып турат. Анда эмне себептен мите ич өткөк амёбанын жана дениздерде жашоочу жалган буттуулардын клеткасында жыйрылуучу вакуола жок?

Табышмакта берилген жаныбардын көрүнүшүнө жана кыймылына мүнөздөмө бер.

1. Суу түбүндө бир тамчы,
Кандай тириүү жан – тапчы!
Туура жооптор: 1а, 2в.


Жуптук жооптор: а-4, б-1, в-3, г-2.

4-§

Шапалактуулар классы

Шапалактууларды жашыл эвгленанын мисалында үйрөнөбүз. Алар денеси катуу кабык менен капиталган бир клеткалуу жаныбарлар. **Жашыл эвглена** алардын тириүү өкүлү (6-сүрөт). Алар бир же бир нече шапалакчаларынын жардамында кыймылга келет.

Түзүлүшү жана аракеттениши. Жашыл эвглена чөөт сууларда, суусу агып чыкпаган көлмөлөрдө жашайт. Ал өтө майда,



6-сүрөт. Жашыл эвгленанын түзүлүшү:

1 – чөл кабык; 2 – шапалакча;
3 – цитоплазма; 4 – ядро; 5 –
хроматофоралар; 6 – запас азық
бөлүкчөлөрү; 7 – «көзчө»; 8 – жый-
рылуучу вакуоль; 9 – жыйрылуучу
вакуолдун суюктук жыйноочу көндөйү.


амёбага салыштырмалуу 5–10 эсе кичине жаныбар. Денесинин формасы ийик сымал, алдыңкы жана арткы жактары ичкерген. Шапалагы винтке окшоп буралып, аны алга карай жылдырат. Клеткасы катуу жана серпилмелүү жука кабык менен капталгандыктан туруктуу формага ээ. Цитоплазмасында бир ири ядро, жыйрылуучу вакуоль жана кызыл такка окшош «көзчө» жайгашкан.

Тамактанышы. Цитоплазмасында жашыл денечелер формасындағы хроматофоралар болот. Алардагы хлорофиллдик пигменттин жардамында эвглена фотосинтез жасайт. Жарыктын таасиринде анын хроматофораларында органикалык заттар пайда болот. Бул заттар эвгленанын өсүшү, өрчүшү жана көбөйүшү үчүн сарпталат. Эвглена карангыда жаныбарлар сыйктуу эле даяр органикалык заттар менен тамактанат. Эгерде ал көп убакытка карангы жерде сакталса, хлорофилли бүлгүнгө учурал, клеткасы түссүз абалга келет; анда ал сууда эриген органикалык заттарды денесинин каптоосу аркылуу соруп, тамактана баштайт. Анын фотосинтез жүргүзүү өзгөчөлүгү өсүмдүктөр менен жаныбарлардын бир жалпы тектен келип чыккандыгын көрсөтөт.

Дем алыши жана бөлүп чыгарышы. Эвглена да амёба сыйктуу сууда эриген кычкылtek менен дем алат. Цитоплазмадагы ашыкча суу жана зыяндуу зат алмашуунун продуктулары жыйрылуучу вакуоль аркылуу сыртка чыгарып жиберилет.

Дүүлүгүшү. Эвглена кызыл такка окшогон көзчөсүнүн жардамында жарыкты сезүү касиетине ээ. Ошондуктан ал суунун жарык түшүп турган жагын көздөй жылат.

Көбөйүшү. Амёба сыйктуу экиге бөлүнүү менен жыныссыз көбөйөт (7-сүрөт). Бөлүнүү башталаары менен эски шапалактын




7-сүрөт. Жашыл эвгленаның бөлүнүп көбөйүшү.

жанынан жаңы шапалак пайда болот. Бөлүнүү бүткүл дене боюнча ошол эки шапалактын жана ядронун ортосунан өтөт.

Циста пайда кылуу. Ыңгайсыз шарттар туулганда эвгленанын шапалакчасы түшүп кетет; денеси кыскарып, тоголок тартып, калың кабык менен оролгон цистага айланат.

Вольвокс – колония болуп жашоочу бир клеткаулар жаныбар. Булганыч суулуу көлмө жана көлдөрдө диаметри 1 мм келген жашыл шарга окшош вольвокстор кездешет (8-сүрөт). Вольвокстун колониясы мингэ жакын алмурут сымал эки шапалакчалуу клеткалардан түзүлгөн. Клеткалар шардын сыртында жайлашкан болуп, цитоплазмалык жипчелердин жардамында өз ара байланышкан. Шарчанын ичи коюу килкилдек зат менен толгон.

Айрым шапалактуулар мителик менен күн көрүштөт. *Трипаносома* тропик Африкадагы элдердин кан сары суусунда жашап, уйку оорусун пайда кылат. Лейшмания Өзбекстандын түштүгүндөгү кәэ бир аймактарда жана тропик өлкөлөрдө адамдын терисинде көпкө түзөлбөгөн жараны пайда кылат.



8-сүрөт. Вольвокс:

- 1 – лупа аркылуу көрүнүшү;
- 2 – микроскоптон көрүнүшү;
- 3 – эки клеткасы.



1. Шапалактуулардын түзүлүшү жалган буттуулардан кандай айырмаланат?
2. Эвглена жарыкта кандай тамактанат?
3. Жыйрылуучу вакуоль кандай мааниге ээ?
4. Эвглена кандайча көбейет?
5. Эмне үчүн вольвокс колониялдуу жаныбарларга киргизилет?
6. Трипаносома адамга кандайча жугат?
7. Шапалактуулардын кайсы өзгөчөлүктөрү өсүмдүккө окшойт?



1. Эвгленанын цитоплазмасында:
 - а) жыйрылуучу жана тамак синириүүчү вакуолдору жайлышкан;
 - б) хроматофоралары жана жыйрылуучу вакуолу бар;
 - в) кызыл көзчөсү жана шапалакчалары жайлышкан.
2. Вольвокстун колониясы:
 - а) ийик сымал клеткалардан турат:
 - б) шар сымал клеткалардан турат;
 - в) алмурут сымал клеткалардан турат.



Жаныбардын аты менен өзгөчөлүгүн жуптап жаз.

- | | |
|-----------------|-------------------------------|
| а) лейшмания; | 1) кандын митеси; |
| б) вольвокс; | 2) денеси ийик сымал; |
| в) трипаносома; | 3) териде жараат пайда кылат; |
| г) эвглена. | 4) колония болуп жашайт. |

Сөздүк дептерине жазып ал.

Жашыл эвглена, вольвокс, трипаносома, лейшмания, хроматофора, фотосинтез, колония, хлорофилл, кызыл так көзчө.



Суроого жооп тап. Шапалактуулар – бир же бир нече шапалактын жардамында аракеттенген микроскоптук жаныбарлар. Анда эмне үчүн эвглена денесин бурап, ал эми вольвокс топ сыйктуу тоголонуп аракеттепет?

- Табышмактарда кайсы жаныбарлардын түзүлүшү берилген? Алардын кыймылына мұнәздемө бер.
2. Майсан түстүү, кичине өзү,
Шапалагы бар жана көзү.
 3. Кичине топ, тебе албайсын,
Тоголонот, кармай албайсын.
Туура жооптор: 1б, 2в.


Жуптуктун жооптору: а-3, б-4, в-1, г-2.

5-§

Инфузориялар жана споралуулар классы

Инфузориялардын денеси кирпикчелер менен капталган, чоң жана кичине ядросу болот. Тамак синириүү, бөлүп чыгаруу органиддери башка бир клеткалууларга караганда татаал түзүлгөн. Инфузориялар алгачкы жолу сууланган чөптөн табылган. «Инфузория» латин тилинде «чөптүү тунманын жаныбары» деген маанини билдириет. Аларды туфельканын мисалында үйрөнөбүз.

Жашоо чөйрөсү, түзүлүшү жана аракеттениши. Туфелька өсүмдүктүн калдыктары көп болгон көлмөлөрдө кездешет. Анын узундугу 0,1–0,3 мм болуп, денесинин формасы бут кийимдин (туфлинин) таманына окшойт (9-сүрөт). Ошондуктан бул жаныбар туфелька деп аталат. Денесинин бети өтө көп кирпикчелер менен капталган. Кирпикчелердин термелүүсү натыйжасында туфелька томпок жагы менен алга карай сүзөт.



9-сүрөт. Туфельканын түзүлүшү жана тамактандышы:

- 1 – чел кабыгы; 2 – кирпикчелер; 3 – ооз; 4 – тамак синириүүчү вакуолдору;
- 5 – жыйрылуучу вакуоль; 6 – чыгаруу тешикчеси; 7 – чоң ядро; 8 – кичине ядро; 9 – тамак синириүүчү вакуолдуун калыптандышы; 10 – чалкан денече.

Тамактандышы. Туфелька бактерия менен тамактанат. Денесинин каптал жагында узун түтүк сымал кобулчасы, анын түбүндө «ооз» тешиги бар. Ооз кулкунга ачылат. Кобулчанын айланасындағы кирпикчелердин термелүүсү натыйжасында азық зат кулкундун

түбүнө чогулуп, тамак синириүүчү вакуоль пайда болот. Ал күлкундан ажырап цитоплазмага түшөт. Вакуолдор цитоплазманын агымы менен туфельканын денесин айланып, азық заттарды синирет. Азық заттын калдыктары дененин арткы жагындагы тешикче аркылуу сууга чыгарып жиберилет.

Дем алыши жана бөлүп чыгарышы. Туфельканын эки жыйрылуучу вакуолу алдыңкы жана арткы жактарында жайлашкан. Алар кезек-кезеги менен жыйрылып турат. Ашыкча суу менен зат алмашуунун керексиз заттары цитоплазмадан вакуолдорго чогулат жана алардан сыртка чыгарып жиберилет. Кычкылтек туфельканын цитоплазмасына суу менен бирге кирип турат.


Көбөйүшү. Туфельканын цитоплазмасында буурчакка окшош чоң ядро жана тоголок кичине ядро бар. Жыныссыз көбөйүүсү ядролордун кабыгынын эриши жана ядролук заттын экиге бөлүнүшүнөн башталат. Бул учурда туфельканын денеси дал ортосунан ичкерет. Пайда болгон жаңы ядролор туфельканын алдыңкы жана арткы бөлүктөрүнө бирдей санда өтөт. Туфельканын денеси барган сайын ичкерип, экиге ажырайт жана бир инфузориядан экөөсү пайда болот. Ар бир инфузорияда бирден жыйрылуучу вакуоль болот, экинчиси кийинчөрээк пайда болот.

Дүүлүгүшү. Туфельканын клетка кабыгынын астында майда чагуучу таякча сымал денечелер жайлашкан. Бул денечелер аны жырткыч жаныбарлардан коргойт. Туфельканын таякчалары атып чыгып, жырткыч жаныбардын денесине сайылат жана аны үркүтүп жиберет.

Споралуулар классы. 4 минден ашыун микроскоптук жаныбарларды өз ичине алат. Бардык түрлөрү адамдарда жана жаныбарларда мителик кылышат. Түзүлүшү өтө жөнөкөйлөшкөн. Аракеттенүү, тамак синириүү жана бөлүп чыгаруу органоиддери болбойт. Алардын ичинен безгек митеси кенири тараалган. Бул митени адамга

10-сүрөт. Безгек митесинин өрчүшү:

- 1 – кызыл кан клеткасына кирип жаткан мите;
- 2 – митенин кызыл кан клеткасында өсүшү;
- 3 – митенин бөлүнүп көбөйүшү;
- 4 – мителердин кан клеткасынан кан плазмасына өтүшү.



безгек чиркейи жуктурат. Мите кызыл кан денечелерине кирип, кандын плазмасына чыкканда, адамдын температурасы жорорулап, безгек башталат. Бул классса тыт жибек курту менен бал аарынын митеси – нозема да кирет.



1. Инфузориялардын түзүлүшүнүн кайсы өзгөчөлүктөрү башка бир клеткалардан айырмаланат?
2. Туфельканын цитоплазмасында кандай органоиддер бар?
3. Туфелька тамакты кандайча сицирет?
4. Туфельканын жыныссыз көбөйүшү кандайча ишке ашат?
5. Эмне себептен туфелька татаал түзүлүштөгү бир клеткалардага киргизилет?
6. Бир клеткалардын клеткасы көп клеткалардын бир клеткасынан кандайча айырмаланат?



1. Туфельканын клеткасында болот:

 - a) бир чон жана бир кичине ядро;
 - b) бир жыйрылуучу вакуоль;
 - c) бир тамак сицирүүчү вакуоль.

2. Споралуулардын клеткасында болбайт:

 - a) ядро, жыйрылуучу вакуоль;
 - b) клетканын мембранасы, тамак сицирүүчү вакуоль;
 - c) аракеттенүү органоиддери.



Бир клеткалардын аттары менен аларга ылайык келген жашоо шарттарын жуптап жаз.

- | | |
|-------------------|---------------------------------------|
| а) нозема; | 1) кандын клеткаларын бүлүндүрөт; |
| б) туфелька; | 2) аарылардын, жибек куртунун митеси; |
| в) безгек митеси. | 3) бактериялар менен тамактанат. |

Сөздүк дептериңе жазып ал.

Инфузория, туфелька, кирпикчелер, кулкун, чыгаруу тешиги, чон ядро, кичине ядро, чагуучу денече, споралуулар, спора, нозема.



Суроого жооп тап. Сен өткөн сабактардын бириnde микропрепарата амёбанын туфельканын инфузориясын курчап алыш азыктанганын микроскоптун астында алынган видеофильмден көргөн элен. Туфелька болсо амёбага салыштырмалуу кыйла кыймылдуу жаныбар саналат. Анда эмне себептен туфелька амёбанын курчоосунан кутулуп кете албаган?

Төмөнкү табышмакта кайсы жаныбар жөнүндө сөз болуп жатат?

4. Сууга бир аз чөптөн салдык,
Ошол судан тамчы алдык.
Анда тириү жанды көрүп,
Бардыбыз таң калдык.

Туура жооптор: 1а, 2в. Туура жуптуктар: а-2, б-3, в-1.

1-лабораториялык машигуу.

Туфельканын түзүлүшү, кыймылы жана дүүлүгүшү

Керектүү жабдуулар: микроскоп, 2–3 жума мурда сууга салып коюлган чөп, кызыл конго боёгу, буюм жана каптагыч айнектер, пахтанын буласы, айнек таякча, тамызгыч, пинцет, энсиз кыркылган фильтр кагазы, жашыл метил жана уксус кислоталарынын 1 : 1 катышта даярдап коюлган суудагы эритинди, компьютер, проектор.

Коопсуздук техникасы. Лабораторияда иштөө үчүн халаттан же лаборатория фартуунан пайдаланылат. Кийимдерди булгабастык же аллергиялык реакциялар келип чыкпастыгы үчүн химиялык заттардан этияттык менен пайдалануу зарыл. Микропрепараттагы объект ээзилбестиги үчүн микроскоп менен иштегендө, айныksa анын кичине объективинен чонуна өткөрүүдө, аябай этият болуу зарыл.

1-ши. Туфельканын түзүлүшүн үйрөнүү жана органоиддеринин иштешине байкоо жүргүзүү. Тамызгычтын жардамында туфелька көбөйтүлүп жактан уютулган чөптүн суусунан 15–20 тамчы алып, сааттын айнегине тамыз жана ага кызыл конго боёгунан бир аз кошуп, айнек таякча менен аралаштыр (конго боёгу кошулган чөптүн суусу кызғылтым түстө болууга тийиш). Тамызгычтын жардамында боёктуу суудан бир тамчы алып, буюмдун айнегине тамыз (бул ишти конго боёгу болбогон учурларда да көрсөтүлгөн тартипте аткарууга болот).

Туфельканын кыймылын басандатуу үчүн тамчыга бир нече пахта буласын сал. Тамчынын үстүн каптагыч айнек менен жап жана анын айланасындагы сууну фильтр кагазына абайлап шимдирип ал. Ушундай усулда даярдалган препаратка баштап микроскоптун кичине объективинен, андан кийин чоң объективинен байкоо жүргүз. Туфелька денесинин алдыңкы жана арткы жактарын аныкта. Денесинин капитал жагында жайлашкан ооз алды чункурун, алдыңкы жана арткы жагындагы эки жыйрылуучу вакуолдорун тап жана аларга байкоо жүргүз. Кирпикчелер бир калыпта аракеттенип, туфелька денесинин алдында жана, айныksa анын ооз көндөйүнүн айланасында, суунун агымын пайда кылат. Кызыл конго боёгу азык менен кошо синириүүчү вакуолдорунун ичине өтүп, аларды кызыл

түскө боёт. Микроскоптон туфелька кирпикчелеринин кыймылына, синириүүчү вакуолдорунун цитоплазма агымы менен кыймылга келишине байкоо жүргүз.

Туфельканын алдыңкы жана арткы жагында бирден жыйрылуучу вакуоль жайлашкан. Ар бир вакуоль суюктукту цитоплазмадан чогултуп алуучу бир нече узун жана ичке түтүкчөдөн, суюктук чогултуучу ыйлаакчадан жана анын ичине чогулган суюктукту тышка бөлүп чыгаруучу түтүкчөдөн турат. Ыйлаакчалар кезеги менен жыйрылып, суюктукту тышка чыгарып турат. Бир нече минут бою вакуоль ыйлаакчасынын суу менен толушуна жана бошошуна байкоо жүргүз.

2-ши. Туфельканын дүүлүгүшүнө байкоо жүргүзүү. Буюмдун айнегине таза суудан жана чөптүн инфузориялуу суусунан бир тамчыдан тамыз. Бул эки тамчыны ичке каналча ракылуу туташтыр. Чөптүн туфелькалуу тамчысына майда аш тузунун бир нече бөлүкчөлөрүн сал. Микроскоптун кичине объективинен туфелькалардын аш тузу салынган суудан таза суунун тамчысына өтүшүнө байкоо жүргүз.

3-ши. Туфельканын чагуучу денечелеринин атып чыгышына жана ядролоруна байкоо жүргүзүү. Буюмдун айнегине чөптүн туфелькалуу суусунан тамыз. Тамчыга уксус кислотасы менен жашыл метил боёгу аралашмасынын суудагы эритиндисинен бир тамчы тамыз. Тамчыны каптагыч айнак менен жаап, микроскоптун чоң айнегинен байкоо жүргүз. Уксус кислотасынын таасиринде туфелька чагуучу денечелерин атып чыгарып, өзү өлөт. Жашыл метил боёгу болсо туфельканын ядролорун жашыл түскө боёт. Микроскоптун чоң объективинен туфелька денесинин тышына атып чыккан денечелерди тап. Бул денечелер туфельканын үстүндө иретсиз жайлашкан ичке жиптер формасында көрүнөт. Ошол препараттан буурчак сымал чоң ярдону жана иймек жагында жайлашкан кичине ядрону тап.

III ГЛАВА

КӨП КЛЕТКАЛУУ ЖАНЫБАРЛАР: ИЧЕГИ-КӨНДӨЙЛҮҮЛӨР ТИБИ

Ичеги-көндөйлүүлөр денеси эки кабат клеткалардан турган жөнөкөй түзүлүштөгү көп клеткалуулар. Денесинин көндөйү ичегинин милдетин аткарат. Бул типке гидроиддик полиптер, сцифоиддик медузалар, коралл полиптер классы кирет.


6-§

Гидроиддик полиптер: тузсуз суу гидрасы


Тышкы түзүлүшү. Гидра тунук, тынч аккан сууларда же акпаган тузсуз көлмөлөрдө жашайт. Аны аквариумдардан да кездештируүгө болот. Денесинин узундугу 5–7 мм, цилиндр сымал формада. Астынкы жагы *таман* деп аталат. Таманынын карама-карши жагында *тингүүрлөр* менен курчалган *ооз тешиги* бар. Гидра таманы менен суудагы нерселерге жабышып алат. Суунун түбүндөгү нерселерге жабышып жашаган ичеги-көндөйлүүлөр деп аталат.

Нур симметриясы. Симметрия – дene бөлүктөрүнүн бир октун тегерегинде өз ара шайкеш жайлашуусун билдириет (11-сүрөт). Гидранын таманынан ооз тешигин карай ойдо элестетип, ок сзызык жүргүзүлсө, анда анын денесин ошол сзызыктан тингүүрлөргө кеткен нурларды бойлой бир нече тен бөлүктөргө бөлүүгө болот. Дененин бир ок сзызыктан чыккан нурларды бойлой шайкеш келген барабар бөлүктөрдөн турушуна *радиалдуу*, же *нурлуу симметрия* дейилет.

Дене клеткалары. Денесинин бети эки кабат клеткалардан турат. Тышкы – *эктомермалык*, ички – *эндодермалык* катмарлар жука жаргак менен ажыратылган. Дененин бети кенири ички дene көндөйүн курчап турат. Бул



11-сүрөт. Гидранын туураасынан кесилиши (А) жана нур симметриясы (Б): 1–сирткы катмары; 2–ички катмары; 3–ичеги көндөйү.



12-сүрөт. Гидранын узатасынан кесилиши жана клеткалары:
1—чалкан клетка; 2—нерв клеткасы; 3—сперматозоид; 4—жу-
муртка клеткасы; 5—тамак синирүүчү клетка; 6—тери-
булчун клеткасы.

көндөй ичегинин милдетин да аткаралады (12-сүрөт).


Тышкы катмары *тери-булчун* клеткаларынан турат. Бул клеткалардын дененин бетине батып кирип көнгөн жағында булчун талчалары болот. Булчундардын жыйрылышы натыйжасында гидра тоңочук атып же арыштап аракеттенет.

Эктодермалык клеткалардын арасында чагуучу касиетке ээ *чалкан* клеткалар болот (13-сүрөт). Алар, айныкса, тинтүүрлөрүндө абдан көп. Чалкан клеткалардын майда сезгич кылчасы жана чалкан капсуласы болот. Капсулада ичке чалкан жипче жайлашкан. Жаныбарлар (дафния, циклоп, чабактар) чалкан клетканын кылчасына тийип кетсе, капсуладагы жипче атып чыгып, алардын терисине сайылат. Капсуладан агып келген уулуу суюктук жаныбардын денесине өтүп, аны майып кылат.

Дүүлүгүшү жана рефлекс пайдалылыши. Эктодермада узун өсүндүлүү жылдыз сымал нерв клеткалары бы-

тыранды түрдө жайлашкан. Алардын өсүндулөрү туташып, нерв торчосун түзүштөт. Нерв клеткаларынын жардамында гидра тышкы

13-сүрөт. Гидранын чагуучу (А) жана тамак синирүүчү (Б) клеткалары:
1—чагуучу жипче; 2—чагуучу капсула;
3—сезгич кылча; 4—булчун талчасы;
5—ядро; 6—тамак синирүүчү вакуоль;
7—курчалып жаткан азық.




чөйрөнүн таасириң сезет жана денесин жыйрып алат. Гидраның дүүлүгүүгө жооп берүү өзгөчөлүгү *рефлекс* деп аталат.

Эндодермалык клеткалары, тамактанышы. Эндодермалык катмар жалган буттарды чыгаруу касиетине ээ ири шапалакчалуу жана бездүү клеткалардан турат. Клеткалар тамак сицирүү зилин чыгаруу, тамак сицирүү милдетин аткарат. Анын азығы да бир клеткалуулардыкы сыйктуу клетканын ичинде сицирилет. Кармалган олжону тинтүүрлөрүнө жабыштырып, оозуна алыш барат. Азық дene көндөйүнө түшүп, тамак сицирүү зилинин таасириnde майдаланат. Шапалакчалар азыкты клеткаларга шилейт. Клеткалар жалган буттары менен азыкты курчап алыш, сицирет.

Регенерация. Эктодермалык клеткалардын арасында ири ядролуу майда *аралык клеткалар* болот. Денеси жабыркаганда бул клеткалар өсүп, жабыркаган клеткалардын ордун толтурат. Жабыркаган же жоготулган бөлүктүн калыбына келишине *регенерация* дейилет. Гидраның денеси 200 бөлүккө бөлүнгөндө да ар бир бөлүктөн бирден гидра калыптангандыгы аныкталган. **Жыныссыз көбөйүшү.** Азық заттар жетиштүү болгон жаздын жана жайдын жылуу күндөрүндө гидраның денесинин сыртында бир нече бүчүрлөр пайда болот. Тинтүүрлөр жана ооз тешиги пайда болушу менен бүчүрлөр жаш гидраларга айланышат. Алар энелик организмден ажырап, өз алдынча жашай башташат.

Жыныстык көбөйүү. Күзүндө ынгайсыз шарттар туулушунан мурда гидраның денесинин сыртында дөнчөлөр пайда болот. Аларда бирден ири *жумуртка клеткасы* же көп сандагы урук клеткалары – *сперматозоиддер* жетилет (14-сүрөт).

Гидра жумуртка клеткасынын жалган буттары болот. Сперматозоиддер болсо майда, бат кыймылдаган кичине клеткалардан



турат. Алар суу аркылуу барып жумуртка клеткасын уруктандырат. Уруктанган жумуртка клеткасы зигота деп аталат. Зиготанын сырты калың кабык менен капталат. Гидра кышында өлөт; зигота болсо кыштап калат. Жазында зиготадан жаш гидра пайда болот. Жумуртканын кабыгы жарылышы менен жаш гидра суга чыгат жана өзүнүн жашоосун улантат.



1. Дене симметриясы деген эмне?
2. Гидранын эктодермасында кандай клеткалар бар?
3. Чалкан клеткалар кандай милдет аткарышат?
4. Эндодермалык клеткалар кандай милдет аткарышат?
5. Регенерация деген эмне?



- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. Полип – ичеги-көндөйлүү: | 2. Зигота – жумуртка клеткасы: |
| a) эркин жашаган; | a) уруктанган; |
| b) эң жөнөкөй түзүлгөн; | b) кыштап калган; |
| c) жабышып жашаган | b) уруктанбаган |



Дене клеткаларын жана алардын милдеттерин жуптап жаз.

- | | |
|------------------|-----------------------------------|
| a) тери-булчун; | 1) дүүлүгүү, рефлекс пайда кылуу; |
| b) чалкан; | 2) регенерация; |
| c) нерв; | 3) тамак синириүү; |
| d) аралык; | 4) каптоо, аракеттенүү; |
| e) шапалакчалуу; | 5) зил иштеп чыгаруу; |
| f) бездүү. | 6) олжону бүлүндүрүү, коргонуу. |

Сөздүк дептериңе жазып ал.

Полип, симметрия, эктодерма, эндодерма; тери-булчун клеткасы, чалкан клеткасы, нерв клеткасы. аралык клеткалар, регенерация, сперматозоид



Суроого жооп тап. Көп клеткаулардын шапалакчалуу бир клеткаулардан келип чыккандыгы божомолдонот. 12 жана 13-сүрөттөн пайдаланып, гидра түзүлүшүнүн кайсы өзгөчөлүктөрү шапалактууларга окшоштугун аныкта.

Төмөнкү табышмакты тап жана ага мүнөздөмө бер.

5. Он кызматчи бир оозго,
Ага керек кандай олжо?

Туура жооптар: 1в, 2а.

Туура жуптуктар: а-4, б-6, в-1, г-2, д-3, е-5.

7-§**Деңиз ичеги-көндөйлүлүрү**

Дениздерде актиния, коралл полип, медузалар кең тараалган.

Деңиз ичеги көндөйлүлүрүнө деңиздердин түбүндө жеке отуруктуу жашаган актиниялар жана отуруктуу колонияны түзгөн коралл полиптери, ошондой эле суунун түбүндө эркин жашаган медузалар кирет.

Жеке отуруктуу жашаган актиниялардын дene түзүлүшү жана формасы гидрага окшош болот. Бирок кыйла ири (денесинин диаметри 0,5 м ге чейин) жана түстүү болушу менен гидрадан айырмаланат (15-сүрөт, 4). Тинтүүрлөрү ооз көндөйүнүн айланасында бир нече катар болуп жайлышкан. Актиниялар суу түбүндөгү нерселерге жабышып жашайт, кээде таманы менен ақырын аракттенет. Гидра сыяктуу алар да олжосун чагуучу жиптери менен жаралап, тинтүүрлөрү жардамында оозуна салат (9-видео. Актиниялардын тамактанышы). Айрым актиниялар тентиген рактар жана балыктар менен *симбиоз* жашаганга ылайыкташкан. Симбиоз жашоо эки жаныбар үчүн төң пайдалуу саналат. Алардан бири, мисалы, актиния рактын раковинасына отуруп алышп, аны жырткыч жаныбарлардан коргойт. Ал эми рак болсо актинияны өзү тапкан тамагына шерик кылат.

Колония түзүүчү полиптердин колониясы гидрага окшош түзүлгөн етө көп сандагы полиптерден турат. Алардын ички көндөйлөрү өз ара туташкан. Ар бир полиптин кармаган азыгы колониянын бардык мүчөлөрүнүн ортосунда бирдей бөлүштүрүлөт. Алар майда органикалык калдыктар жана микроорганизмдер менен тамактанышат. Көптөгөн түрлөрүнүн денесинде акита什 скелет пайда болот. Катуу скелеттүү, колония болуп жашаган ичеги-көндөйлүлөр *коралл полиптер* деп аталат (15-сүрөт, 5, 6).

Колония түзгөн полиптер жыныстык жол менен көбөйгөндө, жумурткадан чыккан личинка актиниянын личинкасы сяяктуу суунун түбүнө жабышып, кичинекей полипти түзөт. Полип кезинде гидра сяяктуу жыныссыз жол менен бүчүрлөп көбөйт. Бүчүрдөн пайда болгон жаш полип энесинин денесинен ажырабай, кошо бүчүрлөй баштайт. Ошентип колония пайда болот.



15-сүрөт. Дениз ичеги қондойлұлдары:

- 1 – тамыр ооз; 2 – уюл медузасы; 3 – аурелия; 4 – актиниялар;
5 – кызыл коралл полип; 6 – коралл полиптердин колониясы.

Коралл рифтери. Тропик дениз жәэктерине жакын, океандын терен болбогон бөлүктөрүндө коралл полиптер жыш жайланышып, өтө ири колония – *рифтерди* түзөт. Ал суунун бетин көздөй өсөт; суунун түбүндөгү колониянын өлгөн астынкы бөлүгү топтолуп отуруп, убакыт өтүшү менен *коралл арапдарын* түзөт. Шамал, суу жана күштар аркылуу түрдүү өсүмдүктөрдүн уруктары келип калышынын натыйжасында рифтерде жашоо башталат. Мындаи рифтер Тынч океанынын тропик бөлүгүндө, Австралиянын бойлоруна жакын жерлерде көп кездешет.

Коралл рифтеринен курулуш материалы (акиташ) иретинде пайдаланылат. Айрым рифтерден (кызыл коралл) жасалга буюмдары даярдалат. Коралл рифтери ар түрдүү балыктар жана башка дениз жаныбарлары үчүн мекен болот. Ошондуктан рифтер кенири тараган жерлер коруктарга айландырылган.

Медузалар. Денеси тунугураак айнек сымал килкилдек заттан турат. Формасы кол чатырга окшойт (15-сүрөт, 1, 2, 3). Кол чатырдын асты жагынын борборунда жайлашкан ооз тешигинин жана кол чатырдын четинде абдан көп тинтүүрлөрү болот. Дене клеткалары бардык ичеги-көндөйлүлөрдүкү сыйктүү эки катмарлуу жайлашкан, бирок аралык заты өтө начар өнүккөн. Кол чатыр жыйрылганда анын астындагы суунун күч менен атылып чыгышы натыйжасында реактивдүү кыймыл пайда болот

Медузалар жырткыч болуп, рак сымалдар, сөөлжандар, чабактар жана башка майда суу жаныбарлары менен тамактанышат. Олжолорун чагуучу жиптеринин жардамында майып кылып, ооз тегерегиндеги ири тинтүүрлөрүнүн жардамында ооздоруна салышат. Кээ бир медузалардын чагуучу жипчелери күйдүрүү касиетине ээ. Түндүк дениздерде уюл *медузасы* жана Кара денизде *тамыр ооз медуза* киринүүчүлөр үчүн кооптуу саналат. Дениз тарелкасы деп аталган, бардык дениздерде кенири тараган *аурелия* медузасы адам үчүн зыянсыз. Медузалар чабактарды жеп, балык чарбачылыгына бир топ зыян келтиришет.

Ичеги-көндөйлүлөрдүн келип чыгышы. Денесиндеги клеткалардын начар адистешкендиги жана күчтүү регенерация касиети ичеги-көндөйлүлөрдүн эң байыркы жаныбарлар экендигин көрсөтөт. Окумуштуулардын пикири боюнча, байыркы колония болуп жашаган бир клеткалуу шапалактуулардан адегенде гидра сымалдар, алардан коралл полиптер жана медузалар келип чыккан. Ичеги-көндөйлүлөрдүн

денесинде азыкты курчап алып синире турган клеткалардын болушу мунун далили болуп саналат.



1. Актиниялар кандай түзүлгөн?
2. Коралл полиптердин колониясы кандай пайда болот?
3. Медузалар кандай түзүлгөн?
4. Медузалар кандайча аракеттенишет?
5. Кайсы медузалар адам баласы үчүн кооптуу?
6. Ичеги-көндөйлүлөр кандайча пайда болгон?



1. Кайсы жооп актинияларга мүнөздүү?
- a) колония болуп жашайт;
- b) тинтүүрлөрү бир нече катар жайлышкан;
- b) бүчүрлөрү энелик организмден ажырап кетпейт.
2. Кайсы жооп коралл рифтери үчүн мүнөздүү эмес?
- a) медуза кезинде эркин жашайт;
- b) акиташтуу скелет пайда кылат;
- b) колония болуп жашайт.



Ичеги-көндөйлүлөрдү тараалган жерлери менен жуптап жаз.

- | | |
|--------------------|------------------------|
| a) тамыр ооз; | 1) түндүк дениздер; |
| б) аурелия; | 2) тропиктик дениздер; |
| в) уюл медузасы; | 3) Кара дениз; |
| г) коралл рифтери. | 4) бардык дениздер. |

Сөздүк дептериңе жазып ал.

Коралл полиптери, актиниялар, полип, рифтер, коралл аралдары, кызыл коралл, медузалар, аурелия, тамыр ооз медуза, уюл медузасы, кол чатыр, реактивдүү кыймыл.



Суроого жооп тап. Эмне себептен коралл полиптеринин колониясы жылуу суулуу дениздердин жээгине жакын жерлерде көндири тараалган?

Табышмакта кайсы жаныбардын түзүлүшү жана уусу жөнүндө сөз болуп жатат?

6. Кол чатырга окшойт денеси,
Тие көрбө, чагат ийнеси.

Туура жооптор: 1б, 2а.

Туура жуптуктар: а-3, б-4, в-1, г-2.



**IV
ГЛАВА**

ЖАЛПАК ЖАНА ЖУМУРУ КУРТТАР ТИПТЕРИ

Жалпак курттар – денеси эки жактуу симметриялуу көп клетка-луулар. Алардын сиңирүү, бөлүп чыгаруу, сезүү, жыныстык органдары өнүккөн. Алар кирпикчелүү курттар, соргучтуулар, тасма сымал курттар класстарына бөлүнөт.



8-§


Жалпак курттар тиби: кирпикчелүү курттар классы

Кирпикчелүү курттардын денеси жалбырак сымал формада, майда кирпикчелер менен капталган. Алар дениздерде, тузсуз сууларда жашашат. Ак планария – типтүү өкүлү саналат.

Жашоо чөйрөсү, тышкы көрүнүшү. Ак планария дарыялардын, көлдөрдүн түбүндө жашайт. Аны кээ бир чакан өзөндүн түбүндө жаткан таш, жалбырак же чөптүн астынан табууга болот. Денесинин узундугу 2–3 см, агыш же боз түстө. Денесинин бир аз жазы алды жагынын эки капталында кыска өсүндүлөргө окшош эки сезүү тинтүүрү жана эки кара чекит түрүндө көзчөлөрү жайлышкан (16-сүрөт, А). Денесинин сырты бир катмарлуу кирпикчелүү эпителий клеткалары менен капталган. Ал кирпикчелеринин жардамында жылбышып аракеттенет.

Дене симметриясы. Эгерде ак планариянын денесин бойлой ойдо элестүү түз сыйык жүргүзүлсө, анда анын органдары ошол сыйыктын эки жагында төң бирдей санда жайлышат, б.а. дененин эки бөлүгү төң бирдей болот. Дене органдарынын мына ушундай жайгащусуна эки жактуу симметрия дейилет.

Тамак сицирүү системасы жана тамактанышы. Ооз тешиги курса-гында жайлышкан. Оозу кыска кулкун менен туташкан. Кулкундан үч бутактуу ичеги башталат (16-сүрөт). Алардан бири дененин алды жагына, калганы арт жагына багытталган. Ичеги бутактары өтө көп, туюк капитал бутакчаларды түзөт. Ооз тешиги, кулкун, ичеги



16-сүрөт. Ак планариянын түзүлүшү:

А – тамак сицируү; Б – бөлүп чыгаруу; В – бөлүп чыгаруу түтүкчөлөрүнүн клеткаларынын түзүлүшү; Г – нерв; Д – жыныстык системасы: 1 – кулкун; 2 – ичегинин бутакчалары; 3 – бөлүп чыгаруу түтүкчөлөрү; 4 – бөлүп чыгаруу түтүкчөлөрүнүн учундагы клеткалары; 5 – бөлүп чыгаруу түтүкчөлөрүнүн өз алдынча клеткасы; 6 – нерв түйүнү; 7 – нерв түркүгү; 8 – жумурткалыш; 9 – уруктук; 10 – жумуртка жолу; 11 – кошулуу органы; 12 – жыныстык тешик.

тамак сицируү системасын түзөт. Планариянын арткы ичегиси жана арткы чыгаруу тешиги болбойт.

Планария – жырткыч жаныбар. Майда суу жаныбарлары – курт, рак сымалдар жана курт-кумурскалардын личинкалары менен тамактанат. Олжосун денеси менен каптап алып сорот. Азық ичегиде сицирилип, бутактары аркылуу денеге таралат. Синбegen бөлүгү ооз тешиги аркылуу чыгарып жиберилет.

Бөлүп чыгаруу системасы. Денесинин көндөйлүү тканында өтө көп учу туюк түтүкчөлөр жайлышкан (16-сүрөт, Б-В). Бул түтүкчөлөр дененин эки капиталындагы ирирәэк эки түтүкчөгө келип туташат. Зат алмашуунун натыйжасында пайда болгон зыяндуу заттар денедеги ашыкча суу менен бирге майда түтүкчөлөрдүн ичине сыйылып өтөт жана эки капиталында жайлышкан ири түтүктөр аркылуу чыгарып жиберилет.

Нерв системасы. Планариянын нерв клеткалары дененин алдыңкы жагында топтолуп, эки *нерв түйүнүн* пайда кылат (16-сүрөт, Г). Нерв түйүндөрүнөн дененин арт жагын көздөй эки ири *нервдер* чыгат. Нерв түйүндөрүнөн дененин бардык бөлүктөрүнө нервдер

кетет. Нерв клеткалары менен нерв талчалары биригип *нерв системасын* түзүшөт.

Сезүү органдары. Планария териси аркылуу ар түрдүү таасирлерди сезе алат. Эгерде ага кандайдыр нерсе тийип кетсе, денесин кескин жыйырып алат. Тинтүүрлөрү, териси жана көзчөлөрү планариянын *сезүү органдары* болуп эсептелет.

Жыныстык системасы, көбөйүшү. Денесинин алдынкы бөлүгүндө эки ургаачылык жыныстык органы – *жумурткалыктар*, алардан кийинирәэк шарчага окшош эркектик жыныстык органы – *уруктуктар* жайлашкан (16-сүрөт, Д). Алар *жыныстык системаны* түзүшөт. Жумурткалыктарда жумурткалар, уруктуктарда урук клеткалары – сперматозоиддер пайда болот. Уруктанган жумурткалар тобу менен *пилланын* ичине коюлат. Жумурткадан чыккан жаш планариялар *пилланын* бетин жарып сууга чыгат.

Ошентип, планариянын денесинде бир эле мезгилдин өзүндө жумуртка жана урук клеткалары өрчүйт. Ушуга окшош эки түрдүү жыныска ээ жаныбарларга *гермафродиттер* дейилет.

Регенерациясы. Планарияда регенерация касиети абдан жакши өрчүгөн. Ыңгайсыз шарттар пайда болгондо (температура жогорулаганда, кычкылтек жетишпесе) планария майда бөлүктөргө бөлүнүп кетип, ыңгайлуу шарт түзүлгөндө дагы ар бир бөлүктөн өз алдынча организм өрчүшү мүмкүн.

- 
1. Эки жактуу симметрия деген эмне?
 2. Планариянын кандай органдары өрчүгөн?
 3. Планария кантит тамактанат?
 4. Бөлүп чыгаруу системасы кандай түзүлгөн?
 5. Нерв системасы кандай түзүлгөн?
 6. Жыныстык системасына кандай органдар кирет?

- 
1. Эки жактуу симметрия – бул:
 - а) денени бойлой өткөн борбордук сзыктын эки жагында органдардын бирдей санда жайлашуусу;
 - б) дene органдарынын борбордон чыккан радиалдуу сзыкты бойлой жайлашуусу;
 - в) дene органдарынын бир тегиздикте жайлашуусу.
 2. Планарияда эпителий тканы:
 - а) денесинин курсак бөлүгүндө жайлашкан;
 - б) денесинин сыртында бир тегиз жайлашкан;
 - в) денесинин аркасында бир тегиз жайлашкан.



Терминдер менен алардын маанилерин жуптап жаз.

- | | |
|---------------------|---|
| a) нерв түйнендөрү; | 1) эреккөн жана ургаачы жыныска ээ болгон организм; |
| б) пилла; | 2) жумуртка коюу баштыкчасы; |
| в) гермафродит; | 3) башканын эсебинен азыктанат; |
| г) мите. | 4) нерв клеткаларынын жыйнагы. |

Сөздүк дептериңе жазып ал.

Ак планария, кирпикчелүү эпителий, эки жактуу симметрия, тамак синириүү системасы, кулкун, ичеги, белүп чыгаруу системасы, нерв системасы, уруктук, пилла, гермафродит.



Суроого жооп тап. 1. Кирпикчелүү курттар денесинин чоноюшу синириүү жана белүп чыгаруу органдарынын татаалдашусуна алыш келген. Мунун себебин негиздеп бер. 2. Эмне себептен планария өзүнүн олжосун курсагы менен жаап алат?

Табышмакта кайсы жаныбар түзүлүшүнүн белгилери берилген?

7. Кирпикчеси көп, буту жок,
Бутак ичеги – көндөй жок.

Туура жооптор: 1а, 2б.

Жуптап жаз: а-4, б-2, в-1, г-3.

9-§


Жалпак курттар тиби: соргучтуулар классы жана тасма сымал курттар

Соргучтуулар классы. Алардын жалбырак сымал денеси калың кутикула менен капиталган. Чонойгондо омурткалуу, личинка кезинде омурткасыз жаныбарларда мителик кылат. Боор курту соргучтуулар классынын типтүү өкүлү саналат.

Боор курту бодо малда, койдо, эчкиде, чочкодо, төөдө жана башка ири сүт эмүүчүлөрдүн боорунда мителик кылат. Боор куртунун узундугу 3–4 см, формасы жалбырак сымал (17-сүрөт) болуп, денесинин алдыңкы учунда ооз соргучу, андан бир аз аркараакта курсак соргучу жайлышкан. Мите соргучтарынын жардамында боордун өт жолдорунун беттерине жабышып алат.


Тамак синириүү системасы ооз соргучунун ортосундагы ооз тешигинен башталат. Оозу кыска кулкун аркылуу эки бутактуу ичегиге туташкан. Ичегинин бутактары көптөгөн каптал бутактарга белүнөт. Боор курту өт суюктугун, канды соруп азыктанат.

9-§. Жалпак курттар тиби: соргучтуулар классы жана тасма сымал курттар 35



17-сүрөт. Боор соргуч куртунун түзүлүшү:

1 – ооз соргучу; 2 – оозу; 3 – курсак соргучу; 4 – жыныстык системасы.




18-сүрөт. Боор куртунун өрчүшү:

1 – чоңойгон стадиясы; 2 – суудагы жумурткалар; 3 – кирпикчелүү личинка; 4 – көлчүкчүүлүл; 5 – 6 – күйруктуу личинкасы; 7 – чөпкө жабышкан циста; 8 – бодо мал.

Көбөйшү жана өрчүшү. Уруктанган жумурткалар өт жолдорунан ичегиге, андан тышкы чөйрөгө чыгат. Жумурткалар сууга түшкөндө алардан абдан майда *кирпикчелүү личинкалар* чыгат (18-сүрөт). Алар суу үлүлүнүн денесине кирип алат, кирпикчелерин таштап, жаны личинкаларды пайда кылат. Кийинчөрээк личинкаларда күйрук пайда болуп, алар сууга чыгат. Алар сууда күйруктарын таштап, жумуру тартат жана калың кабыкка оронуп, цистага айланат. Суу же азық менен кошо жаныбардын ичегисине түшкөн цистадан личинка чыгат. Личинка кан аркылуу боорго барып, өт жолдоруна жабышып, мителик кылат.


Боор курту чоңойгондо мителик кылган адам жана сүт эмүүчү жаныбарлар анын *негизги ээси*, ал эми личинкасы мителик кылган суу үлүлү болсо *аралык ээси* болуп эсептелет.

Тасма сымал курттар классы. Тасма сымал курттар – денеси кутикула менен капталган; формасы узун жалпак тасмага окшош мите жаныбарлар. Негизги өкүлү болуп бодо малдын тасма сымал курту саналат.



Бодо малдын тасма сымал курту чоңойгондо адамдын узун ичегисинде, личинкасы болсо бодо малдын булчундарында, боорунда жана башка органдарында мителик кылат. Денесинин узундугу 8–10 м болуп, кичинекей **башчадан**, ичке **моюондан** жана мунакчаларга бөлүнгөн **дene бөлүктөрүнөн** турат (19-сүрөт). Башында тегерек формадагы төрт **соргучу** бар. Денеси өтө көп (1000 ге дейре) мунакчаларга бөлүнгөн, тамак синириүү органдары өрчүбөгөн. Бул курт адамдын ичегисинде синириле баштаган азыктарды денесинин бети менен соруп алат.

Жыныстык системасы, көбөйүшү жана өрчүшү. Жыныстык органдары денесинин бардык мунакчаларында көптегөн жолу кайталанып турат. Ар бир мунакчада бир жуп жумурткалык, бир жатын жана өтө көп уруктуктары болот. Жатыны жумурткаларга толгондон кийин бир нече мунакча дененин кийинки бөлүгүнөн үзүлүп, ичеги көндөйүнө түшөт жана заң менен тышкы чөйрөгө чыгып кетет. Жумурткалары жем-



9-§. Жалпак курттар тиби: соргучтуулар классы жана тасма сымал курттар 37

чөп же суу аркылуу бодо малдарга жугат (20-сүрөт). Жумурткадан чыккан личинкалар ичегинин бети аркылуу канга өтөт жана кан аркылуу боорго, булчундарга жана башка органдарга барып орношот. Личинкалар органдарда жука жаргакчаларга оронуп, ыйлаакча стадиясына өтөт. Суюктук менен толгон ыйлаакчага *финна* дейилет. Финналуу этти чала бышырып жеген адам аны өзүнө жуктуруп алат. Адам – бодо мал тасма куртунун негизги ээси, ал эми бодо мал болсо анын аралык ээси болуп саналат.

Жалпак курттардын келип чыгышы. Жалпак курттардын эң байыркысы – ичегисиз кирпикчелүү курттар. Алардын түзүлүшү ичеги-көндөйлүгүлөрдүн личинкасына оқшош. Кийинчөрээк кирпикчелүү курттардын мителик кылып жашоого ылайыкташуусу натыйжасында түзүлүшү жөнөкөйлөшүп, алардан соргучтуулар менен тасма сымал курттар келип чыккан.

- 
1. Боор курту кандай түзүлгөн?
 2. Боор курту кантип өрчүйт?
 3. Кайсы жаныбарлар анын негизги, аралык ээлери болушат?
 4. Бодо малдын тасма сымал курту кандай түзүлгөн?
 5. Бодо малдын тасма сымал курту кантип өрчүйт?
 6. Бодо малдын тасма сымал курту адамдарга жана бодо малдарга кантип жугат?

Терминдерди аларга ылайык келген түшүнүктөр менен бирге жуптап жаз.

- 
- | | |
|------------------|--|
| a) личинка; | 1) тасма сымал курттардын жугуштуу ыйлаакча стадиясы; |
| b) аралык ээси; | 2) соргучтуулардын ынгайсыз шарттарга чыдамдуу стадиясы; |
| v) негизги ээси; | 3) жаныбарлардын чоңоё элек стадиясы; |
| g) циста; | 4) личинка мителик кылган организм; |
| d) финна; | 5) чоңойгон мите жашаган организм; |
| e) соргуч. | 6) жабышуу органы. |

Сөздүк дептерине жазып ал.

Соргучтуулар, аралык ээси, негизги ээси, личинка, циста, боор курту, соргучтар, финна, тасма сымал курттар, мите, бодо малдын тасма курту.



Суроого жооп тап. Боор курту зыян жеткирген боор же бодо малдын тасма сымал куртунун жумурткалары түшкөн көк чөп желгенде, бул мителер керектөөчүгө жугушу мүмкүнбү?

Төмөнкү табышмактарда келтирилген белгилер кайсы жаныбарга таандык?

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 8. Эки соргучтуу, жапалак, | 9. Узун тасма – ичексиз, |
| Көрүнүшү жаткан жалбырак. | Төрт соргучтуу, илмексиз. |

Жуптук жооптор: а-3, б-4, в-5, г-2, д-1, е-6.


10-§

Жумуру курттар тиби: киши аскаридасы

Жумуру курттар денесинин туурасынан кесилиши жумуру формада, дene формасы жип сымал, ички органдары дene көндөйүндө жайгашкан. Дениздерде, тузсуз суу жана топуракта жашайт; адамдарда, жаныбарларда жана өсүмдүктөрдө мителик кылышат. Бул типке киши аскаридасы мисал боло алат.

Жашоо чойрөсү, тышкы түзүлүшү. Киши аскаридасы узун ичегинин көндөйүндө мителик кылат. Сүйрү денесинин эки учу ичекелешкен, ийик сымал формада. Ургаачысынын узундугу 20–40 см, эркеги 15–20 см болот. Эркек аскариданын күйругу илгекке окшоп ийилген. Аскариданын денеси тышкы жагынан бекем жана катуу кабык – кутукула менен капиталган. Жабышуу органдары өрчүбөгөн; анын серпилгич денеси ичегинин беттерине кадалып турғандыктан ичегиден сыртка чыгып кетпейт.

Тамак сицирүү системасы жана тамактанышы. Тамак сицирүү системасы эки учу ачык түтүкчөгө окшойт. Бул түтүкчө ооз тешигинен башталып, кыска кулкун, кызыл өңгөч, орто ичеги жана арткы ичеги аркылуу арка бөлүп чыгаруу (аналдык) тешиги менен аяктайт. Денесинин алдыңкы учундагы ооз тешиги үч эрин менен курчалган (21-сүрөт). Ал адамдын ичке ичегисинде сицирилип жаткан азыкты оозу аркылуу соруп алат. Азыктын синбеген бөлүгү аналдык тешик аркылуу чыгып кетет.




21-сүрөт. Аскариданын ички түзүлүшү:

- 1 – териси; 2 – оозу; 3 – кулкуну; 4 – ичегиси; 5 – аналдык тешиги;
- 6 – жумурткалары; 7 – жумуртканын ёткөөлү; 8 – жатындар.

Бөлүп чыгаруу, нерв системасы. Бөлүп чыгаруу системасы денени бойлой кеткен эки узун түтүкчөдөн турат. Алар дененин алды жагында биригип, жалгыз тешик менен тышкан ачылат. Денесинин алды жагындағы нерв шакеги кулкунду курчап алган. Мындан денени бойлой алды жана арт жактарга нервдер кетет.

Жыныстык системасы, көбөйүшү жана өрчүшү. Жыныстык системасы бир учу туюк ичке түтүкчөгө окшош болуп, дene көндөйүндө буралып жайлашкан. Ургаачысынын жыныстык органы эки жумурткалыктан, эркегиники бир уруктуктан турат. Ал өтө тукумчул: күнүгө 240 000 ге дейре жумуртка тууйт. Уруктанган, катуу кабык менен капиталган жумурткаларды ээсинин ичегисине тууйт. Жумурткалар заң менен тышкан чыгат (22-сүрөт). Нымдуу жерде жумурткалардын ичиндеги личинкалар өрчүйт. Жумурткалар булганыч кол, жуулбаган жер-жемиштер аркылуу адамдын ичегисине түшкөндө алардан личинкалар чыгат. Алар кан аркылуу өпкөгө барат; андан какырык же шилекей менен оозго түшөт. Алар ооздон дагы ичегиге кайтып түшкөндөн кийин, өрчүп чоноёт жана жумуртка туушту баштайт.



22-сүрөт. Аскариданын өрчүшү:

- 1 – жумурткасы;
- 2 – топурактагы жумурткалары;
- 3 – ургаачысы;
- 4 – эркеги;
- 5 – өпкөгө өтүп жаткан личинка;
- 6 – чонойгон стадиясы;
- 7 – личинкасы.

Аскариданын зыяны. Аскарида менен ооруган адам азып кетет; өңү солгун тартат. Анын курсагы тынымсыз ооруп турат. Ичегидеги аскаридалар атايын дары-дармектин жардамында айдап чы-

гылат. Аскариданы жуктурбастык үчүн жер-жемиштерди, мөмөлөрдү мыктылап жууп, андан соң пайдалануу керек жана өздүк гигиена эрежелерине сөзсүз баш ийүү зарыл.

Жумуру курттардын келип чыгышы. Жумуру курттар дене көндөйүнүн жана аналдык тешиктин болушу, ички органдарынын кыйла татаал түзүлгөндүгү менен жалпак курттардан айырмаланышат. Окумуштуулардын пикири боюнча тарыхый өнүгүү процессинде байыркы жалпак курттардын денесинде дене көндөйү жана арткы чыгаруу тешиги пайда болгон; алардан жумуру курттар келип чыккан.



1. Аскариданы тышкы түзүлүшүнүн өзгөчөлүгү эмнеде?
2. Аскарида ак планарияидан кандайча айырмаланат?
3. Ургаачысы менен эркегинин ортосунда кандай айырма бар?
4. Ички түзүлүшүнө мүнөздүү болгон өзгөчөлүктөрү эмнеде?
5. Аскарида менен ак планариянын окшоштуктары эмнеде?
6. Аскарида кантит өрчүйт?



- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Жумуру курттардын денеси: a) кирпикчелүү эпителий менен капиталган; b) шар сымал, жумуру формада; c) туурасынан кесилиши жумуру. | <ol style="list-style-type: none"> 2. Адам аскариданы жуктурат: a) жер-жемиш, мөмө, булганыч кол аркылуу; b) зыяндуу эт аркылуу; c) суу, эт менен. |
|--|--|



Дене бөлүктөрүн жана алардын түзүлүшүн жуптап жаз.

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> a) ичеги; b) жыныстык системасы; c) бөлүп чыгаруу системасы; d) ургаачысынын күйругу; e) эркегинин күйругу. | <ol style="list-style-type: none"> 1) айрым жыныстуу; 2) денедеги бир жуп түтүкчө; 3) арткы бөлүгү өрчүгөн; 4) курсагына кайрылган; 5) кайрылбаган, түз. |
|---|---|

Сөздүк дептерище жазып ал.

Жумуру курттар, киши аскаридасы, кызыл өнгөч, арткы ичеги, аналдык тешиги, айрым жыныстуу, кутикула.



Суроого жооп тап. Эмне себептен аскарида негизинен жер-жемиш продуктулары аркылуу жугат?

Митечин атын тап жана анын кандай жугушун көрсөт.

10. Ичегиде бар бир чыбык,
Карыш бойлуу бир кызык.
Жатып ичээр, ичек сорот,
Билсөң айтчы, кантит жугат?

Турра жооптор: 1-в, 2-а.

Жуптук жооптор: а-3, б-1, в-2, г-5, д-4.

11-§

Мите курттардын көп түрлүүлүгү

Эхинококк. Эхинококк жалпак курттар тибине, тасма сымал курттар классына кирет. Анын узундугу 0,3–0,6 мм болуп, иттин, карышкырдын, түлкүлөрдүн ичегилеринде мителик кылат (23-сүрөт, 3–4). Башындагы эки жуп соргучунун жардамында ичегинин беттерине жабышып алат. Денеси 5–6 муунакчадан турат; жумурткага толгон ақыркы муунакчасы жаныбарлардын заны менен тышка чыгып кетет; анын ордуна дагы башкасы пайда болот.

Эхинококктун жумурткалары жем-чөп аркылуу бодо мал, кой, жылкы, төө сыйктуу жаныбарлардын ичегилерине түшкөндө, анын



23-сүрөт. Мите курттар:

- 1 – чочконун тасма курту;
- 2 – анын башы; 3 – эхинококк (чоңойгон стадияса);
- 4 – эхинококктун ыйлаакчасы.

личинкалары кан аркылуу өпкө, боор же башка органдарга барып, өтө ири, кээде наристенин башындай, кээде андан да чоң ыйлаакчаларды пайда кылат. Анын ичиндеги суюктукта микроскоптон гана көрүнгөн өтө көп сандагы личинкалар болот. Иттер, жырткыч жаныбарлар чөп жечү жаныбарлардын ички органдары менен кошо мына ошондой ыйлаакчаларды жегенде алардын ичегилеринде личинкалар чоноёт. Жаныбарлардын ичегисинен заны менен бирге өтө көп эхинококк жумурткалары тышка чыгып турат. Жумурткалар жаныбарлардын түктөрүнө да жабышат. Адам ооруган итти сылаганда эхинококктун жумурткаларын жуктурат. Адам, жаныбарлар эхинококктун аралык ээси, ал эми ит жана башка жырткыч жаныбарлар анын негизги ээси болуп саналат.

Чочконун тасма сымал курту жалпак курттар тибинин тасма сымал курттар классына кирет. Анын түзүлүшү жана жашоосу бодо маалдын тасма сымал куртунукуна окшош болуп, чоңойгон стадиясында адамдын ичегисинде, личинкасы болсо чочколордун этинде жашайт. Адам жакшы бышпаган чочконун этин жеп, бул митенин финнасын өзүнө жуктурат (23-сүрөт, 1–2).

Балдардын чүчөк курту. Ал жумуру курттар тибине кирет. Адамдардын, айныкса, кичүү жаштагы балдардын ичегисинде мителиктүү кылат. Чүчөк – агыш түстөгү, өтө майда (5–10 мм) курт. Ургаачысы уруктангандан кийин арткы чыгаруу тешигине жакын жерде жашай баштайт. Түнкүсүн ошол жердеги териге жумуртка тууйт. Бул убакта тери катуу кычышып, адамдын тынчын алат. Чүчөк куртунун жумурткалары булганыч кол аркылуу кайра ичегиге түшүп калса, анда ал дагы кайрадан өрчүй баштайт. Чүчөк куртунун жумурткалары оорулуу адамдын кийимдери, төшөгү же башка буюмдары аркылуу жугат.

Ришта – жумуру курттар тибине таандык мите жаныбар. Тропик жана субтропик өлкөлөрдө тарапланып, денеси жипке окшош, узундугу 32 см ден 100 см ге чейин болот. Ришта бут, кәэде кол терисинин астындағы бириктириүүчү тканда мителиктүү кылат. Теринин ришта менен жабыркаган жеринде нымдуу жаракат пайда болот. Жаракаттан ришта денесинин бир бөлүгү чыгып турат. Денесинин калган бөлүгү жаракаттын астында түрмөк жиптей оролуп жатат. Ришта тириүү личинкаларды туп көбөйөт. Ришта менен жабыркаган адам же жаныбар сууга түшкөндө личинкалар сууга түшөт. Аларды судагы өтө майда рак сымалдардан болгон циклоптор жутуп жиберет. Адам же жаныбар циклоптуу сууну иченде риштанын личинкасы аларга өтөт. Адамдын денесинде личинка бир жыл бою жашап өсөт.

Калкты таза ичилүүчү суу менен камсыздоонун натыйжасында Өзбекстанда ришта элдин арасында жоюлган. Учурда ришта менен жабыркоо жаныбарлардын арасында кездешип турат.

Бөртмө нематода. Өсүмдүктөрдүн жердин астынкы бөлүгүндө мителиктүү кылат. Ооруга чалдыккан өсүмдүктүн тамырында буурчактай жана андан ирирәэк (кәэде муштумдай) бөртмөлөр пайда болот. Мындаид өсүмдүк өсүүдөн жана өрчүүдөн калат, анын түшүмдүүлүгү төмөндөйт; күчтүү жабыркаган өсүмдүктөр бат эле кургап калат.

Нематода айныкса бадыранга, помидорго, картошкага, кенафка, кээде гозого да чоң зыян келтириет.

Курттардын мителик жашоого ылайыкташуусу. Мителик жашоо курттардын тышкы түзүлүшүнө жана жашоо өзгөчөлүктөрүнө чоң таасирин тийгизген. Мындай өзгөрүүлөр жалпак курттарда айныкса таасын көзгө көрүнөт. Аларда атايын жабышуу органдары пайда болгон; тамак сицирүү системасы жоголуп, жыныстык органдары өтө күчтүү өрчүгөн. Бирок мите курттардын жана алардын личинкаларынын көпчүлүгү тышкы чөйрөгө чыкканда өзүнүн ээсин таба алbastan кырылып кетет. Ошондуктан алар өтө тукумчул келишет; кээ бир түрлөрү, мисалы, боор курту жана эхинококтор атүгүл личинкалык стадиясында да көбөйүү өзгөчөлүгүнө ээ болушат.

Мите курттардан сактануу. Тасма сымал курттарды жуктурбастык үчүн эт продуктуларын жакшы бышырылгандан кийин пайдалануу керек. Алардын таралышын алдын алуу үчүн болсо жаныбарлардын ооруга чалдыккан органдарын иттерге бербестик керек. Күшканалардан чыккан эт продуктуларын катуу көзөмөлгө алуу зарыл. Тентиген иттерге каршы күрөшүү жана өздүк гигиена эрежелерине баш ийүү эхинокок менен жабыркоонун алдын алат. Боор куртун жуктурбастык үчүн көлмө сууларынан ичпестик, талаадан терип келинген көктөрдөн жакшы жуубастан туруп пайдаланбастык керек. Аскариданы жана балдар чүчөк куртун жуктурбастык үчүн өздүк гигиена эрежелерине сөзсүз баш ийүү керек, б.а. тамактандан мурда колду самындан жууш, мөмөлөрдү жана жер-жемиштерди суга жакшы жууп, андан кийин алардан пайдалануу керек.

Мите курттарды үйрөнүү. Мите курттарды *гельминтология* илими үйрөнөт. Гельминттерди үйрөнүү жана аларга каршы күрөш чарапаларын иштеп чыгууда К. И. Скрябин жетекчилигинdegи гельминтолог окумуштуулар көп иштерди аткарышкан. Бул ишке биздин мекендештерибиз да чоң салымдарын кошушкан. Ибн Сина өзүнүн «Медицинанын канондору» аттуу чыгармасында дарылык чөптөрдүн жардамында адам ичегисинен мите курттарды айдал чыгаруу жөнүндө жазган. Өзбек окумуштууларынан А. Т. Тулаганов өсүмдүктөрдүн, М. А. Султанов, Ж. А. Азимов жана Э. Х. Эргашевдер жапайы жана үй айбандарынын гельминттерин үйрөнүшкөн. Алардын изилдөөлөрү мите курттар жеткирген зыянды кескин азайтуу мүмкүнчүлүгүн берди.



1. Эхинококк кандай түзүлгөн?
2. Эхинококк кандай өрчүйт?
3. Балдардын чүчөк курту кантип көбөйөт?
4. Чочконун тасма сымал курту кандай өрчүйт?
5. Бөртмө нематода кандай зыян келтириет?
6. Курттардын мителик жашоого ылайыкташусунун белгилери кайсылар?
7. Мите курттардын жукпастыгы үчүн эмне қылуу керек?



- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Эхинококкун аралык ээси: | <ol style="list-style-type: none"> 2. Балдардын чүчөк курту: |
| a) адам, чөп жечү жаныбарлар; | a) булганыч кол аркылуу; |
| b) жырткыч жаныбарлар; | b) суу аркылуу; |
| c) омурткасыз жаныбарлар. | v) жер-жемиш, мөмө, та-
мак-аш аркылуу жугат. |



Курттарды жана алардын ээлерин жуптап жаз.

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> a) аскарида; b) эхинококк; c) тасма сымал курт; d) боор курту. | <ol style="list-style-type: none"> 1) жырткыч жаныбарлар; 2) түзсүз суу үлүлү; 3) ири мүйүздүү малдар; 4) адам. |
|---|---|

Сөздүк дептериңе жазып ал.

Эхинококк, балдардын чүчөк курту, чочконун тасма сымал курту, бөртмө нематода, тукумчулук, өздүк гигиена.



Суроого жооп тап. Балдардын чүчөк курту жаш балдардын организминде жашайт. Бул мите чоң жаштагы адамдарга да жугушу мүмкүнбү?

Туура жооптор: 1а, 2б.

Жуптук жооптор: а-4, б-1, в-3, г-2.

V
ГЛАВА

МУУНАКТУУ КУРТТАР ТИБИ

Муунактуу курттардын денеси көп сандуу муунактарга бөлүнгөн. Алардын сицирүү, бөлүп чыгаруу, кан айлануу, нерв, жыныстык системасы өрчүгөн. Ага көп түктүү муунактуулар, аз түктүү муунактуулар жана сүлүктөр класстары кирет.


Сөөлжандын тышкы түзүлүшү, нерв системасы жана өрчүшү

12-§

Сөөлжан муунактуу курттар тибинин аз түктүүлөр классына кирет. Аз түктүүлөр топуракта жана тузсуз сууларда жашашат.

Жашоо чөйрөсү жана тышкы түзүлүшү. Сөөлжандар чириндиге бай нымдуу топурактарда жашашат. Аны арыктардын боюнан, беде, жер жемиш жана бакча эгиндери эгилген талаалардын топурагынан кездештириүүгө болот. Күчтүү нөшөрдөн кийин кээде көптөгөн санда жердин бетине чыгып калгандыгы себептүү аларды **жамғыр сөөлжандары** деп да аташат.

Сөөлжандын денесинин узундугу 8–10 см, алдыңкы учу конус сымал келет. Денеси шакекке окшош чоюлмалар менен көп сандагы муунакчаларга бөлүнгөн (24-сүрөт). Ар бир дene муунчасынын курсак жагында төрт жуптан кыска жана ичке түктөр жайлышкан. Түктөр кыймылдагы сөөлжан үчүн таянычтын милдетин



24-сүрөт. Сөөлжандын сырткы түзүлүшү:

A – каптал жагынан көрүнүшү; B – курсак жагынан көрүнүшү; 1 – оозу; 2 – каптал түтүктөрү (кылчалары); 3 – курсак түктөрү; 4 – курчоосу; 5 – жыныстык тешиктер.



Сырткы түзүлүшү топуракта ийин оюп жашоого ылайыкташкан. Сөөлжан аракеттенгенде алдыңкы бөлүгүндөгү муунак булчундар жыйрылып, денеси чоюлат жана ичкерет; ал денесинин алдыңкы учун топурак бөлүкчөлөрүнүн арасына киргизет. Ошондон кийин дененин беттериндеги узатасынан кеткен булчундар жыйрылат; денесинин алдыңкы бөлүгү жоондошуп топурактын бөлүкчөлөрү сүрүлөт. Сөөлжан денесинин арт жагын тартып алат жана өзүнө жол ачат. Түктөрү сөөлжан аракеттенген учурда таянычтын милдетин аткарат. Теринин үстүндөгү былжырлуу жаргак анын жылышын женилдештириет.

Дене көндөйү. Суюктук менен толгон дene көндөйүндө ички органдары жайлашкан. Бул көндөй жука жаргактардан турган туурасынан жаткан тосмолор менен өз алдынча бөлмөлөргө ажыраган. Дене көндөйү бөлмөлөрүнүн саны тышкы дene муунактарынын санына барабар. Дене көндөйүнүн ички бети бир катмар болуп жайлашкан эпителийден турат.

Нерв системасы. Денесинин алдыңкы бөлүгүндөгү нерв клеткалары чогулуп, кулкун үстү, кулкун асты ири нерв түйүндөрүн түзөт (26-сүрөт). Аларды кулкундуң эки жагынан айланып өткөн


аткарат. Алдыңкы жагындағы бир нече дene муунчалары жоондошуп, атайын курчоону пайда кылат.

Тери-булчун баштыкчасы. Сөөлжандын денеси бир қабат эпителий клеткалардан турган жука тери менен капиталган (25-сүрөт). Алар чыгарган былжырлуу зат терини тынымсыз нымдал турат. Теринин астында шакек сымал узатасынан кеткен булчундар жайлашкан. Булчундардын астындағы ички эпителий катмары дene көндөйүн курчап турат. Тышкы жана ички эпителий, шакек сымал узатасынан кеткен булчундар *тери-булчун баштыкчасы* деп аталган дененин бетин түзөт. Дененин көндөйүндө ички органдар жайлашат.

Кыймыл-аракети.

Сөөлжан денесинин

жыйрылышынан кийин оюп жашоого ылайыкташкан.



26-сүрөт. Сөөлжандын ички түзүлүшү:

1 – оозу; 2 – кулкуну; 3 – кызыл өңгөч; 4 – жемсөөсү; 5 – карыны; 6 – ичегиси;
7 – жүргөү; 8 –арка кан тамыры; 9 – курсак кан тамыры; 10 – дене көндөйүнүн
тосмосу; 11 – кулкун үстүндөгү нерв түйүнү; 12 – кулкундун астындагы нерв түйүнү;
13 – курсак нерв тизмеги.

шакек нерв талчалары бириктирет. Кулкун астындагы нерв түйүнү курсакты бойлой кеткен нерв чынжыры менен туташкан. Курсак нерв чынжырында ар бир дене муунагынын каршысында бирден нерв түйүнчөлөрү орун алган. Бардык нерв түйүндөрүнөн териге жана ички органдарга нервдер чыгат.

Сезүү органдары жана рефлекс. Сөөлжандардын атайын сезүү органдары болбойт. Ал терисинен орун алган сезгич нерв талчаларынын учтары аркылуу жарыкты, температуралы, химиялык жана механикалык таасирди мыкты сезет.

Сөөлжандын рефлекси кыйла татаал жана түрдүүчө. Денесинин каерине таасир этсек, ошол жери дүүлүгүп, кыймылга келет. Рефлекстердин жардамында сөөлжан азыгын издең табат, душмандарынан сактанат, күчтүү жарыктан жана ысыктан жашынат.

Көбөйүшү. Сөөлжандар – гермафродиттик жаныбарлар. Көбөйүү учурунда эки сөөлжан бирин-бири уруктандырат. Сөөлжан жумуртка тууш мезгилинде курчоосунан былжырлуу зат бөлүп чыгарат. Бул заттан пилла пайда болот. Ар кайсы пиллага 2–3, кээде 6 дан 20 га дейре жумуртка туйт. Пилла сөөлжандын денесинен жылбышып топуракка түшөт. Пилладагы жумурткалардан бир айдан кийин жаш сөөлжандар чыгат. Сөөлжандар бир нече жыл жашайт.

Регенерациясы. Сөөлжандар да гидра же ак планария сыйктуу жаракат жерин калыбына келтирүү касиетине ээ. Сөөлжандын деңеси үзүлүп калганда андан жаңы сөөлжандар пайда болот.



1. Сөөлжандын тышкы көрүнүшү кандай түзүлгөн?
2. Тери-булчун баштыкчасы кандай түзүлгөн?
3. Сөөлжан кантип аракеттепет?
4. Дене көндөйү кандай түзүлгөн?
5. Сөөлжандын нерв системасы кандай түзүлгөн?
6. Сөөлжан кантип сезет?



1. Сөөлжандын дене көндөйү:

 - a) жука жаргактан турат;
 - b) бир катмарлуу эпителий менен капиталган;
 - c) жаргак тосмолор менен өз алдынча бөлмөлөргө бөлүнгөн.

2. Сөөлжан жумурткаларын:

 - a) пилланын ичине туйт;
 - b) ургаачысынын жатынына коёт;
 - c) топуракка туйт.

Сөздүк дептериңе жазып ал.

Аз түктүүлөр, муунакчалуу сөөлжандар, жамгыр сөөлжаны, тери, шакек сымал булчундар, узатасынан кеткен булчундар, тери-булчун баштыкчасы, түкчөлөр, нерв талчалары, дене курчоосу.



Суроого жооп тап. Сөөлжан түзүлүшүнүн кайсы өзгөчөлүктөрү анын кыймылынын бир топ татаалдашуусуна мүмкүнчүлүк берет?

Табышмакта кайсы жаныбардын көрүнүшү жана жашоосу жөнүндө маалымат берилген.

11. Кызыл чыбык жер казат,
Бир кызарат, бир азат.

Туура жооптор: 1в, 2а.

13-§

Сөөлжандын ички түзүлүшү


Тамак сицириүү системасы. Ооз тешиги денесинин алдыңкы учунда, биринчи дене муунакчасынын астында жайлашкан. Ооз кыска кулкун аркылуу кызыл өнгөчкө туташкан (34-сүрөт). Кызыл өнгөчтүн кеңижен кийинки бөлүгү жемсөө деп аталат. Жемсөө кичигирээк карынга ачылат. Карындан дененин арт жагын карай ичеги кетет. Сөөлжандар чириген өсүмдүк калдыктары менен тамактанат; чириндини топурак менен бирге кошуп ичегисинен өткөрөт. Азык

иچегиде зилдин таасиринде өздөштүрүлөт. Азыктын курамындагы заттар канга сорулат. Азыктын сиңбеген бөлүгү аналдык тешиги аркылуу тышка чыгарылат.

Кан айлануу системасы. Кан айлануу системасы баштап муунактуу курттарда пайда болгон. Сөөлжандын кан айлануу системасы өз ара туташкан ири арткы жана курсак кан тамырларынан турат (26-сүрөт). Бул эки ири кан тамыр шакек сымал тамырлар аркылуу туташкан. Кызыл өңгөчтүн айланасында жайлышкан 5–6 жоон шакек сымал тамырлардын беттери булчундар менен жабдылган. Тамырлар жыйрылуу касиетине ээ болгондуктан, «жүрөк» деп аталат. Шакек сымал жана ири кан тамырлардан денедеги түрдүү органдарга майда кан тамырлары тараплат. Бул тамырлар органдарда өтө майда тамырларга бөлүнөт. Алар капиллярлар деп аталат. Капилляр тамырлар териде жана ичигинин беттеринде көп болот. Кан арткы тамырды бойлой дененин алды жагына, курсак тамырды бойлой арт жакка агат. Сөөлжандын каны кан тамырларда гана агат. Ошондуктан кан тамырлар *туюк (жабык) кан айлануу системасын* түзөт. Кан аркылуу кычкылтек жана азык заттар ташылат.

Дем алыши. Сөөлжандар тери аркылуу дем алышат. Кычкылтек тери аркылуу капиллярлардагы канга өтүп, бардык органдарга тараплат. Зат алмашуунун натыйжасында пайда болгон көмүр кычкыл газы (карбонат ангидрид) да тери аркылуу чыгып кетет. Сөөлжандын териси былжыруу зат менен нымдалып турат. Нымдуу тери кычкылтехи жакши өткөрөт.

Бөлүп чыгаруу системасы. Бөлүп чыгаруу системасы дene муунакчаларында бир жуптан жайлышкан, сыйыртмакка окшош ичке узун түтүкчөлөрдөн турат (27-сүрөт). Түтүкчөлөрдүн бир учу дene көндөйүнө, экинчи учу болсо тери аркылуу тышка ачылат. Түтүкчөлөрдүн дene көндөйүнө ачылган учу куйгучка (воронкага) окшоп кенейген болуп, өтө көп кирпикчелер менен капиталган. Бул



кирпикчелердин кыймылы натыйжасында зыяндуу заттар дененин суюктугу менен бирге түтүкчөлөргө өтөт жана теридеги тешикчелер аркылуу чыгарып жиберилет.

Муунактуу курттардын көп түрдүүлүгү жана мааниси. Муунактуу курттар жаратылышта чоң мааниге ээ. Сөөлжандардын 180 ден ашуун түрү бар. Алар топуракты жумшартып, суунун жана абанын өтүшүн жакшыртат, чириндиге байытат. Бир гектар аянттагы сөөлжандар жыл бою 250–600 т топуракты кайра иштеши аныкталган. Сөөлжандардын кәэ бир түрлөрүнөн мал чарбачылыгынын жана үй-тиричилик таштандыларын кайра иштеп, жер-жемиш жана бакча эгиндери үчүн кымбаттуу жер семирткич болуп саналган биогумус алууда пайдаланылат. Сөөлжандын өзү да қуштар, айрым сүт эмүүчүлөр жана топурак жаныбарлары үчүн азық болот. Алар үй канаттуулары үчүн белокко бай тоюмдуу азық саналат. Канаттуулардын азыгына сөөлжан кошуп берилгенде, алар көп жумуртка берген.

Тузсуз сууларда жашаган аз түктүү кызыл сөөлжандар (28-сүрөт) сууну ар түрдүү булганыч заттардан тазалап, санитардык мильтин аткарат. Алар түрдүү суу жаныбарлары, ошонун катарында балыктар үчүн негизги азық болуп саналат. Тузсуз суу сөөлжандары аквариум балыктары үчүн азық иретинде көбөйтүрүлөт.



28-сүрөт. Ар түрдүү муунактуу курттар:

1 – нереида; 2 – отурукташып жашоочу дениз көп түктүүлөрү; 3 – кызыл сөөлжан.

Көп түктүүлөр классы. Көп түктүүлөр денизде сүзүп жүргөн же дениз түбүндө жабышып жашаган 5 000 түрдү өз ичине алат.

Дениздердин түбүндө жашаган муунактуу курт *нереиданын* башы дenesинен өзгөчө түзүлүштө; дenesи көп сандагы узун түктөр менен капталган. Түктөр денинин эки жагындагы булчундуу өсүндүлөрүн-дө топ-топ жайлашкан. Курттар өсүндүлөрүнүн жардамында сүзөт

же суу түбүндө жөрмөлөп жүрүштөт. Бул өсүндүлөр алгачкы жолу пайда болгон буттар болуп саналат. Алар балыктар үчүн негизги азық болуп саналат.

Сұлуктөр классы. Сұлуктөргө тузсуз сууларда жашап, хорда-луулардын канын соро турган же жырткыч жашай турган 400 гө жакын түр кирет. Медициналык сұлуктөн медицинада кан тамыр ооруларын айыктырууда пайдаланылат. Бул сұлук атайын заводдордо көбөйтүрүлөт.

Муунактуу курттардын келип чыгышы. Муунактуу курттар эркин жашаган байыркы жалпак курттардан келип чыккан. Дениздерде жашаган көп түктүү муунактуулардын личинкасынын денесинде кирпикчелердин болушу, личинканын бөлүп чыгаруу системасынын жалпак курттардын бөлүп чыгаруу системасына окшоштугу ушунун далили болуп эсептелет. Аз түктүү муунактуу курттар болсо көп түктүү муунактуулардан келип чыккан.

1. Сөөлжандын тамак синириүү системасы кандай түзүлгөн?
2. Кан айлануу системасы кандай түзүлгөн?
3. Кан кандай милдет аткарат?
4. Сөөлжан кантип дем алат?
5. Сөөлжандын бөлүп чыгаруу системасы кандай түзүлгөн?
6. Муунактуу курттар кандай мааниге ээ?
7. Муунактуу курттар кандайча келип чыккан?



1. Сөөлжандын бөлүп чыгаруу системасы:
 - а) көп бутакталган түтүкчелөрдөн турат;
 - б) арткы чыгаруу тешигине ачылат;
 - в) сыйыртмак сымал ийилген ичке түтүкчөлөрдөн турат.
2. Сөөлжандын жүрөгүнүн милдетин:
 - а) ичеги үстү кан тамыры аткарат;
 - б) кулкундуң шакек сымал кан тамыры аткарат;
 - в) ичеги асты ири кан тамыры аткарат.

Сөздүк дептерине жазып ал.

Карын, кан айлануу системасы, кан тамырлары, капиллярлар, туук кан айлануу системасы, биогумус, нерейда, көп түктүүлөр, аз түктүүлөр.

Суроого жооп тап. Сөөлжан түзүлүшүнүн кайсы өзгөчөлүктөрү анын топурактын ичинде жашашына мүмкүнчүлүгүк берет?

Табышмакта берилген жаныбардын жашоосу жөнүндө маалымат бер.

12. Жер астында бир чыбык,
Жер айдаганы кызык.

Туура жооптор: 1в, 2б.



2-лабораториялык машигуу. Сөөлжандын тышкы түзүлүшү, кыймылы жана рефлекс пайда кылышы

Керектүү жабдуулар. Тирүү ири сөөлжан, сөөлжан салынган ным топурактуу ваннача, кол лупасы, сызгыч, картон кагаз, энтомология ийнечелери же утталган калем.

Тирүү сөөлжанды топурактан алып, төмөнкү иштерди аткар:

1. Денесинин алдыңкы конус сымал ичкеleshкен жана кийинки бир топ томпок жагын аныкта. Лупанын жардамында сөөлжан алдыңкы жагынын асткы бөлүгүндө жайлашкан ооз көндөйүн жана кийинки учундагы арткы чыгаруу тешигин тап.

2. Дене муунактарын лупанын жардамында санап чык, анын түрдүү бөлүктөрүндөгү алкактардын чоң-кичинелигин аныкта.

3. Дененин карамтыр бөртмө арка жана агыш тегиз курсак жагын, ошондой эле ири арка жана курсак кан тамырларын тап жана алардын багытын аныкта.

4. Сөөлжанды бир барак жылмакай болбогон кургак кагаздын үстүнө кой. Сөөлжан кагаздын үстүндө аракеттенгенде, анын түктөрүнүн кагазга сүртүлүшү натыйжасында шытыраган үн чыгышын тыңша.

5. Өтө абайлоо менен манжанды сөөлжандын курсагын бойлой арт жактан алдын карай, андан кийин алдынан арт жакты карай жүргүз. Мында сөөлжан түктөрүнүн манжана тийишин сезесин.

6. Лупанын жардамында дене муунактарынын курсак жагында жайлашкан түктөрүн тап.

7. Сөөлжанды айнектин жана жылмакай болбогон кагаздын үстүнө коюп, анын кыймылына байкоо жүргүз. Анын айнектин үстүндө кыйын аракеттенишинин себебин түшүндүр.

8. Чөптү же калемдин учун сөөлжан денесинин түрдүү жерлерине тийгизип, сөөлжандын дүүлүгүшүнө байкоо жүргүз.

9. Сызгыч менен сөөлжан денесинин узундугун түрдүү абалдарда өлчөп көр. Сөөлжандын сүрөтүн тартып, органдарын көрсөт.

10. Сөөлжанды топурактын үстүнө коюп, анын топурак бөлүкчөлөрүнүн ичине киришине байкоо жүргүз.

VI
ГЛАВА

МОЛЛЮСКАЛАР ТИБИ

Моллюскалардын денеси мантия тери менен канталган. Мантия раковинаны пайда кылат. Мантия менен дененин ортосунда мантия көндөйү болот. Алардын денеси көндөйлүү ткань менен толгон. Кан айлануу системасы ачык, жүрөгү өрчүгөн.

14-§


Курсак буттуу моллюскалар классы

Курсак буттуулар менен үлүлдүн мисалында таанышабыз.

Жашоо чөйрөсү, тышкы түзүлүшү. Кадимки көлчүкчү үлүл көлмө, көлдөрдө, дарыялардын жай аккан тайыз жерлеринде жашайт. Денеси спираль сымал буралган раковинанын ичинде. Раковинанын кенейген учунда денеси чыга турган тешиги болот. Былжырлуу денесин мантия тери курчап турат. Мантиядан раковина куралат. Башынын төмөнкү жагында ооз тешиги, анын эки канталында бир жуп тинтүүрү болот. Тинтүүрлөрү сезүү органдары саналат. Ар бир тинтүүрдүн негизинде бирден көзү бар (29-сүрөт). Кадимки үлүл бут булчундарынын толкун сымал жыйрылуусу натыйжасында сыйгаланып аракет жасайт.

Тамак сицириүү системасы ооз көндөйү, кулкун, кызыл өнгөч, карын жана ичегиден турат. Ичегиси раковинанын ичинде шакек сымал буралып жайлашкан. Мантиянын четинде арткы бөлүп чыгаруу тешиги болот (30-сүрөт).

Кадимки үлүлдүн кулкунунда майда тишчелер менен канталган булчундуу тилчеси болот. Ал тилин чыгарып өсүмдүктөр менен суудагы нерселерге жабышкан бактерия жана майда балырларды кырып алат. Бир




29-сүрөт. Көлчүкчү үлүлдүн сырткы түзүлүшү:

- 1 – раковинасы; 2 – мантиясы;
- 3 – денеси; 4 – тинтүүрү; 5 – көздөрүү;
- 6 – башы; 7 – дем алгыч тешиги;
- 8 – буту.

30-сүрөт. Көлчүкчү ұлұлдун ички түзүлүшү:

1 – оозу; 2 – тили; 3 – кулқуну; 4 – кызыл өңгөчү; 5 – карыны; 6 – ичегиси; 7 – аналдық тешиги; 8 – өпкө; 9 – толтосу; 10 – карынчасы; 11 – жүрөгү; 12 – боору; 13 – кан тамырлары.



жуп шилекей бэзи да кулкунга ачылат. Шилекей суюктугу тамакты синириүгө жардам берет. Көлчүк ұлұлұнун боору карын көндөйүнө тамак синириүү зилин иштеп чыгарат.

Дем алуу системасы. Көлчүкчү ұлұл атмосфералык кычкылтек менен дем алат. Раковинанын четинде дем алуучу тешиги бар (30-сүрөт). Бул тешик баштыкча сымал өпкөгө ачылат. Өпкөнүн бети өтө көп майда кан тамырлары менен капталган. Өпкөдөгү абадан канга кычкылтек өтөт, кандан көмүр кычкыл газы чыгат. Дем алуу үчүн моллюска суунун бетине көтөрүлөт жана өпкөсүн аба менен толтуруп алат.

Кан айлануу системасы. Жүрөгү денесинин арт жагында жайлашкан, ал жүрөк толтосу менен жүрөк карынчасынан турат. Жүрөктүн камералары алмак-салмак жыйрылып, канды тамырларга түртөт. Кан тамырларынын учу ачык болуп, кан алардан ички органдарга куюлат. Бул жерде кычкылтекти ткандарга берип, өзү көмүр кычкыл газы менен байыйт. Андан кийин тамырлар аркылуу өпкөгө келет. Өпкөдө кычкылтек менен каныккан кан жүрөк толтосуна куюлат. Азык заттар да кан аркылуу ткандарга ташылат. Ошентип, моллюскалардын кан тамырлары ачык кан айлануу системасын түзөт.


Бөлүп чыгаруу системасы. Көлчүкчү ұлұлдун тасмага окшош жалғыз бөйрөгүнүн түзүлүшү сөөлжандын бөлүп чыгаруу органына окшойт. Бөйрөктүн куйгуч сымал кениген учу жүрөк толтосуна, экинчи учу болсо мантиянын четине ачылат.

Нерв системасы. Көлчүкчү ұлұлдун денесинде бир нече жуп нерв түйүндөрү жайлашкан. Бул түйүндөрдөн моллюскалардын бардык органдарына нервдер чыгат.

Көбөйшү. Көлчүкчү ұлұл – гермафродиттик жаныбар. Ал узун былжырлуу жипчелердин ичине абдан көп жумуртка тууйт. Жу-

мурткалары (жипчелери) балырларга илешип калат. Алардан назик раковиналуу кичинекей моллюскалар чыгат.

Курсак буттуу моллюскалардын көп түрдүүлүгү. Курсак буттуу моллюскалар Жер бетинде көнкинен тарапталган, алардын 100 000 ге жакын түрү бар. Айныкса алар деңиздерде көп түрдүү болушат. Тузсуз сууларда көздешкен кичине үлүлдөр боор куртунун аралык ээси эсептелет. Ар түрдүү жыланач үлүлдөр жана жүзүм үлүлү (31-сүрөт) кургакта жашайт. Алар өсүмдүктөрдүн жашыл денеси менен тамактанып, эгиндерге чоң зыян келтиришт. Өзбекстандын территориясында жыланач үлүлдөр жана беде үлүлү, көлмөлөрдө ар түрдүү үлүлдөр көздешет.



31-сүрөт. Курсак буттуу моллюскалар:

- 1 – жүзүм үлүлү;
- 2 – жыланач үлүл;
- 3 – битиния;
- 4 – тирүү туугуч.



1. Тышкы түзүлүшүнүн өзгөчөлүктөрү өмнеде?
2. Үлүлдүн тамак сицирүү системасы кандай түзүлгөн?
3. Көлчүкчү үлүл кантип дем алат?
4. Көлчүкчү үлүлдүн кан айлануу системасы кандай түзүлгөн?
5. Үлүлдүн бөлүп чыгаруу системасы кандай түзүлгөн?
6. Көлчүкчү үлүл кандайча көбөйөт?
7. Курсак буттуулар кандай маанигэ ээ?



1. Көлчүкчү үлүлдүн көздөрү:
 - а) раковинанын негизинде жайлышкан;
 - б) тинтүүрлөрүнүн учунда жайлышкан;
 - в) тинтүүрлөрүнүн негизинде жайлышкан.
2. Көлчүкчү үлүлдүн жүрөгү:
 - а) жүрөк толтосу менен карынчасынан турат;
 - б) түтүкчө сымал, эки камералуу;
 - в) эки камерадан жана бир карынчадан турат.



- Моллюскаларды алардын маанилери менен жуптап жаз.
- | | |
|------------------|-------------------------------|
| а) кичине үлүл; | 1) Өзбекстанда көздешпейт; |
| б) жүзүм үлүлү; | 2) боор куртунун аралык ээси; |
| в) жыланач үлүл. | 3) эгиндерге зыян келтиришт. |

Сөздүк дептериңе жазып ал.

Курсак буттуулар, кадимки көлчүк үлүлү, мантия, шилекей бездері, боор, өпкө, жүрөк, жылаңаң үлүл, жүзүм үлүлү, ачық кан айлануу системасы.



Суроого жооп тап. Кадимки көлчүк үлүлүнүн көздөрү тинтүүрлөрүнүн негизинде, ал эми жылаңаң үлүлдүн көздөрү болсо тинтүүрлөрүнүн учку бөлүгүндө жайлашкандығы алар жашоосунун кайсы өзгөчөлүктөрү менен байланыштуу болушу мүмкүн?

Табышмакты тап, андагы жаныбардын кыймылына мүнөздөмө бер.

13. Арык жээгинен кашаң ат өттү,
Тайгаланып, жол салып кетти.

Туура жооптор: 1в, 2а.

Жуптап жазуу: а-2, б-1, в-3.


15-§

Кош капкалуу жана баш буттуу моллюскалар класстары

Кош капкалуу моллюскалар дениз жана түзсуз сууларда кенири тараалган. Алардан тишиздин түзүлүшү менен таанышбыз.

Жашоо чөйрөсү жана түзүлүшү. Тишиздин раковинасынын сырты мүйүз заттан турат, ички бети ар түрдүү түстө жаркыраган седеп менен капталган. Раковинанын капкаларынын ички бетинде бир жуп жабуучу булчундар орун алган. Бул булчундар кыскарганда капкалар жабылат. Булчундар бошошкондо болсо арт жактагы серпилгич байламталар тартылып, раковинанын капкалары ачылат.

Тишиздин раковинасынын сырты мүйүз заттан турат, ички бети ар түрдүү түстө жаркыраган седеп менен капталган. Раковинанын капкаларынын ички бетинде бир жуп жабуучу булчундар орун алган. Бул булчундар кыскарганда капкалар жабылат. Булчундар бошошкондо болсо арт жактагы серпилгич байламталар тартылып, раковинанын капкалары ачылат.

**32-сүрөт. Тишсиз:**

А – раковинанын үстү жагынан көрүнүшү; Б – раковинасы ачып көрсөтүлгөн:
 1 – раковинасы; 2 – жапкыч булчун; 3 – жапкыч булчун бириккен жер; 4 – чыгаруучу сифон; 5 – киргизүүчү сифон; 6 – бакалоорлору; 7 – мантия; 8 – буту.

Раковинанын арткы учурун жогорку жана төмөнкү жактарында жылчык сымал эки тешик – *сифондору* болот. Төмөнкү кириү сифону аркылуу мантия көндөйүнө суу кирип, жогорку чыгаруу сифону аркылуу чыгат. Чыгаруу сифонуна арткы чыгаруу, бөлүп чыгаруу жана жыныстык органдарынын тешиктери ачылат.

Тамактанышы. Ооз тешиги бутунун негизинде жайлашкан. Кирүү сифону аркылуу мантия көндөйүнө суу менен кошо органикалык заттар, жөнөкөй жана микроскоптук жаныбарлар кирет. Оозунун алдында жайлашкан эки жуп тинтүүрү азыкты кармап калат жана тамак синириүү системасына жөнөтөт.


Дем алуу системасы. Дем алуу органы болуп саналган бакалоорлору бутунун эки капиталындагы мантия көндөйүндө жайлашкан (32-сүрөт, Б). Бакалоорлордун кыймылы натыйжасында суу мантия көндөйүнө кирет жана бакалоорлорду жууп, чыгаруу сифону аркылуу чыгып кетет. Сууда эриген кычкылтек бакалоорлорго өтөт, бакалоорлордон болсо көмүр кычкыл газы сууга бөлүнүп чыгат. Кычкылтек бакалоордон кандын агымы менен бардык органдарга таралат.

Кан айлануу, бөлүп чыгаруу, нерв системалары үлүлдүкүнө окошош. Денесиндеги үч жуп нерв түйүндөрү нерв талчаларынын жардамында өз ара туташкан. Атайын сезүү органдары болбойт.

Көбөйүшү жана өрчүшү. Тишсиз айрым жыныстуу, бирок эркеги менен ургаачысын айырмалоого болбойт. Жумурткалары бакалоорлордун сыртында өрчүйт. Жумуртқадан чыккан личинкалар сууга түшөт. Алар раковинасындагы тишче же жабышкак жипчелери

жардамында балыктардын терисине жабышып, мителик жашоого өтөт. Митенин таасиринде балыктын терисинде шишик пайда болот. Шишиктин ичинде личинка өтө майда тишизге айланат жана суунун түбүнө түшүп чоңоёт.

Кош капкалуулардын көп түрдүүлүгү. Алар 30000 ден ашуун түрдү өз ичине алат. Көпчүлүк түрлөрү деңиздерде жашайт. Эң ириси – *тридакнанын* салмагы 250 кг га жетет. *Устрица, таракча жана мидиялар* (33-сүрөт) эти үчүн кармалат, деңиз берметчелүүлөрүнөн бермет алынат. Айрым өлкөлөрде берметчелүүлөр, мидиялар, устрицалар өрчүтүлөт. Тишиздин личинкасы балыктарда мителик кылат. Шор сууларда таралган *дрейсеналар* көбөйүп, суу өткөргөн ноолорду иштен чыгарышы мүмкүн. Өлкөбүздүн көлмөлөрүндө дрейсеналар жана тишиздер кездешет. Кош капкалуу моллюскалар суудагы микроорганизмдер менен майда органикалык заттарды фильтрлеп тамактангандыгы себептүү суу бассейндеринин тазаланышына жардам берет.




33-сүрөт. Кош капкалуу моллюскалар:

1 – перловица; 2 – дрейсена;
3 – мидия; 4 – устрица.

Баш буттуу моллюскалар классы. Баш буттуулардын бутунун алдыңкы бөлүгү өзгөрүп, тинтүүрлөрдү пайда кылат (34-сүрөт). Тулку боюнун узундугу 1 смден 5 м ге чейин болуп, баш жана дene бөлүктөрүнө бөлүнөт. Буттарынын негизинде воронкасы орун алган. Денеси калың булчундуу мантия менен курчалган. Раковинасы жоголуп кеткен. Ооз тешигинин айланасында 8 же 10 тинтүүрү болот. Тинтүүрлөрүндө абдан көп соргучтары бар.

Баш буттуулардын баш мээси өтө күчтүү өрчүгөн болуп, алар көп түрдүү жана татаал рефлекстерди пайда кылат. Баш буттуулардын мантия көндөйүнө суу өтүп турат. Алар сууну мантия көндөйүнөн куйгучу аркылуу чоң басым менен кысып чыгарып, реактивдүү кыймыл жасашат. Арткы ичегисине сыя баштыкчасынын жолу ачылат. Алар кооп туулганда сууга сыя чыгарып, душмандарынан кутулуп калышат.



34-сүрөт. Баш буттуу моллюскалар:
А – кальмар; Б – осьминог; В – каракатица.

Баш буттуу моллюскалар океандарда жана ачык дениздерде жашашат. 650 гө жакын түрү белгилүү. Кальмарлардын, каракатицалардын жана сегиз буттуулардын негизги азыгы болуп крабдар, балыктар жана моллюскалар саналат. Эти үчүн аларга аңчылык кылышат.

1. Тишилиз кантит тамактанат жана дем алат?
2. Тишилиз кандай өрчүйт?
3. Кош капкалуулардын кайсы түрлөрү дениздерде кездешет?
4. Баш буттуулар кандай түзүлгөн?
5. Баш буттуулардын татаал түзүлүшүнүн белгилери эмнеде?



1. Тишилиздин тулку боюнун бөлүктөрү:
 - а) баш;
 - б) дене;
 - в) бут;
 - г) курсак.
2. Тишилиздин чыгаруу сифонуна ачылат:
 - а) бакалоор;
 - б) чыгаруу жолу;
 - в) арткы чыгаруу тешиги;
 - г) мантия көндөйү;
 - д) кан тамыры;
 - е) жыныс тешиги.

Сөздүк дептерине жазып ал.

Кош капкалуулар, шынаа сымал бут, кирүү сифону, чыгаруу сифону, личинкалар, тишилиз, тридакна, устрица, мидия, баш буттуулар, баш мээ, реактивдүү кыймыл.



Суроого жооп тап. Отуруктуу жашоонун негизинде тишилиздин дене түзүлүшүндө кандай ыңайлашуулар жүргөн?

Табышмакта кайсы жаныбардын түзүлүшү жана жашоосу сүрөттөлгөн?
14. Суу жутат, бермет жасайт. 15. Суу астында жатат бешик,
Бешик эмес – кош капкалуу эшик.

Туура жооптор: 16, в; 26, в, е.



МУУНАК БУТТУУЛАР ТИБИ

Денеси катуу хитин менен кепталган. Ал органдар үчүн тышкы таяныч скелеттин милдетин да аткарат. Анткени ага ички органдардын булчундары, буттар келип биригет.

7.1. РАК СЫМАЛДАР КЛАССЫ

Рак сымалдар – алгачкы сууда жашоочу муунак буттуулар. Алардын денеси баш көкүрөгүнөн жана курсак бөлүгүнөн турат. Баш көкүрөгү хитин калкан менен кепталган.

16-§

Дарыя рагынын тышкы түзүлүшү жана көбөйүшү

Рак сымалдар сууда жашашат, бакалоор менен дем алышат. Алар эки жуп муруттарынын болушу менен башка муунак буттуулардан айырмаланышат. Дарыя рагы бул класстын типтүү өкүлү болуп эсептелет.

Жашаган чөйрөсү. Дарыя рагы тузсуз суулуу көлдөрдө, дарыяларда жана өзөндөрдө жашайт. Анын түзүлүшү жана түсү суулуу чөйрөдө жашоого ылайыкташкан. Денесинин үстү жагы жашыл-күрөн, астык жагы болсо агыш түстө; ошондуктан суунун астындағы акты байкоого кыйын.

Рак күнү бою таштын астында же жәэкке жакын жерлердеги дарактардын тамыры астындағы ийиндеринде жашынып жатат. Азық издең түнкүсүн гана чыгат. Рактын негизги азығы болуп балырлар, ооруга чалдыккан жаныбарлар (моллюскалар, курт-кумурскалардын личинкалары), алардын өлүктөрү же ооруган жаныбарлар саналат. Ал азыктын жытын жакшы сезет.

Тышкы түзүлүшү. Дарыя рагынын денеси катуу хитин кабығы менен кепталган. Хитин каптоосу анын денесин тышкы таасирден


коргойт; дene үчүн тышкы скелеттин милдетин аткарат. Ага ички органдардын булчундары жана буттар келип биригет.

Денеси *баш-көкүрөк* жана *курсак* бөлүктөрүнөн турат (35-сүрөт). Баш-көкүрөк баш менен көкүрөк бөлүктөрүнүн кыймылсыз биригүүсүнөн куралып, *баш-көкүрөк* калканы менен капталган. Калканын алдыңкы учу узун ийикти түзөт. Ийиктин эки капталында кыймылдуу сабакчалардын үстүндө көздөрү жайлышкан. Башынын алдыңкы жагында жайлышкан бир жуптан узун жана кыска *муруттары* жыт билүү жана туюу органдары саналат. Ооз тешигин үч жуп *жаактары* курчап турат.

Баш көкүрөктүн кийинки бөлүгүндө 8 жуп өсүндүлөрү бар. Алардан 3 жубу жаак-буттар болуп, азыкты кармап оозго жылдыруу жана бакалоорлорго сууну шилөө милдетин аткарат. Калган 5 жубунан биринчи жубу *кыпчуурга* айланган; кийинки төрт жубу

35-сүрөт. Дарыя рагынын сырткы корунушу:

- 1 – баш көкүрөгү;
- 2 – курсагы; 3 – узун муруту; 4 – кыска муруту;
- 5 – жаактары; 6 – бут жаактары; 7 – кыпчуур; 8 – жөрмөлөөчү буттары;
- 9 – курсак буттары;
- 10 – күйрук сүзгүчү.



болсо чыныгы жөрмөлөөчү буттары болуп эсептелет. Кыпчуурлар азыкты кармоо үчүн кызмат кылат.

Курсак бөлүгү жети муундан турат. Ар кайсы муунда бир жуптан *курсак* буттары болот. Алардан алдыңкы 5 жубу эки бутакчалуу болот, акыркы эки жубу *куйрук* сүзгүчтөрүн түзөт.

Аракеттениши. Адатта рак суунун түбүндө көкүрөк бөлүгүндөгү төрт жуп жөрмөлөөчү буттарынын жардамында жөрмөлөп журөт. Бирок ал кандайдыр коопту сезип калса, күйрук сүзгүчтөрүн курсак жакка бат-бат шилеп, арт жагы менен сүзөт.

Дем алыши. Бакалоорлору аркылуу дем алат. Бакалоорлуу көкүрөк бөлүгүндөгү жаак-буттары менен алдыңкы төрт жуп

жөрмөлөөчү буттарынын негизинде жайлашкан. Жаак буттарынын кыймылы аркылуу бакалоорлордо суу алмашынып турат.

Көбөйшүү жана өрчүшү. Рактар айрым жыныстуу. Ургаачысынын курсак бөлүгү баш-көкүрөгүнө караганда жазыраак, эркегиники болсо, тескерисинче, куушураак болот. Ургаачысы эрте жазда тууган жумурткаларын курсак буттарына жабыштырып алыш жүрөт. Жай башталаары менен жумурткалардан рактар өсүп чыгат. Алар ургаачыларынын курсак буттарына жабышып алат; кийинчөрээк өз алдынча жашай баштайт.

Рактар бардык муунак буттуулар сыйктуу эски катуу кабыгын таштап, б.а. *тулөт* жашайт. Тулөгөн рактын эски каптоосунун астынан жаңысы пайда болот. Ал тез өсө баштайт. Бирок акиштуу затты синирген каптоосу акырындык менен катуулашып, өсүүдөн токтойт жана кайрадан тулөйт.



1. Дарыя рагы кантип жашайт?
2. Рактын хитин каптоосу кандай түзүлгөн?
3. Рактын тулку бою кандай бөлүктөрдөн турат?
4. Рактын баш-көкүрөк бөлүгү кандай түзүлгөн?
5. Рактын курсак бөлүгү кандай түзүлгөн?
6. Рак кандайча аракеттенет?
7. Рак кантип дем алат?



1. Рактын денеси:
 - а) баш, көкүрөк жана курсак бөлүктөрүнөн турат;
 - б) баш жана көкүрөк бөлүктөрүнөн турат;
 - в) баш-көкүрөк жана курсак бөлүктөрүнөн турат.
2. Рактын бакалоорлору:
 - а) жаак жана жөрмөлөөчү буттарынын негизинде жайлашкан;
 - б) көкүрөк жана курсак буттарынын негизинде жайлашкан;
 - в) жаак жана курсак буттарынын негизинде жайлашкан.



- Рактын денесинин органдары менен алардын милдеттерин жуптап жаз.
- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| а) кыпчуурлар; | 1) алга жай аракеттенүү; |
| б) курсак буттар; | 2) артка тез сүзүү; |
| в) хитин каптоосу; | 3) коргоо, таяныч; |
| г) жаак буттар; | 4) азыкты кармоо; |
| д) көкүрөк буттар; | 5) азыкты сүрүү, суу айдоо; |
| е) куйрук сүзгүч; | 6) жумуртка алыш жүрүү. |

Сөздүк дептериңе жазып ал.

Муунак буттуулар, рак сымалдар, баш-көкүрөк, муруттар, жаактар, жаак буттар, кыпчуур, хитин каптоосу, куйрук сүзгүчү, жөрмөлөөчү буттар, түлөө.



Суроого жооп тап. Рак сымалдар активдүү жаныбарлар. Эмне себептен алардын бакалоорлору жаак жана жөрмөлөөчү буттарынын негизинде жайлашкан?

Табышмакта кайсы жаныбардын түзүлүшү жана жашоосу сүрөттөлгөн?

16. Кош кыпчуурлуу, узун мурутчан,
Күндүзү уктап, түнү уулайт ан.

Туура жооптор: 1в, 2а.


Жуптап жаз: а-4, б-6, в-3, г-5, д-1, е-2.

17-§

Дарыя рагынын ички түзүлүшү

Булчундары жана дене көндөйү. Дарыя рагынын булчундары өз алдынча булчун боочолорунан турат. Булчундар органдарынын айланасында топ-топ болуп жайлашкан. Хитин каптоосу жазы дене көндөйүн курчап турат. Ички органдары мына ушул көндөйдө жайлашкан.


Тамак сицируү системасы. Оозу башынын төмөн жагында жайлашкан. Азык ооз, кыска кулкун, кызыл өңгөч аркылуу эки камералуу карынга өтөт (36-сүрөт). Ал баштап чоң карында майдаланып, кийин кичине карынга түшөт. Ал жерден сузуулуп өткөндөн кийин ичегиге жана андан боор түтүктөрүнө түшүп сицирилет. Сиңбеген азыктын калдыктары күйрүк сүзгүчүнүн ортосунда жайлашкан аналдык тешик аркылуу чыгарылат.



36-сүрөт. Дарыя рагынын тамак сицируү, жыныстык жана нерв системалары:

- 1 – оозу; 2 – чоң карыны; 3 – кичине карыны; 4 – ичегиси; 5 – кулкун үстүндөгү нерв түйүнү; 6 – кулкун астындагы нерв түйүнү; 7 – курсак нерв тизмеги; 8 – жыныс бези.

Кан айлануу жана дем алуу системалары. Баш-көкүрөктүн арт жагында канды айдап берүүчү агыш жүрөк жайлашкан (37-сүрөт). Кан айлануу системасы ачык. Кан жүрөктөн чыккан тамырлар аркылуу дene көндөйүнө өтүп, ткандарга азык зат жана кычкылтекти алыш барат. Ал жерден кан тамырларга чогулуп, бакалоорлорго барат. Бул жерде кычкылtek суудан канга өтөт; канда чогулуп калган көмүр кычкыл газы бакалоорлор аркылуу сууга чыгат. Кычкылтек менен каныккан кан жүрөктүн бетиндеги үч жуп тешикчелер аркылуу анын көндөйүнө өтөт.



37-сүрөт. Дарыя рагынын бөлүп чыгаруу, кан айлануу жана дем алуу системалары:

- 1 – бөлүп чыгаруу бези; 2 – бакалоору; 3 – жүрөгү; 4 – арка кан тамыры;
5 – курсак кан тамыры.

Бөлүп чыгаруу системасы баш жагында жайлашкан бир жуп жашыл бездерден жана алардын түтүкчөлөрүнөн турат. Алардын түзүлүшү сөөлжандардыкына окошош. Бул бездердин ыйлаакча сымал жазы учу дene көндөйүндө жайлашкан, түтүкчөлөрү болсо кыска муруттарынын негизинде тышка ачылат. Жашыл бездер канда эриген зат алмашуунун зияндуу продуктуларын организмден чыгарып жиберет.


Нерв системасы. Сөөлжандыкы сыйактуу кулкун үстү жана асты нерв түйүндөрүнөн, кулкун айланасынданагы нерв шакеги жана курсак нерв тизмегинен турат. Кулкун үстү нерв түйүнүнөн көз, муруттарга, кулкун асты түйүнүнөн жаактарга, курсак нерв түйүнүнөн бардык органдарга нервдер чыгат.

Сезүү органдары. Рактардын бир жуп татаал көздөрү киймылдуу сабакчалардын үстүндө жайлашкан. Ар бир көзү өтө көп майда көзчөлөрдөн турат. Ар бир көзчө айлана-чөйрөнүн

кичинекей бир бөлүгүн гана көрө алат. Бардык көзчөлөр бир-геликте бир бүтүн сүрөттөлүштү пайда кылат. Мындайча көрүү көпчүлүк муунак буттуулар үчүн мүнөздүү болуп, *мозаикалык көрүү* деп аталат.

Дарыя рагынын муруттарынын жана буттарынын сыртында жайлышкан түкчөлөр жыт билүү жана туюу органдары болуп эсептелет. Кыска муруттарынын негизинде угуу жана *тең салмактуулукту* сактоо органдары жайлышкан.

Рак сымалдардын көп түрдүлүгү жана мааниси. Рак сымалдардын 30 000 ден ашуун түрү белгилүү. Алардын көпчүлүгү деңиздерде жана океандарда, кээ бир түрлөрү тузсуз сууларда жашашат. Сууда калкып жашоочу майда рак сымалдарга *планктон* дейилет. Тузсуз сууларда планктондук рак сымалдардан *дафния* жана *циклог* көп кездешет (38-сүрөт). Алар балык чарбасы жана аквариумдарда балык кармоо үчүн атайын өстүрүлөт.



38-сүрөт. Ар түрдүү рактар:

1 – дафния; 2 – циклог; 3 – ным курту; 4 – креветка; 5 – камчатка крабы.

Көптөгөн деңиз рак сымалдарына (крабдар, омарлар, лангусттар, креветкалар) эти үчүн аңчылык кылынат. Рак сымалдар балыктардын, тишиз киттердин жана башка деңиз жаныбарларынын негизги азығы болуп саналат.

Рак сымалдардын кээ бир өкүлдөрү кургактыкта жашоого ыла-йыкташкан. Өзбекстандын чөл зоналарында *nym курту* (эшек курт) кенири тараалган. Алар топуракта ийин жасап, өсүмдүк калдыктары менен азыктангандыгы натыйжасында топуракты жумшартып, аны чиринди заттар менен байытат.



1. Дарыя рагынын булчундары кандай түзүлгөн?
2. Рактын организминде азық кандайча сицирилет?
3. Рактын кан айлануу системасы кандай түзүлгөн?
4. Рак кантин дем алат?
5. Рактын бөлүп чыгаруу системасы кандай түзүлгөн?
6. Рактардын кайсы сезүү органдары өрчүгөн?
7. Рак сымалдардын кайсы түрлөрү тузсуз сууларда таралган?
8. Рак сымалдар кандай мааниге ээ?



- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Рактын азығы: | <ol style="list-style-type: none"> 2. Рактын бөлүп чыгаруу системасы: |
| <ol style="list-style-type: none"> а) ичеги, боордо майдаланат; | <ol style="list-style-type: none"> а) жашыл бездер, түтүкчөлөр; |
| <ol style="list-style-type: none"> б) ичеги, боордо сицирилет; | <ol style="list-style-type: none"> б) ичегиге ачылат; |
| <ol style="list-style-type: none"> в) кулкун, ичегиде сицирилет. | <ol style="list-style-type: none"> в) жаак буттарынын негизине ачылат. |

Сөздүк дептериңе жазып ал.

Чоң карын, кичине карын, жашыл бездер, татаал көз, мозаикалык көрүү, планктон, дафния, циклоп, краб, омар, лангуст, креветка, ным курту.



Суроого жооп тап. Дарыя рагынын ачык (туташпаган) кан айлануу системасы сөөлжандын туюк (туташкан) кан айлануу системасынан кандайча айырмаланат?

Табышмакта келтирилген жаныбардын кыймылына мүнөздөмө бер.

17. Он буттап алга жүрөт,
Шашып калса, артка сүзөт.

Туура жооптор: 1б, 2а.

7.2. ЖӨРГӨМҮШ СЫМАЛДАР КЛАССЫ


Жөргөмүш сымалдар чыныгы кургактыкта жашоочу муунак буттуулар. Ооз органы 2 жуп. Өткө же трахея аркылуу дем алат. Айрым жыныстуу, кыймыл органдары 4 жуп. Жөргөмүш сымалдар классы жөргөмүштөр, фалангалар, чаяндар, кенелер түркүмүнө бөлүнөт.

18-§

Ала жөргөмүштүн түзүлүшү жана жашоосу

Жашаган чөйрөсү жана тышкы түзүлүшү. Ала жөргөмүш чөптөрдүн жана бадалдардын арасында курган желесинин үстүндө жашайт. Анын желесин калың чөптүү дарыялардын жана өзөн-

дөрдүн боюнан кездештируүгө болот. Ала жөргөмүштүн денеси кичине баш-көкүрөккө жана тоголок формадагы жылмакай курсакка бөлүнүп турат (39-сүрөт). Баш-көкүрөктүн үстүңкү жагында төрт жуп жөнөкөй көзчөсү, алдыңкы учунда муунактарга бөлүнгөн эки жуп ооз органдары жайлашкан.



39-сүрөт. Ала жөргөмүш жана анын желеси:

- 1 – бут тинтүүрү; 2 – баш-көкүрөгү; 3 – жөрмөлөөчү буттары; 4 – курсагы;
- 5 – ургаачысы; 6 – эркеги; 7 – желеге түшкөн олжосу.

Ооз органдарынын биринчи жубу үстүңкү жаактар саналат. Үстүңкү жаактардын биринчи муунагы кыймылдуу тырмак сымал өсүндүдөн турат жана олжосунун денесин тешүү үчүн кызмат кылат. Жаактарынын түбүндө уу иштеп чыгаруучу бездер жайлашкан. Жаактар матырылганда уу тырмактардын ичиндеги түтүкчө аркылуу олжосунун денесине түшөт жана аны өлтүрөт.


Жөргөмүштөрдүн экинчи жуп ооз органдары *бут-тинтүүрлөр* деп аталат. Алар майда сезгич түкчөлөр менен капталган. Бут тинтүүрлөрү туюу органы болуп саналат жана алардын негизги муунактары *астыңкы жаактардын* милдетин аткарат. Ала жөргөмүштүн бут-тинтүүрлөрү жөрмөлөөчү буттарына караганда кыйлагы кыска. Баш-көкүрөктө узун жана ичке 4 жуп жөрмөлөөчү буттары жайлашкан. Курсагынын бардык муунактары кошуулуп кеткен. Анын арка жагында крест сымал ағыш тагы болот (ошондон улам жөргөмүштүн аты *крестовик*). Курсак бөлүгүнүн арткы учунда үч жуп желе сөөлчөлөрү болуп, буларга желе бездеринин жолдору ачылат.

Кармагыч тору. Желе бездеринен чыккан суюктук абада катып, ичке бышык жипке айлануу касиетине ээ. Арткы буттарындағы таракчалуу тырмактарының жардамында бир нече безден пайда болгон жиптерди жөргөмүш бириң-бириңе чаптап, бүтүн жип жасайт. Ургаачысы бул жиптерден желе токуйт (39-сүрөт). Анын желеси дөңгөлөк формасында болуп, бадалдардың жана бийик өскөн чөптөрдүн арасына тартылган болот.

Жөргөмүштүн аң улашы. Ал желесинин жанына тордон уя жасайт. Бул уяда табылгасын андып жатат. Желенин борборунан жөргөмүш жакка сигнал жиби тартылган болот. Кокусунан торго чалынып, тыбырчылаган чиркей, көпөлөк, майда курт-кумурскалар сигнал жибин терметкенде жөргөмүш ийнинен чыга калып, табылгасына заматта жетет жана аны желенин жиптери менен чырмап алат. Табылгасын үстүнкү жаактарының курч тырмактары менен уулап өлтүрөт. Андан кийин жөргөмүш бир аз убакытка табылгасын калтырып, уясына жашынып турат.

Тамактанышы. Жөргөмүш уусунун курамында тамак синириүүчү зил да болот. Анын таасиринде табылганын ички тканандары ажырап, суюк абалга келет. Олжосунун денесин соруп алат. Заматта табылганын хитин кабыгы гана калат. Анын уусу адамдарга жана омурткалуу жаныбарларга таасир кылбайт

Дем алыши. Курсагынын адыңкы бөлүгүндө бир жуп өпкө баштыкчалары жайлашкан (40-сүрөт). Ар бир өпкөдө барак сымал өсүндүлөр болот. Бул барактар аркылуу кан айланат.



40-сүрөт. Ала жөргөмүштүн ички түзүлүшү:

- 1 – уу бези;
- 2 – желе бези;
- 3 – кызыл өнгөчү;
- 4 – карыны;
- 5 – ичегиси;
- 6 – өпкө баштыгы;
- 7 – трахеясы;
- 8 – нерв системасы;
- 9 – жүрөгү;
- 10 – жыныстык бези.

Жөргөмүштүн дем алышында өпкөлөр менен бир катарда эки туташ *трахеялар* (ичке түтүкчө сымал дем алуу органдары) да катышат. Трахеялар курсактын арткы бөлүгүндөгү жалпы тешик аркылуу атмосфера менен байланышкан. Жөргөмүштүн кан айлануу, бөлүп чыгаруу жана нерв системаларынын түзүлүшү дарыярагынына окшош болот.

Көбөйшүү. Ургаачысы эркегине караганда чонураак болот. Ал күзүнде уруктангандан кийин далдаалуу жерге (таштардын, дарактардын кабыгынын астына) жашынып алыш, жиптен жасалган пиллага бир топ жумуртка тууйт (49-сүрөт). Кышында жөргөмүштөр өлөт, жумурткалары *пилланын* ичинде кыштап калат. Жазында жумурткалардан жаш жөргөмүштөр чыгат.

- 
- Ала жөргөмүштүн баш-көкүрөк бөлүгү кандай түзүлгөн?
 - Ала жөргөмүштүн жаактары кандай түзүлгөн?
 - Жөргөмүштүн курсак бөлүгү кандай түзүлгөн?
 - Жөргөмүштүн желеси кандайча жасалат?
 - Ала жөргөмүш кантип аң уулайт?
 - Жөргөмүштөр кантип дем алат?
 - Ала жөргөмүштөр кандайча көбөйөт?



- Жөргөмүштүн бөлүктөрү:
- Жөргөмүштүн курсагынын учунда:
 - баш-көкүрөк жана курсак;
 - баш, көкүрөк, курсак;
 - баш, баш-көкүрөк, курсак.
- Жөргөмүштүн дем алуу органы:
 - бир жуп өпкө жана трахеялар;
 - эки жуп сөөлчөлөрү;
 - крест сымал ағыш так;
 - үч жуп сөөлчөлөрү бар.

Сөздүк дептерине жазып ал.

Жөргөмүш сымалдар, ала жөргөмүш, уу бездери, бут-тингүүрлөрү, желе бездери, желеси, өпкө баштыкчалары, трахеялар, пилла.



Суроого жооп тап. Айтууларга караганда, абдан бышык жип алуу максатында жүргүзүлгөн жөргөмүштөрдү өстүрүү иштери ийгиликсиз чыккан. Эмне үчүн мынданай болгон?

- Табышмакта кайсы жаныбардын аң улашы сүрөттөлгөн?
- Желе менен чырмап алган,
Чымынга ал чынжыр салган.

Туура жооптор: 1а, 2б, 3а.


19-§

Жөргөмүш сымалдардын көп түрдүүлүгү

Жөргөмүштөр. Көптөгөн түрлөрү жырткыч болуп, чиркей, чымын сыйктуу курт-кумурскаларды кырып пайда келтирет. Алардан *кара курт* менен *бөйөн* (тарантул) уулуу саналат.

Кара курт Орто Азия, Кавказ, Крымдын талаа, чөлдөрүндө кездешет (41-сүрөт, 3). Жаш ургаачы кара курттун курсагынын үстүндө кызғылттым тактары болот. Ал топурактагы чункурчалардын үстүнө, таштардын астына желе тартат. Желесине түшкөн чигиртке, конуз, кантала, курт-кумурскалар менен тамактанат. Усу адам баласы үчүн кооптуу, айныкса, төө, жылкыларга күчтүү таасир этет. Бөйөн эң ири (3–4 см) жөргөмүш болуп, топуракта терендиги 60 см ге чейин болгон тик ийинде жашайт. Түнкүсүн ийининен чыгып, курт-кумурскаларга аң улайт.

Фалангалар. Алар жөргөмүш сымалдардын ичинен эң ириси болуп, негизинен ысык жана кургак климаттарда жашашат. Орто



41-сүрөт. Жөргөмүш сымалдар:

1 – фаланга; 2 – чаян; 3 – кара курт; 4 – кара курттун уясы.

Азия чөлдөрүндө кенири тараган *ири сары фаланганын* чондугу 6–7 см келет.

Фаланганын денеси баш, көкүрөк жана курсак бөлүктөрүнөн турат (41-сүрөт, 1). Башында бир жуп көзү жана ооз органдары (жаактары) жайлышкан. Жаактары курч тырмакка, бут тинтүүрлөрү жөрмөлөөчү буттарга окшойт. Сары фаланга жырткыч болуп, түнкүсүн ууга чыгат. Ал түрдүү курт-кумурскалар жана майда сой-лоп жүрүүчүлөр менен тамактанат. Анын уу бези болбойт. Фаланга зыянкеч курт-кумурскаларды кырып пайда келтириет.

Чаяндар түштүк өлкөлөрдө кенири тараган. Орто Азия чөлкөмүндө *сары чаян* көп кездешет. Анын жалпак денеси баш-көкүрөк жана курсак бөлүктөрүнө бөлүнгөн (41-сүрөт, 2). Башынан үстүндө бир жуп ири көздөрү, эки капиталында беш жуп майда көзчөлөрү бар. Үстүнкү жаактары жөргөмүштүкүнө окшойт, бирок бут-тинтүүрлөрү кыпчуурга айланган. Узун курсагы көп сандаган муунактардан турат. Курсагынын алды жагы жазы, арт жагы кууш келет. Курсагынын акыркы муунунда курч найзасы бар. Найзанын учунан уу безинин жолдору ачылат.

Күндүзү таштардын астында, дубалдын же жердин жылчыкта-рына жашынып, түнкүсүн ууга чыгат. Курсагынын ичке бөлүгүн жогору көтөрүп алыш, тез чуркайт. Жолунда жолуккан түрдүү муунак буттууларды, негизинен, жөргөмүштөрдү жана курт-кумурскаларды кыпчуулары жардамында кармап, уулуу найзасы менен өлтүрөт. Чаяндар 20–30 га чейин тириү бала тууйт. Алар зыяндуу курт-кумурскаларды кырып, пайда келтириет.

Кенелер – майда жөргөмүш сымалдар. Денеси жалпак сүйрү форма, муундарга бөлүнбөгөн. Тулку бойдун бөлүктөрү кошулуп кеткен. Денесинин алдыңкы бөлүгүндө жаактардын жана бут-тинтүүрлөрдүн кошулушунан пайда болгон сайып алыш соруучу түтүкчөсү жайлышкан. Көптөгөн кенелер мителик кылат. Чондору түрдүү жаныбарлар менен адамдардын денесинен кан соруп мителик кылат. *Ит кене* иттердин, бодо малдын жана башка жаныбарлардын, адамдын канын сорот.

Кенелер жытты жакшы сезет, өздөрүнүн ээлерин жыты аркылуу таап алат. Кенелердин кан соруу менен бирге келте, туляремия жана энцефалит сыйктуу бир топ оор ооруларды адамдарга жуктурушу аныкталган. Жаратылышта бул оорулардын козготуучулары болуп эсептелген бактериялар жана вирустар жапайы жаныбарлардын денесинде жашайт.

Мите кенелер мал чарбасына жана адамдын ден-соолугуна өчн зыян келтириет. Кенелеген жаныбар азат, ошону менен бирге алардын продукттуулугу төмөндөйт. Мите кенелерден сактануу үчүн мал сарайларды дайыма таза тууу, айбанаттарды кенелерден арылтып турруу зарыл. Жайлоолордо же мал сарайларында иштеген кишилердин кийим-кечелерин кенеден тазалоо, териге жабышкан кенелерди терип алып, өлтүрүү керек.



1. Кара курт кандай жашайт?
 2. Бейөн кандай жашайт?
 3. Фаланга кандай түзүлгөн?
 4. Фаланга кандай күн көрөт?
 5. Чаяндар кандай түзүлгөн?
 6. Чаяндар кандай жашайт?
 7. Кенелер кандай түзүлгөн?
 8. Кенелер зыяны эмнеде?
1. Жаш курт курсагынын үстүндө:
 - а) желе салчу бездери бар;
 - б) кара тактары болот;
 - в) кызгылтым тактары болот.
 2. Бейөн эн ири жөргө мүш:
 - а) чункурларга ийин салат;
 - б) терең ийинде жа шайт;
 - в) ийинине чөп ташыйт.
 3. Чаян:
 - а) жумурткасын далдаага тууйт;
 - б) тирүү тууйт;
 - в) өтө тукумчул келет.



Жөргөмүш сымалдардын аттарын аларга мүнөздүү болгон өзгөчөлүктөрү менен жуптап жаз.



- а) бейөн;
- б) кара курт;
- в) фаланга;
- г) чаян;
- д) ит кене.
- 1) баш, көкүрөк, курсактан турат;
- 2) денеси бир бүтүн;
- 3) курсагы муундарга бөлүнгөн;
- 4) желе тартпайт;
- 5) өтө уулу.

Сөздүк дептериңе жазып ал.

Бейөн, кара курт, фаланга, чаян, уу найзасы, кене, сайып-соруучу түтүкчө, келте, туляремия, энцефалит.



Суроого жооп тап. Жай айларында талаада эс алганында жаш жөргөмүштөрдүн бадалдын же чөптүн бутактарына, кәэде кишинин башында өзүнүн жибине асылып, шамалда термелип турганын байкаган болсон керек. Эмне себептен алар минтишет?

Табышмакта кайсы жаныбар сүрөттөлгөн?

19. Тору атым бар шумдуктуу,
Майтарылган күйруктуу.

Туура жооптор: 1в, 2б, 3б.

Жуптуктар: а-4, б-5, в-1, г-3, д-2.

7.3. КУРТ-КУМУРСКАЛАР КЛАССЫ


Курт-кумурскалар — жаратылышта кеңири тарапган муунак буттуулар. Денеси баш, көкүрөк, курсак бөлүктөрүнөн турат. Буттары 3 жуп, башында бир жуп муруттари, көздөрү жана жаактары бар. Көкүрөк бөлүгүндө канаттары жана буттары жайлашкан. Бөлүт чыгаруу органы — мальпиги түшүкчөлөрү, трахея аркылуу дем алат. Жүрөгү түтүкчө сымал, көп камералуу; 40 ка жакын түркүмдөрү бар. Өкүлү — жашыл жалтырак коңуз.

20-§

Жашыл жалтырак коңуздан тышкы түзүлүшү

Жашаган чойрөсү, дене бөлүктөрү. Жаз жана жай айларында талааларда гүлдөрдүн үстүнөн ири (узундугу 1–2 см) жашыл коңуздарды көрүгө болот. Денесинин үстүнкү жагы жалтырак-жашыл, курсак жагы кызғылтым түстө болот. Жалтырак коңуз Европа жана Азия материктеринин дээрлик бардык жерлеринде кездешет. Коңузду колго алыш караганда анын хитин кабыгы калың жана катуу э肯дигин сезүүгө болот (42-сүрөт).


Баш бөлүгү. Башында оозу жана сезүү органдары жайлашкан. Оозун үстү жактан кичинекей пластинка формасындағы жогорку



42-сүрөт. Жашыл жалтырак коңуздан сырткы түзүлүшү:

А – арт жагынан көрүнүшү; Б – курсак жагынан көрүнүшү; В – учуп бараткан коңуз:
 1 – муруттары; 2 – башы; 3 – көзү; 4 – баш жана көкүрөк бөлүгү; 5 – үстүнкү канаты;
 6 – арткы буттары; 7 – курсагы; 8 – жөрмөлөөчү буттары; 9 – астынкы канаты.

эрин, капитал жактарынан бир жуп жогорку жана төмөнкү жаактар, асты жагынан төмөнкү эриндер курчап турат (43-сүрөт). Төмөнкү эрин менен төмөнкү жаактар бир жуптан тинтүүрлөргө ээ. Тинтүүрлөр туюу жана даам сезүү органдары саналат.



Конуздун башынын эки капиталында бирден ири татаал көздөрү болот. Ар кайсы көзү бир нече миндеген жыш жайлашкан майда жөнөкөй көзчөлөрдөн турат. Курт-кумурскалар да дарыя рагы сыяктуу мозаикалык көрүү касиетине ээ. Көпчүлүк курт-кумурскалар түстү жакши ажырата аlyшат. Көздөрүнүн алдында желпүүргө окошош муруттары жайлашкан. Эркек конуздун муруту ургаачыларынына караганда ирирәэк болот. Муруттар жыт билүү органдары болуп эсептелет.

Көкүрөк бөлүгү. Курт-кумурскалардын көкүрөк бөлүгү үч бөлүктөн турат. Экинчи жана үчүнчү көкүрөк бөлүктөрүнүн үстү жагында бир жуптан канаттары жайлашкан. Арт жагынан көкүрөгүнүн бириңчи бөлүгү гана көзгө урунат. Көкүрөгүнүн кийинки эки бөлүгү жана курсак бөлүгү катуу жана калың үстүңкү канаттар менен капиталган. Бул канаттар назик жаргак сымал *астыңкы канаттарын* жана жумшак курсак бөлүгүн коргоп турат. Көпчүлүк конуздардын үстүңкү канаттары эки жакка жайылып самолёттун канаты сыяктуу көтөрүү бетин түзөт. Бирок жалтырак конуздун үстүңкү канаттары учуда катышпайт. Бул канаттар конуз учкан мезгилде да денесинин арт жагында жабышып тура берет. Үстүңкү канаттардын алдыңкы бөлүгүнүн эки четинде бирден кемтик жери болот. Учуудан мурда конуз ошол кемтиктөр аркылуу астыңкы канаттарын чыгарып жайып алат жана бат-бат канат күүлөп, учуп кетет.

Конуз, башка курт-кумурскалардын ар бир көкүрөк бөлүгүнө курсак жагынан бир жуптан буттар бириккен. Буттары беш муунактуу, акыркы муунагы курч тырмактар менен жабдылган.

Жашаган чөйрөсү курт-кумурскалардын түзүлүшүнө чоң таасир тийгишет. Жерде жөрмөлөп жургөн курт-кумурскалар (конуздар) дын бардык буттары бирдей түзүлгөн. Секирип аракеттенген чегирткелердин арткы буттары жоон жана узун болот. Суу конузу менен суу канталаларынын буттары калакка айланган. Топуракта жашаган музоо баштын алдыңкы буттары болсо күрөккө окшоп жазы тарткан.

Курсак бөлүгү. Жашыл жалтырак конуздун курсак бөлүгү 8 муунактан турат. Курсагын ийин жактан үстүнкү канаттар жаап турат. Үстүнкү канаттардын астынан курсактын учу гана чыгып турат. Курсактын муунактары денесинин асты жагынан көзгө көрүнөт. Курсак бөлүгү көкүрөк менен кыймылсыз кошулган.

1. Жалтырак конуздун денеси кандай бөлүктөрдөн турат?
2. Конуздун баш бөлүгү кандай түзүлгөн?
3. Конуздун ооз органдары кандай түзүлгөн?
4. Курт-кумурскалардын көздөрү кандай түзүлгөн?
5. Көкүрөк бөлүгүндө кандай органдар жайлышкан?
6. Конуздун канаттары кандай түзүлгөн?
7. Курт-кумурскалардын буттары кандай түзүлгөн?
8. Курсак бөлүгү кандай түзүлгөн?



1. Конуздун төмөнкү жаагынын жана эрининин тинтүүрлөрү:

- a) азыкты майдалоо милдетин аткаралат;
- b) туую жана даам татуу милдетин аткаралат;
- c) даам татуу жана жыт билүү милдетин аткаралат.

2. Жалтырак конуздун муруттары:

- a) желпүүргө окшойт;
- b) араа сымал;
- c) күш жүнү сымал.

3. Дене бөлүктөрү:

- a) баш, канат, бут, көкүрөк;
- b) баш-көкүрөк, бут, курсак;
- c) баш, көкүрөк, курсак.



Жалтырак конуздун денесинин бөлүктөрүн аларга ылайык келген түзүлүш белгилери менен бирге жуптап жаз.

- | | |
|----------------------|------------------------|
| a) муруттар; | 1) татаал түзүлгөн; |
| б) көздөр; | 2) жука, жаргак сымал; |
| в) жаак тинтүүрлөрү; | 3) калың, хитиндешкен; |
| г) үстүнкү канаты; | 4) бирдей түзүлгөн; |
| д) астыңкы канаты; | 5) желпүүр сымал; |
| е) буттары; | 6) 8 муунактуу; |
| ё) курсак бөлүгү. | 7) туую органы. |



Сөздүк дептериңе жазып ал.

Курт-кумурскалар; жашыл конуз; ұстұнқұ; астыңқы канат; тырмактар; жогорку, төмөнкү жаактар; жогорку, төмөнкү эрин.



Суроого жооп тап. Көптөгөн курт-кумурскалар кооз түстө болот. Бир топ курт-кумурскалар үн чыгарат. Айты, курт-кумурскаларга кооздук жана үн салуу эмне үчүн керек?

Табышмакта кайсы жаныбардын тышкы көрүнүшү сүрөттөлгөн?

20. Тону зердей жалтырак,
Муруту чакан тарак.
Кооздук берет жашыл канаты,
Кана тапчы, эмне анын аты?

Туура жооптор: 1б, 2а, 3в.


Жуптук жооптор: а-5, б-1, в-7, г-3, д-2, е-4, ё-6.

21-§**Жашыл конуздан ички түзүлүшү**

Тамак синириүү системасы. Өсүмдүктөрдүн гүлү, жаш жалбырактары жана жетиле элек мөмөлөрү менен тамактанат. Курч жогорку жаактары жардамында өсүмдүктүн ткандарын үзүп алып, төмөнкү жаактары менен чайнайт. Мына ушуга окшош катуу азыкты чайноого ылайыкташкан ооз органдары *кемириүүчү* деп эсептелет. Азык ооз көндөйүндө шилекей менен аралашат жана кыска қулкун аркылуу кызыл өнгөчкө, андан булчундуу карынга түшөт (44-сүрөт). Карында эзилген азык ичегиге өтөт. Ичегиде азык синирилет. Синирилбеген азыктын калдыктары арткы чыгаруу тешиги аркылуу тышка чыгарып жиберилет.

Курт-кумурскалардын ооз органдары ар түрдүү түзүлгөн. Катуу өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын ткандары менен тамактанган курт-кумурскалар (конуздар, чегирткелер, кумурскалар, жаачылар) дын ооз органдары жашыл жалтырак конуздукуна окшош кемириүүчү болот. Суюк азык (өсүмдүктүн ширеси, гүлдүн нектары, кан) менен тамактанган курт-кумурскалардын ооз органдары узун жана ичке түтүкчөдөн (хоботтон) турат.

Кан айлануу системасы бардык муунак буттуулардыкы сыйктуу ачык. Каны дene көндөйүн толтуруп турат. Ички органдары жана ткандары кандын суюктугунда жайлышкан. Кандагы азык

**44-сүрөт. Курт-кумурскалардын ички түзүлүшү:**

1 – кулкууну; 2 – карыны; 3 – ичегиси; 4 – мальпиги тұтұқчөсү; 5 – кулкуундун жанындағы нерв шакеги; 6 – көкүрек нерв түйүндөрү; 7 – трахеялары; 8 – жумурткалығы; 9 – жүрөгү; 10 – трахеянын түзүлүшү.

заттар ткандарга өтөт, ткандардан болсо зат алмашуунун ақырык продуктулары канга чыгарылат. Курт-кумурскалардын қаны дем алууда катышпайт, б.а. қычқылтек ташыбайт. Жүрөгү курсак бөлүгүндө, ичегисинин үстүндө денени бойлай жайлашкан тұтұқчөден турат. Жүрөктөн баш жагына карай бир қыска қан тамыр кетет. Бул тамырдын учу дене көндөйүнө ачылат. Жүрөк жыйрылғанда қан жүрөктөн ошол тамыр арқылуу баш жакка айдалат жана ал жерден дене көндөйүнө келип куюлат. Жүрөк кенейгенде болсо қан дене көндөйүнөн жүрөктүн эки капиталындағы тешикчелери арқылуу анын ичине өтөт.

Дем алуу системасы дене көндөйүндө аябай бутактанган ичке тұтұқчөлөргө окшош трахеялардан турат. Аба курсак бөлүгүндөгү тышкы дем алуу тешикчелеринен тұтұқчөлөргө өтөт. Тұтұқчөлөр арқылуу аба бардык дене органдарына жетип барат. Трахеянын тұтұқчөлөрүндөгү аба курсак булчундарынын кезекме-кезек жыйрылуусунун натыйжасында алмашып турат.

Бөлүп чыгаруу системасы курсак бөлүгүндөгү ичке жана узун мальпиги тұтұқчөлөрүнөн турат. Тұтұқчөлөрдүн бир учу туюқ, экинчи учу ичеги көндөйүнө ачылат. Дене көндөйүндөгү қандан мальпиги тұтұқчөлөрүнө зат алмашуунун продуктулары өтүп, тұтұқчөлөрдүн ичинде кристаллдашат жана ичеги көндөйүнө түшөт, андан тамактын калдықтары менен бирге чыгып кетет.

Нерв системасы кулкун айланасындағы нерв шакекчеси жана курсак нерв тизмегинен турат. Баштагы көптөгөн нерв клеткалары кошулуп, *баш мәэни* түзөт. Баш мәэден бардық сезүү органдарына нервдер чыгат. Татаал кулк-мұнөзгө ээ аарылар менен кумурскалардын баш мәсиси жана нерв түйүндөрү башка курт-кумурскалардының караганда абдан құчтүү өрчүгөн. Алар кулк-мұнөзү жана сезүү органдарының татаалдығы нерв системасының канчалық өрчүгөндүгүнөн көз каранды.

Сезүү органдары. Көзүнүн түзүлүшү дарыя рагынықына оқшош. Көпчүлүгү түстү ажырата алат, айныкса жытты мыкты сезет. Кәэ бир көпөлөктөрдүн эркеги ургаачысының жытын 11 км аралыктан сезип, учуп келген. Көпчүлүк курт-кумурскаларда (чыртылдақ чегиртке, чекилдек айман, чегиртке, темирчектер) *үн чыгаруу* жана учуу органдары бар. Дене жана муруттарындағы түрдүү түкчөлөр *теринин сезүү* органдары саналат.



1. Курт-кумурскалардын ооз органдары кандай түзүлгөн?
2. Курт-кумурскалардын жүргөгү кандай түзүлгөн?
3. Курт-кумурскалар кантеп дем алат?
4. Бөлүп чыгаруу системасы кандай түзүлгөн?
5. Нерв системасы кандай түзүлгөн?
6. Курт-кумурскларда кайсы сезүү органдары өрчүгөн?



Кайсы жооп туура?

1. а) курт-кумурскалардын каны кан тамырларында агат;
б) каны дене көндөйүнүн суюктугу менен бирдей;
в) жүргөгү түтүк сымал, көкүрөк бөлүгүндө жайлышкан.
2. а) курт-кумурскалардын каны дем алууда катышпайт;
б) каны көмүр кычкыл газын ташыйт;
в) жүргөгү эки камерадуу.
3. а) баш мәэ нерв клеткаларынан турат;
б) баш мәэ нерв түйүндөрүнүн жыйнагынан турат;
в) баш мәэ 5 бөлүктөн турат.

Сөздүк дептериңе жазып ал.

Кемириүүчү, соруучу, сайып алып соруучу, мальпиги түтүкчөлөрү, баш мәэ, теринин сезүү органдары.



Суроого жооп тап. 1. Эмне себептен курт-кумурскалардын арасында чекилдек аймандын эркеги эң ири мурутка ээ? 2. Эмне себептен бал аары менен чымындардын курсак бөлүгү тынч абалда да өйдө-ылдый аракеттешет?

21. Алты буту түяксыз,
Көздөрүнө сан жеткис.

Туура жооптор: 1б, 2а, 3в.

Жуптук жооптор: а-5, б-1, в-7, г-3, д-2, е-4, ж-6.

3-лабораториялык машигуу. Курт-кумурскалардын тышкы түзүлүшү

Керектүү жабдуулар: бир нече чегиртке, жашыл жалтырак коңуз, курт-кумурскалардын тышкы түзүлүшүн чагылдырган сүрөттөр, кичине кайчылар, кол лупасы жана кысқычтар.


Машыгууну өткөрүүдө мурдатан кургатылып, коллекция кылынган же фиксацияланган курт-кумурскалардан пайдаланылат. Машыгуу төмөнкү тартипте өткөрүлөт:

1. Курт-кумурскалардын тышкы көрүнүшүнө байкоо жүргүз, денесинин узундугун жана түсүн аныкта.
2. Денесинин баш, көкүрөк жана курсак бөлүктөрүн аныктаап ал.
3. Баш бөлүгүндө жайлашкан көрүү (көздөр), жыт билүү (муруттар) жана ооз органдарын жөнөкөй көз менен же лупанын жардамында текшер. Муруттардын түзүлүшүндөгү айырманы аныкта.
4. Буттардын түзүлүшүндөгү, муунактардын бөлүнүшүндөгү тырмактарындағы, алдыңкы жана арткы буттарынын ортосундагы байланышты аныкта.
5. Көкүрөк бөлүмүндөгү эки жуп канаттарынан бириңчи жубун (үстүнкү канатын) кысқыч жардамында көтөрүп, эки жуп канаттардын бириң-бирине окшош жактарын жана айырмасын аныкта.
6. Канаттарды кайчы жарадамында кыркып, курсак бөлүгүнүн түзүлүшүнө байкоо жүргүз. Лупанын жардамында курсак бөлүгүндө жайлашкан дем алуу көндөйлөрүн тап.

22-§

Курт-кумурскалардын көбөйгүшү жана өрчүшү

Курт-кумурскалардын жыныстык системасы. Алар – айрым жыныстуу жаныбарлар. Эркектери ургаачыларына караганда кичигирээк жана ичке, муруттары күчтүү өрчүгөн, жытты абдан жакшы сезет. Жыныстык органдары курсак көндөйүндө жайлашкан. Ур-



45-сүрөт. Жашыл жалтырак конуздун гусенициасы:
 1 – башы; 2 – жаактары;
 3 – көкүрөк буттары; 4 – дем алуу тешиктери.

түстөгү калың хитин менен кепталган; денесинин калган бөлүгүндө хитин каптоосу жука жана жумшак болот. Денесинин кептал жактарында дем алуу тешиктери көрүнүп турат (45-сүрөт). Личинкалар чирип, ыдырап калган жыгачтын калдыктары менен тамактанат. Алар бир нече жолу түлөп, куурчакчага айланат.

Куурчакчасынын тышкы көрүнүшү чоңойгон курт-кумурсканынына ожшойт. Сырт жагынан анын ооз органы, башындагы муруттары жана татаал көздөрү, бүгүлгөн үч жуп буттары жакшы көрүнүп турат. Куурчакчанын хитин каптоосу салыштырмалуу калың болот.


Куурчакча курт-кумурскалардын *тыныгуу стадиясы* саналат. Ал аракеттенбейт жана тамактанбайт, гусеница стадиясында чогулткан азық эсебинен жашайт. Татаал өзгөрүүлөрдүн натыйжасында чоңойгон конуздарга мүнөздүү органдар калыптана баштайт. Күзгө келип хитин каптоосу жарылып, андан чоңойгон курт-кумурска чыгып келет. Конуздар чириндinin ичинде кыштап калат; кийинки жылдын жазында гана жердин бетине чыгат.

Толук өзгөрбөй өрчүү. Таракандардын, чегирткелердин, ийнеликтердин жана канаталалардын жумурткадан чыккан личинкасынын түзүлүшү жана жашоо тирдиги чоң курт-кумурскалардынына ожшойт; өтө кичинелиги жана канаттарынын өрчүбөгөндүгү менен гана алардан айырмаланышат.

Личинка төрт жолу түлөйт жана бешинчи жаштан өтүп, чоңойгон курт-кумурскага айланат (46-сүрөт). Чоноюу стадиясында личинканын дene түзүлүшүндө жана жашоо тирдигинде анчалык

гаачыларында бир жуп жумурткалыгы, эркектеринде бир жуп уруктугу болот. Жумурткалыктарында жумуртка клеткалары, уруктуктарда урук клеткалары (сперматозоиддер) жетилет.

Личинкасы. Жалтырак конуз уруктанган жумурткаларын чириген жыгач же дарактардын денесине тууйт. Жумурткалардан майда личинкалар өрчүп чыгат. Алардын тышкы көрүнүшү жана жашоосу чоңойгон конуздардынына ожшойт. Личинкалардын агыш жоон денеси догоо окшоп ийилген болот; ири башы буттары саргыч-күрөн



46-сүрөт. Азия чегирткесинин өрчүшү:

- 1 – топурактагы кумарача ичиндеги жумурткалар;
- 2 – 6 – личинканың өрчүү стадиясы;
- 7,8 – чоң чегиртке.

Чоң өзгөрүш болбайт. Ошондуктан мындай өрчүүгө толук өзгөрбөй өрчүү дейилет.

Толук өзгөрүп өрчүү. Коңуз, көпөлөк, чымын, бүргө, кумурска жана аарылардын личинкасы тышкы көрүнүшү менен гусеницага окшош (47-сүрөт). Гусеницалардын ооз органдары, ички түзүлүшү жана тамактанышы да чоң курт-кумурскалардыкынан айырмаланат. Мисалы, көпөлөктөр түтүкчөсү жардамында гүлдүн нектарын сорот. Алардын сөөлжан сымал гусеницасынын ооз органдары кемирүүчү тибинде түзүлгөн, курсак бөлүгүндө буттары болот. Көпөлөктөрдүн гусеницасы өсүмдүктүн ткандарын кемирет. Жашыл конуз гүлдөрдүн чаңы жана башка бөлүктөрү менен, анын гусеницилары чириндиди менен тамактанат.



47-сүрөт. Капуста көпөлөгүнүн өрчүшү:

- 1—ургаачысы; 2—эркеги; 3—личинкасы; 4—куурчакчасы.



1. Курт-кумурскалар эркеги ургаачысынан кандай айырмаланат?
2. Алардын жыныстык клеткалары каerde пайда болот?
3. Жалтырак конуздун гусеницасы кандай түзүлгөн?
4. Жалтырак конуздун гусеницасы эмне менен тамактанат?
5. Гусеницанын куурчакчага айланышында кандай процесс жүрөт?
6. Куурчакча кандай түзүлгөн?
7. Толук өзгөрбөй өрчүү кандайча жүрөт?



1. Эркегинин ургаачыларына салыштырмалуу:

 - а) муруттары кыска, жытты жакшы сезет;
 - б) муруттары узун, жытты жакшы сезет;
 - в) муруттары кыска, жытты жакшы сезбейт.

2. Жалтырак конуздун куурчакчасы:

 - а) кыймылсыз, тамактанбайт;
 - б) аз кыймылдайт, сөөлжан сымал;
 - в) аз кыймылдайт, хитин каптоосу болбайт.

Сөздүк дептериңе жазып ал.

Личинка, гусеница, куурчакча, толук өзгөрбөй өрчүү, толук өзгөрүп өрчүү, сперматозоиддер.

Төмөнкү табышмактарда кайсы жаныбарлар жөнүндө маалымат берилген?

- | | |
|-------------------------|--|
| 22. Өзү кара, канаттуу, | 23. Учкан кезде кынылдайт,
Мүйүзү бар, тырмактуу. |
|-------------------------|--|


Туура жооптор: 1б, 2а.

23-§

Толук өзгөрбөй өрчүгөн курт-кумурскалар

Ийнеликтер түркүмү. Ийнеликтер – эң байыркы жаныбарлар. Алардын канаттары бүктөлбөстөн денесинин капиталдарында жайылып турат. Курсак бөлүгү ичке жана узун болот. Көздөрү абдан чон, личинкасы сууда өрчүйт (48-сүрөт).

Ийнеликтер жана алардын личинкалары жырткыч күн көрүштөт. Чон ийнеликтер олжосун абада алдыңкы буттарынын жардамында кармайт. Алар зыянкеч жана кан соруучу курт-кумурскаларды кырат. Личинкалары чиркейлердин жана башка жаныбарлардын сууда жашаган личинкалары менен тамактанат. Оазистердеги суу бассейндерине жакын жерлерде көгүлтүр ийнелик, тоолуу аймактарда



48-сүрөт. Толук өзгөрбөй өрчүгөн күрт-кумурскалар:
 1 – чекилдек айман чегиртке; 2 – чыртылдақ чегиртке; 3 – талаа кара чегирткеси;
 4 – сары таракан; 5 – жалтылдақ ийнелик; 6 – төшөк канталасы.

болсо муунактуу ийнелик, көлмөлөргө жакын жерлерде жалтылдақ ийнелик көп кездешет.

Тұз канаттар түркүмү. Алдыңғы канаттары узун жана энсиз, артқы канаттары желпүүргө оқшоп алдыңғы канаттарынын астында бүктөлүп турат. Ооз органдары кемирүүчү, артқы буттары секириүүчү типте түзүлгөн. Тұз канаттар жумурткаларын топурактагы атайын кумурачага туйт. Аларга чегирткелер, темирчектер, чырылдақтар киред. Көпчүлүк түрлөрүнүн үн чыгаруу жана угуу органдары бар. Тұз канаттар – өтө ач көз чөп жечү жаныбар. Кәэ бир жылдары чегирткелер тез көбөйүп, өтө чон үйүрдү түзүшкөн. Мындай үйүр кыймылга келгенде жолунан кезиккен бардық өсүмдүктөрдүн тыптыйпылын чыгарат.

Канталалар түркүмү. Канталалардын биринчи жуп канаттарынын алдыңғы бөлүгү калындашкан, кийинки бөлүгү жука жана түссүз. Ошондуктан аларды жарым катуу канаттар деп да аташат. Көпчүлүк түрлөрү өсүмдүктөрдүн ширесин соруп тамактанат. Чөл жана талааларда кенири тараалган хасва канталасы дан эгиндеринин данын жана жалбырагын соруп азыктанат. Алардын арасында кан соруучу мителери да бар. Төшөк канталасы үйлөрдө жашайт; адам жана жаныбарлардын канын сорот. Төшөк канталасынын канаттары болбойт; денеси майда сезгири түкчөлөр менен капиталган; жытты абдан жакши сезет.

Термиттер түркүмү. Термиттер – топ болуп жашаган жаныбарлар. Тобу бирден ургаачы жана эркек термиттен, бир нече жүздөн милли-

онго чейин жумушчулары менен сакчылардан турат. Эне термит өтө ири, 10 жылга чейин жашап, 115 миллионго чейин жумуртка тууйт. Жумушчулары ак түстө болуп, аларды кәэде ак кумурска деп да аташат. Алар бойго жетпеген ургаачылары болгондуктан, ин куруу, топту багуу милдетин аткарышат. Сакчыларынын башы ири, жаактары күчтүү өрчүгөн. Алар топту коргоо милдетин аткарышат. Термиттер өсүмдүктөрдүн жыгач бөлүгү менен азыктанат. Тропик өлкөлөрдө термиттер Жер бетинен 15 м бийиктикке чейин ин курат. Орто Азия чөлдөрүндө топурактын бетинде, ошондой эле шаар, кыштактардагы үйлөрдүн жыгач бөлүгүнө түркстан термити ин курат.



1. Ийнеликтер кандай түзүлгөн?
2. Ийнеликтер кандай күн көрөт?
3. Түз канаттар кандай түзүлгөн?
4. Түз канаттар кандай зыян келтириет?
5. Эмне себептен канталаларга жарым катуу канаттар дейилет?
6. Төшөк канталасы менен хасва кандай зыян келтириет?



- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Ийнеликтин канаттары: <ol style="list-style-type: none"> a) курсагы үстүнө бүктөлгөн; b) узун жана ичке; c) денесинин капиталдарында жайылып турат. <ol style="list-style-type: none"> 3. Кантала алды канаттары: <ol style="list-style-type: none"> a) негизи калың, учу жука; | <ol style="list-style-type: none"> 2. Түз канаттардын алдыңкы канаттары: <ol style="list-style-type: none"> a) алды бөлүгү калыңдашкан; b) ичке жана узун; c) курсак бөлүгүнүн үстүндө бүктөлүү турат. <ol style="list-style-type: none"> b) негизи жука, учу калың; b) негизи жазы, үстү ичке. |
|---|---|



- Курт-кумурскалардын түрлөрүн, жашоо мүнөзүн жуптап жаз.
- a) ийнеликтер;
 - b) түз канаттар;
 - c) хасва;
 - d) төшөк канталасы.
- 1) кан сорот;
 - 2) жырткыч күн көрөт;
 - 3) өсүмдүккө зыян келтириет;
 - 4) өсүмдүк ширесин сорот.

Сөздүк дептериңе жазып ал.

Ийнеликтер, жөнөкөй канаттар, муунактуу жана көгүлтүр ийнелик, кантала, жарым катуу канаттар, түз канаттар, темирчектер, чегирткелер, чыртылдактар, хасва, төшөк канталасы.

Төмөнкү табышмакта кайсы жаныбар жөнүндө маалымат берилген?

24. Ылдам-ылдам секирип өтөт,
Кармайын десем, карматтай кетет.


Туура жооптор: 1в, 2б, 3а.

Жуптап жаз: а-2, б-3, в-4, г-1.

24-§

Толук өзгөрүп өрчүгөн курт-кумурскалар: кабырчык канаттар түркүмү

Көпөлөктөр өтө кооз жана көп түрдүү бөлүп, жер бетинде алардын 150 000 ге, Орто Азияда бир нече мингे жакын түрлөрү тараалган (49-сүрөт). Канаттары майда кабырчыктар менен капталган. Ошондуктан алар *кабырчык канаттар* деп аталат. Канаттарынын түсү мына ушул кабырчыктардан көз каранды. Башынын асты жағында спиралга окшоп бураалган түмшүгү (тұтұғы) бар. Түмшук төмөнкү жаак менен төмөнкү эриндин кошулуусунан пайды болот.



49-сүрөт. Көпөлөктөр:

- 1 – поликсина; 2 – сары калдыркан; 3 – сары көпөлөк; 4 – долоно көпөлөгү;
- 5 – буурчак ак көпөлөгү; 6 – баркыт көпөлөк; 7 – көгүш көпөлөк; 8 – зорька;
- 9 – подаларий; 10 – боз сатир; 11 – седептуу чоң калдыркан; 12 – тоос көз;
- 13 – чалканчы калдыркан; 14 – кызғылт үкү көпөлөк.

Гүлдүн нектары менен азыктанат. Ал үчүн тумшугун туштап, гүлдүн ичине сугат жана нектарды сорот. Көпөлөктөрдүн сөөлжан сымал личинкасынын денеси муунактарга бөлүнгөн болуп, *гусеница* деп аталат. Ооз органдары да көпөлөктүкүнөн айырмаланып, катуу азыкты кемирүүгө ылайыкташкан. Гусеницанын көкүрөк бөлүгүндө 3 жуп чыныгы буттар, курсак бөлүгүндө 5 жуп *жалган буттар* болот. Жалган буттары жоондугу, муунактарга бөлүнбөгөндүгү жана таман бөлүгүндө майда илмекчелердин болушу менен көкүрөк буттарынан айырмаланат. Гусенициалар жалган буттары менен аракет жасайт; көкүрөк буттары менен азыкты кармап турат.

Капуста көпөлөгү. Капуста көпөлөгүнүн гусенициалары капуста, шалгам, чамгыр, койчу баштык сыйктуу кайчылаш гүлдүүлөр тукумундагы өсүмдүктөрдүн жалбырагы менен тамактанат. Анын канаттары ак түстө болгондуктан *ак көпөлөк* деп да айтылат. Алдыңкы канатынын чет жагында чоң кара тагы болот (47-сүрөткө кара). Көпөлөк конгондо канаттары арт жагына тигинен кайрылат. Канаттарынын асты жагы жашыл-саргыш түстө болгондуктан жалбырактын арасынан аны байкоо кыйын.

Жумурткаларын өсүмдүктөр жалбырагынын астына тууйт. Жумурткалардан чыккан жаш гусенициалар баштап сары түстө болот, кийин өрчүп, көк-жашыл түскө кирет. Анын арт жагында жана капиталдарында бир нече катар сары жана кара тактары болот. Гусенициалар тулөп өрчүйт. Жетилген гусенициалар дарак же дубалдарга жөрмөлөп чыгып, куурчакчага айланат. Куурчакчадан чыккан көпөлөктөр бир нече saatтан кийин уча баштайт.

Тыт жибек курту. Адамдар байыртадан курт-кумурскалардын жашоо-тиричилиги менен тааныш болгон. Аларды көпөлөк гусенициаларынын пилла токушу кызыктырган. Тыт жибек курту эң байыркы колго үйрөтүлгөн түр эсептелет. Анын мекени Гималай болуп, аны мындан 5 000 жыл илгери кытайлыктар багышкан. Азыр жибек курту Япония, Кытай, Бразилия, Орто Азия, Түштүк-Чыгыш Азия, Түштүк Европа, Кавказда багылат.

Жибек куртунун көпөлөгү 4–6 см узундукта, канаттары ағыш түстө болот (50-сүрөт). Көпөлөктөр колго үйрөтүлгөндүктөн учуу жөндөмдүүлүгүн жоготушкан. Эркек көпөлөктөр ургаачыларына караганда ичкерээк, муруттары узун болот. Көпөлөктөр тамактанбайт, уруктанып жумуртка туугандан кийин өлөт. Курттун жибек суюктугун ажыратуучу шилекей бездери абдан күчтүү өрчүгөн жана



дene көндөйүн толтуруп турат. Бул бездер иштеп чыгарган суюктук абада катканда 1000–1500 м жип алынат. Курт ошол жиптерден *пилла* токыйт жана анын ичинде куурчакчага айланат. Курт тек гана тыттын жалбырагы менен тамактангандығы үчүн *тыт жибек курту* деп аталат.

Жибекчилик же пиллачылык эл чарбачылыгынын бир тармагы. Ал тыт жибек куртун өстүрүү, анын продукциясын иштетүүнү өз ичине алат. Жибек курту атайын секилерде кармалат. Куртту багуу 20–24 күнгө созулат. Бул мезгилде төрт жолу түлөп, бешинчи жашка өтөт. Бул жашта анын узундугу 8–9 см ге жетет. Түлөп жаткан курттар аракеттенбейт жана тамактанбайт, бул стадияга «уйку стадиясы» дейилет.

Курттар куурчакчага айланышы үчүн кургатылган майда бутак коюлат. Курттар бутактын үстүнө чыгып, үч күн ичинде денесинин айланасына пилла токуп, куурчакчага айланат. Пилла чогултуулуп, жибек алуу үчүн фабрикаларга жөнөтүлөт. Фабрикада пилланын ичиндеги қуурчакча ысык-суу же буунун таасиринде өлтүрүлөт; пилладан болсо жип ийрилет. 1 кг пилладан 90 г женил жана бышык табигый пилла алынат.

Жибекчилик илим-изилдөө институтунун окумуштуулары жибек куртунун ак пилла берген жогорку түшүмдүү тукумун жана тыттын тоюмдуу жалбырак берген сортторун жаратышкан.

1. Көпөлөктөр кандай түзүлгөн?
2. Көпөлөктөрдүн гусеницасы кандай түзүлгөн?
3. Капуста көпөлөгү кандай өрчүйт?
4. Тыт жибек курту кандай түзүлгөн?
5. Тыт жибек курту кантип бағылат?
6. Жибек курту кантип пилла токойт?



1. Көпөлөктөрдүн гусенициалары:
 - а) өсүмдүк, жаныбарлардын ткандары менен тамактанат;
 - б) гүлдүн нектары менен тамактанат;
 - в) курсак бөлүгүндө 5 жуп жалган буттары болот.



2. Капуста көпөлөгүнүн канаттарынын:
 а) четинде чоң кара тагы болот;
 б) четинде жашыл тактары бар;
 в) ири кызгылт тактары болот.

Сөздүк дептериңе жазып ал.

Кабырчык канаттар, капуста көпөлөгү, ак көпөлөк, тыт жибек курту, пилла, жибекчилик, жалган буттар, уйку стадиясы.

Табышмактарда кайсы жаныбарлардын түзүлүшү жана жашоосу сүрөттөлгөн?

- | | |
|--|--|
| 25. Учуп жатса — күш дебе,
Конуп алса — гүл дебе.
Эгер качып жөнөсө,
Кармайын деп кам жебе. | 26. Канаты гүлгө окшойт,
Соргучу кылга окшойт.
27. Бутактагы жумуртканын токсону,
Жалбырактан көйнөк токуп койгону. |
|--|--|

Туура жооптор: 1б, 2а.

25-§

Жаргак канаттар түркүмү: бал аарылар


Жаргак канаттарга бал аары, сары аары, эшек аары, чабарман жана кумурска кирет.

Бал аары үйүрү. Үйүрдө 10000–50000, кээде 100000 ге чейин жумушчу аары, бир эне жана бир нече жүздөгөн эркек аары болот. Алар жыгачтан жасалган атايын кутуларда багылат. Бал челеекте алар момдон алты кырдуу ячейкаларда жашайт.

Бал аарылардын түзүлүшү. Эне, жумушчу, эркек аарылардын тышкы көрүнүшү айырмаланат. Эне аары жана эркек аарылар жумушчуларынан кыйла ири келет. Ургаачы жана жумушчу аарылардын курсагынын учунда сайгычы бар. Эркек аарылардын муруттары, көрүү органдары күчтүү өрчүгөн; сайгычы жок.

Жумушчу аарылар — чоңойбогон ургаачы аарылар. Башынын капиталдарында эки татаал көзү бар, алардын арасында үч жөнө-көй көзчөсү жайлашкан. Башынын алдында жайлашкан эки муруту жыт билүү органы саналат (51-сүрөт). Аарылар гүлдүн жыты менен түсүн жакшы ажыратышат. Алардын көздөрү сары жана көк түстөрдү, биздин көзүбүз сезбеген ультра кызгылт-көк нурларды көрө алат, бирок кызыл түстү көрбөйт. Жумушчу аарылар жогорку жаактары жардамында момдон «чөнтөкчөлөр» жасайт жана аталыктардан гүлдүн чаңын алат. Төмөнкү эрини менен жаактары

51-сүрөт. Бал аарынын түзүлүшү:
 1 – муруттар; 2 – татаал көзү; 3 – жөнөкөй көзчөлөрү; 4 – башы; 5 – көкүрөгү; 6 – эрини; 7 – ооз соргуч аппараты; 8 – 9 – 10 – буттары; 11 – себетчеси; 12 – кылчасы; 13 – сайгычы; 14 – курсагы; 15 – алдыңкы канаттары; 16 – арткы канаттары.



өзгөрүп, түтүк сымал соруучу ооз аппаратын түзөт. Бул органы менен ал гүлдүн нектарын сорот. Ошондуктан аарынын ооз органдарына *кемирип-жалаоочу* дейилет.

Жумушчу аары арткы буттарындагы себетче менен түкчөлөр жардамында гүлдүн чаңын жыйнайт. Аары чакканда анын ийнеси теринин ичинде үзүлүп калат; майып болгон аары өлөт.

Бал аары үйүрүнүн жашоосу. Эне аары менен эркек аарылардын ооз органдары жакшы өрчүбөгөндүктөн, өз алдынча азыктана албайт. Жумушчу аарылар уяны тазалоо, коргоо, эне жана эркек аарыларды, гусеницаларды тамактандыруу, гүлдүн чанчалары менен нектарын жыйноо жумуштарын аткарышат. Нектар чөнтөкчөлөрдө балга айланат. Жумушчу аарылар гусеницаларды гүлдүн чанчалары жана бал менен багат.

Жаңы үйүр май-июнь айларында үйүгүшүү убагында пайда болот. Азык мол болгондо эне аары уруктанган жана бир аз уруктанбаган жумуртка тууйт. Уруктанбаган жумурткалардан эркек аарылар, уруктангандарынан жумушчу аарылар чыгат. Личинкалардын бирин жумушчу аарылар өз алдынча тарбиялап, эне аары чыгарышат. Эски эне аары бир топ жумушчу аарылар менен кошо уядан чыгып, кандайдыр бутакка конот. Алар башка бал чөлөктөргө жайлыштырылат. Суук күндөрдүн түшүшү менен жумушчу аарылар эркектерин уядан кууп салышат.

Бал аарылар «тили». Жумушчу аарылардын түрдүү кыймылдар жардамында маалымат алмашуусу «бал аарылар тили» деп аталат. Алар нектарга бай гүлдү тапканда, курсагын силкилдетип, бийлеген өндүү кыймыл жасашат. Бул кыймылдар аларга шире жыйноо үчүн кай жакка баруу керектигин билдириет.

Бал аарылардын жаратылыштагы жана адамдардын жашоосундагы ролу чон. Көптөгөн өсүмдүктөр бал аарылардын жардамында чаңдашат. Бал аарылар чаңдаткан өсүмдүктөр мол түшүм берет. Бал баалуу жана дарылыштык азық эсептелет. Анын курамында оңой сине турган канат заттары, организм үчүн өтө зарыл болгон ар түрдүү минералдар бар. Дарыгерлер алсыз кишилер үчүн бал жегенди сунаштыктында да жаңылышат. Бал аарынын уусунан медицинада дары-дармектер даярдашат, момунан болсо техникада пайдаланышат.

Кумурскалар да аарылар сыйктуу үйүр болуп жашаган жаргак канаттуулардан саналат. Алар курсак бөлүмүнүн эки муундуу ичке бел аркылуу көкүрөккө кошулушу, ошондой эле башынын ирилиги жана жаактарынын күчтүү өрчүгөндүгү менен башка жаргак канаттуулардан айырмаланат. Кумурскалардын үйүрү бир нече мин, алтургай миллиондогон индивиддерден турат. Индивиддеринин арасында бир нече эне, ондогон эркек жана бир нече миндеген жумушчу кумурскалар болот. Жумушчу кумурскалар өрчүү жөндөмдүүлүгүн жоготкон ургачыларынан турат. Алар чала синген азығы менен гусеницаларын, жоокерлерин жана эне кумурсканы азыктандырышат. Кумурскалар топуракта татаал, көп бөлмөлүү ин курушат.

Көпчүлүк кумурскалар пайдалуу курт-кумурскалардан саналат. Жазы жана ийне жалбырактуу токойлордо жашаган сары токой кумурскасы зыянкеч курт-кумурскаларды кырып, дарактарды коргойт. Орто Азия чөлдөрүндө тараалган учкур фаэтон кумурскасы майда зыянкеч курт-кумурскалар, өсүмдүктөрдүн даны жана мөмөсү менен азыктанат. Талаа жана чөлдөрдө кездешкен кумурскалар өсүмдүк даны менен азыктанат. Үйлөрдөгү сары фараон кумурскасы накта таттууларды жактырат. Бактардагы кара кумурскалар өсүмдүк митеси ажыраткан суюктукту жеп, дарактарды жырткыч курт-кумурскалардан коргойт.



1. Бал аарылардын үйүрү кандай аарылардан турат?
2. Жумушчу аарылар кандай милдет аткарышат?
3. Нектар кантип балга айланат?
4. «Үйүгүшүү» деген эмне?
5. «Бал аарылардын тили» деген эмне?
6. Бал аарылар жаратылышта кандай мааниге ээ?



1. Бал аарылардын үйүрү кандай аарылардан турат?
- а) өтө көп жумушчулар, жоокерлер, бир эне аары;
- б) бир эне аары, бир нече жумушчу, өтө көп эркек аары;
- в) бир эне аары, өтө көп жумушчу, бир нече эркек аары.

2. Аарылар гусеницаларын эмне менен багышат?
- нектар, гүлдүн чаңчасы;
 - бал, гүлдүн чаңчасы;
 - гүлдүн чаңчасы, мом.



Төмөнкү табышмактарда кайсы жаныбарлардын түзүлүшү жана жашоосу сүрөттөлгөн?

- | | |
|---|---|
| 28. Күш эмес — учат,
Чаян эмес — чагат.
Эртели-кеч зынылдап,
Эмгектенип тынбайт. | 29. Зуу барат да, зуу келет,
Анын үйү — бал чөлөк. |
| 31. Эртели-кеч тынбайт,
Кыштыгына дан камдайт. | 30. Өзү кылдай,
Башы зылдай. |

Туура жооптор: 1в, 2б.

26-§

Кош канаттар түркүмү

Үй чымыны — өтө кыймылдуу курт-кумурска. Денеси майда түкчөлөр менен капиталган (52-сүрөт). Төмөнкү эрининин учу калындашып, жаздыкча сымал жалоочу түтүкчөнү түзөт. Үй чымыны тамак-аш продуктуларын узун түтүгү менен жалоо аркылуу тамактанат. Азыктын даамын алдыңкы буттарынын манжаларында жайгашкан түкчөлөрдүн жардамында сезет.

Чымындын гусеницасы таштанды, даараткана жана айбандардын занында өрчүйт. Башы жана буттары болбойт, дene сыртындагы кичинекей дөмпөкчөлөр жардамында аракеттенет. Бат өсөт жана то-



52-сүрөт. Үй чымыннын өрчүшү:

1 — ургаачысы; 2 — жумурткалары; 3 — гусеницасы; 4 — куурчакчасы; 5 — жаш чымын.


туракка чыгып, куурчакчага айланат. Чымын абдан тукумчул келет, ар 2–4 күндө 100–150 дөн жумуртка туйт. Бир сезондо чымындын 8–10 тукуму өрчүп-өсөт. Бир ургаачы чымындын тукуму бир сезондо 5000000000 га жетиши мүмкүн. Чиркейлер ич өткөк, келте, чума, учук, дифтерит сыйктуу оорулардын микробдорун, чүчөк куртунун жумурткаларын таратат. Алар даараткана, булганыч жерлерден буттарына микробду илээштирең, тамак-ашка конуп, микробдорун жуктурат.

Чымындар бат көбөйүп кетпестиги үчүн турак-жайлардын айланасын дайыма таза сактоо, түрдүү таштандыларды өз убагында жоготуп туруу зарыл. Ўйлөрдө чымындар жабышкактарды коюу жана ар түрдүү уулуу заттарды себүү менен жоготулат.

Кош канаттардын көп түрдүүлүгү. Бир нече түрү адамдарда жана жаныбарларда мителик кылат. Чиркейлердин ургаачысы адамдардын жана жаныбарлардын канын сорот. Эркек чиркейлер өсүмдүктүн ширеси менен тамактанат. Чиркейлердин гусеницалары көлчүктөрдө жана көлмө сууларда өрчүйт. Чиркейлер кан соруп, адамдардын жана жаныбарлардын тыңчын алуу менен бирге безек оорусун таратат. Жаз жана жай сезонунда чиркейлердин бир нече тукуму өрчүйт. Турак-жайлардын подвалдарында алар кышында да өрчүшү мүмкүн.

Желимчилер – чиркейлерге окшош майда курт-кумурскалар. Алар чөлдөрдөгү кемириүүчүлөрдүн ийиндеринде көп кездешет. Жаныбарлардын жана адамдардын канын сорот. Адамга тери лейшмания оорусунун козготуучусун жуктурат. Мындай оору түштүк облустарда кездешет.

Көгөөн жана **сайгактардын** тышкы көрүнүшү чымындардыкына окшош (53-сүрөт). Көгөөндөр жаныбарлардын терисин жаактары жардамында тешип, канын сорот. Алар чөл зоналарында көп



53-сүрөт. Кош канаттардын көп түрдүүлүгү:

1 – көгөөн; 2 – сайгак; 3 – этчил жашыл чымын; 4 – тарпчы боз чымын.

кездешет; ысык жай мезгилдеринде бакма жаныбарлардын тынчын алат. Сайгактын гусеницалары бодо мал терисинин астында, жылкылардын карынында, койлордун мурун көндөйүндө мителик кылып, алардын продукттуулугун төмөндөтөт.



1. Үй чымыны кандай түзүлгөн?
2. Чымындардын гусеницалары кандай өрчүйт?
3. Чиркейлер кандай зыян келтириет?
4. Желимчилир кандай зыян келтириет?
5. Көгөөндердүн зыяны эмнеден турат?
6. Сайгактар кандай зыян келтириет?



1. Үй чымынынын гусеницасынын:
 - а) башы менен буттары өрчүбөгөн;
 - б) ооз органдары соруучу;
 - в) курсак буттары кыска.
2. Көгөөн ысык жай мезгилинде:
 - а) аз кездешет;
 - б) түнкүсүн кездешет;
 - в) жаныбарлардын тынчын алат.



1. Курт-кумурскаларды, алардын маанилерин жуптап көрсөт.

а) үй чымыны;	1) терини тешип, кан сорот;
б) көгөөн;	2) лейшманияны таратат;
в) сайгак;	3) безекти жуктурат;
г) желимчилир;	4) ич өткөктүн микробун жуктурат;
д) чиркей;	5) мурун көндөйүндө мителик кылат.

Сөздүк дептерине жазып ал.

Чымын, чиркей, көгөөн, сайгак, чымындар, безгек, ич өткөк, ич келте, микробдор.



Суроого жооп тап. Чымындар таштандыны жактырса да, тазалыкка сактаган жаныбарлар саналат. Таштанды жалаган чымын тойгондон кийин жылуу жана жарық жерге отуруп алып, алдыңкы буттарынын манжаларын абдан тазалайт. Чымындар эмне себептен минтишет?

Төмөнкү табышмактарда кайсы жаныбарлардын түзүлүшү жана жашоосу сүрөттөлгөн?

32. Кичинекей ажыдаар
Кулагымын астынан
Күнгүрөнүп өттү.
Шапалак тартсан,
Сөөксүз экен
Эзилип кетти.

Туура жооптор: 1а, 2в.

Жуптап жаз: а-4, б-5, в-1, г-2, д-3.

27-§

Курт-кумурсклардын келип чыгышы жана мааниси

Курт-кумурсклардын жаратылыштагы жана кишинин жашоосундагы мааниси. Жаратылышта көптөгөн жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн жашоосу курт-кумурскалар менен байланыштуу. Курт-кумурскалар чабалекейлер, тонкуулдактар, таранчылар жана башка канаттуулар, сүт эмүүчүлөрдөн жарганаттар жана кирпилер, дээрлик көпчүлүк кескелдириктер, жерде-сууда жашоочулар, бир топ балыктар үчүн негизги азық болуп саналат. Ал тургай курт-кумурсклардын арасында да башка курт-кумурскалар менен тамактанган жырткычтары көп кездешет. Бир топ дан жечүй канаттаттуулар да балапандарын курт-кумурскалар менен багат.

Тарпчыл жана кыкчыл конуздардын, чиркейлердин гусеницалары жаныбарлар өлүгү жана тезеги менен азыктанат. Өсүмдүк калдыкторы менен тамактанган курт-кумурскалар алардын чиришин тездетет. Жаныбарлар жана өсүмдүктөрдүн калдыкторы менен азыктанган курт-кумурскалар жердин бетин булгануудан сактагандыктан аларга «жаратылыш санитарлары» дейилет.

Көптөгөн гүлдүү өсүмдүктөр курт-кумурскалар жардамында чаңдашып, мол түшүм берет. Дээрлик бардык кайчы гүлдүүлөр, роза гүлдүүлөр, гүлкайыр гүлдүүлөр, каакым гүлдүүлөр, пияз гүлдүүлөр, жоогазын гүлдүүлөр, бакча эгиндери курт-кумурскалар жардамында чаңдашат. Түктүү аарылар беде жана эспарцеттин негизги чаңдаштыруучусу саналат. Гречиха, күн карама жана анжир жапайы аарылар жардамында чаңдашат.




Зыянкеч курт-кумурскалар. Кээ бир курт-кумурскалардын саны аябай көбөйүп кетиши менен эгиндерге чоң зыян жетет. Зыянкеч курт-кумурскалардын тизмегине курт-кумурскалардын 700 дөн ашуун түрү киргизилген. Дан эгиндерине азия чегирткеси жана хасва, жер жемиш, бакча эгиндерине өсүмдүк митеси, мөмөлөргө алма мөмөчүлү (54-сүрөт), гозого гозо түн катаары, картошкага колорадо конузу (55-сүрөт) чоң зыян келтириет.

Кампадагы азық-түлүк продуктуларына мите конузу зыян жеткирет. Мите жана анын личинкасы дандын ички бөлүгүн жейт. Үйдөгү үй күбөсү көпөлөгүнүн гусеницасы жүн, жүндөн жасалган буюмдарды жараксыз қылат.

Жыгач имаратка, шаар жана айылдардагы үйлөрдүн жыгач бөлүктөрүнө, ошондой эле, тарыхый эстеликтерге термиттер чоң зыян жеткирет. Термиттен жабыркаган имарат жер титирөө, суу ташкыны сыйктуу табигый кырсыктарда бат кулап түштөт.


Мите жана оору таратуучу курт-кумурскалар. Биттер жана бүргөлөр (56-сүрөт) түркүмүнө таандык бардык курт-кумурскалар, көпчүлүк чиркейлер, кээ бир чымындар, төшөк канталалары адамдардын жана жаныбарлардын канын соруп, тынчын алат. Кан соргуч курт-кумурскалар, ошондой эле чымындар бир топ ооруларды таратат. Адамдарга биттер келте, келемиштин бүргөсү өлөт, безгек чиркейи безгек ооруларын жуктурат. Үй чымындары тамак-аш жана идиш-аяк аркылуу ич өткөк, гепатит жана учук сыйктуу ооруларды таратат.

Зыянкеч курт-кумурскаларга каршы биологиялык күрөш. Биологиялык күрөшүүнүн негизин зыянкечтерге каршы алардын өлтүр-



**55-сүрөт. Колорадо конузунун
өрчүшү:**

- 1 – конуздар;
- 2 – гусеницалары;
- 3 – жалбырак астындағы жумурткалары;
- 4 – топурактагы куурчакчасы.



56-сүрөт. Мите жана оору таратуучу курт-кумурскалар:

А – бүргө: 1 – чоңойгон стадиясы; 2 – куурчакчасы; 3 – гусеницасы; Б – бит: 1 – чоңойгон стадиясы; 2 – сиркеси; В – кадимки чыйылдак чиркей; Г – безек чиркей.

Гүчтөрүнөн пайдалануу түзөт. Зыянкеч курт-кумурскаларга каршы күрөшүүдө эл кайда көчөт, алтын көз жана чабандестер трихограммага, габробраконго, инкарзияга каршы колдонулат. Ал үчүн биологиялык лабораторияларда жырткыч жана мите курт-кумурскалар жасалма жол менен өстүрүлүп, талааларга таратылат.

Биологиялык күрөштүн дагы бир усулу эгин талааларында ыңгайллуу шарт түзүү менен пайдалуу жаныбарларды таратуу, алардын санын көбөйтүүдөн турат. Мындай усул уулу химиялык заттарды колдонууну чектөө, которуштуруп эгүүнү киргизүү, пайдалуу жаныбарларды коргоо аркылуу ишке ашырылат.

Муунак буттуулардын келип чыгышы. Муунак буттуулардын теги төмөнкү түзүлгөн муунак курттар саналат. Трилобиттер муунак курттар менен муунак буттуулардын ортосундагы аралык жаныбарлар болуп эсептелет. Алардын түзүлүшү көп түктүүлөргө окшош болуп, денесинин ар бир муунакчасында бир жуп бирдей түзүлүштөгү буттары болот. Тарыхый өнүгүү процессинде муунак курттардын сүзгүч өсүндүлөрү буттарга айланган; жука териси калындашып, хитин каптоосу пайда болгон. Мына ушундай жол менен муунак курттардан жөнөкөй түзүлүштөгү байыркы муунак буттуулар – трилобит сымалдар, алардан рак сымалдар жана жөргөмүш сымалдар, курт-кумурскалардын болсо рак сымалдардан пайда болгондугу болжол кылынат.



1. Курт-кумурскалар жаратылышта кандай мааниге ээ?
2. Курт-кумурскалар өсүмдүктөр үчүн кандай мааниге ээ?
3. Кандай курт-кумурскалар зыянкеч эсептелеет?
4. Мите курс-кумурскалар кандай зыян келтириет?
5. Кайсы оорулар курт-кумурскалар аркылуу таралат?
6. Зыянкечтерге каршы биологиялык күрөш деген эмне?
7. Муунак буттуулар кандайча пайда болгон?



1. Органикалык заттар менен тамактанган курт-кумурскаларга:
а) чөп, эт жечү дейилет;
б) табият санитарлары дейилет;
в) тарпчылдар дейилет.
2. Зыянкечтердин өлтүргүчтө-рунөн пайдалануу:
а) биотехнологиялык процесс;
б) таза продукт алуу;
в) биологиялык күрөш.



- Курт-кумурскалардын аттарын мааниси менен жуптап жаз.
- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| а) Азия чегирткеси; | 1) беде, эспарцетти чандатат; |
| б) хасва канталасы; | 2) жүн материалдарын бузат; |
| в) түктүү аарылар; | 3) дандарды бузат; |
| г) мите конузу; | 4) келте оорусун таратат; |
| д) үй күбөсү; | 5) эгиндерди жеп бүтүрөт; |
| е) бүргөлөр; | 6) дан эгиндерин сорот; |
| ё) биттер. | 7) өлөт оорусун таратат. |

Сөздүк дептерине жазып ал.

Тарпчылдар, кыкчылдар, жаратылыш санитарлары, мите, үй күбөсү, биттер, бүргөлөр, өсүмдүк митеси, биологиялык каршы күрөшүү, биологиялык лаборатория, трилобиттер.



Суроого жооп тап. Бүргө бийиктикке секириүү боюнча курт-кумурскалардын чемпиону эсептелеет. Узундугу 3 мм болгон бүргө 50 см бийиктикке секире алат. Бою 170 см болгон киши бүргөгө тен өзүн келүү үчүн канча бийиктикке секириүүгө тишиш? Эмне себептен бийиктикке секириүүдө киши бүргөгө тен келе албайт?

Төмөнкү табышмакта кайсы жаныбарлар жөнүндө маалымат берилген?

33. Жыт билет, ит эмес,
Кичине, бирок бит эмес.
Кишини кыйын кордойт,
Кан соргонун койбойт.

Туура жооптор: 16, 2в.

Жуптук жооптор: а-5, б-6, в-1, г-3, д-2, е-7, ё-4.

VIII
ГЛАВА

ХОРДАЛУУЛАР ТИБИ


Хордалуулар тиби ланцетниктер, кемирчектүр балыктар, сөөктүр балыктар, жерде-сууда жашоочулар, канаттуулар, сүт эмүүчүлөр классына бөлүнөт. Хорданын үстүндө нерв түтүкчөсү, анын астында ичеги жайлышкан. Бакалоор же өпкө менен дем алат.

28-§

Ланцетник – төмөнкү түзүлүштүү хордалуу жаныбар

Жашаган чөйрөсү, тышкы түзүлүшү. Ланцетниктер тропик жана мелүүн климаттуу дениздерде, ошонун катарында, Кара денизде таралган. Кызгылт-сары түстүү тунук денесинин узундугу 4–8 см болуп, эки капталы жалпақ, алдыңкы жана арткы жактары бир аз кууш келет (57-сүрөт). Тери бүгүштөрү менен капталган күйрук сүзгүчү кош миздүү хирургиялык аспап – ланцетке окшойт. Ошондуктан бул жаныбар *ланцетник* деп аталат. Өмүрүнүн көп бөлүгүн дениз түбүндөгү кумга көмүлгөн абалда өткөрөт. Кумдан ланцетниктин алдыңкы ооз жагы гана чыгып турат. Ооз тешиги 10–20 жуп тинтүүр менен курчалган.

Хордасы жана булчундары. Хордасы денесинин арт жагында узуннан жаткан кылга окшош бышык октон турат. Хорда жыш жайлышкан атайын клеткалардан түзүлгөн болуп, ички органдары үчүн



57-сүрөт. Ланцетниктин түзүлүшү:

- 1 – хордасы; 2 – нерв түтүгү; 3 – кулкуну; 4 – бакалоор алды көндөйү; 5 – бакалоор алды көндөйүнүн тешиги; 6 – боору; 7 – ичегиси; 8 – арткы чыгаруу тешиги; 9 – жыныстык бездері.

таяныч скелет милдетин аткарат, денени ийилгич кылып турат. Ланцетниктин жана ага окшош төмөнкү түзүлүштөгү хордалуулардын хордасы бүт өмүрүнүн аягына чейин сакталып калат. Баш мээси жана баш сөөгү болбойт. Ошондуктан ланцетниктер *баш сөөксүз хордалуулардын* кенже тибине кирет.

Ланцетниктин булчундары капиталдарында узатасынан жаткан тасмалар түрүндө жайлашкан. Ланцетник абдан жөнөкөй кыймыл жасайт: денесин бул же тигил жакка ийип сүзүп жүрөт, же болбосо кумду жарып кирип алат.

Тамак сицириүү системасы. Оозу атайын чункурча – *ооз олды күйгүчүнда жайлашкан* болуп, тинтүүрлөр менен курчалган. Тинтүүрлөр жардамында суу ооз көндөйүнө шиленет. Абдан майда планктондук организмдер суунун агымы менен кошо ооз аркылуу кулкунга өтөт жана анын ички беттерине жабышат. Азык кулкундан ичегиге түшүп сицирилет. Суу кулкундуң ички беттериндеги *бакалоорлордун жылчыктары* аркылуу чыгып кетет. Синбеген калдыктар күйрук сүзгүчүнүн астында жайлашкан арткы чыгаруу тешиги аркылуу сыртка чыгарып жиберилет.

Дем алуу органдары. Ланцетник кулкунунун капиталдарында абдан көп жылчык сымал *бакалоор тешиктери* бар. Аларды сырт жактан капитап турган тери бүгүштөрү *бакалоор алдынdagы көндөйдү* түзөт. Бакалоор тешиктеринин бети абдан көп майда кан тамырлар – капиллярлар менен капиталган. Капиллярлардын бетинде кан менен суунун ортосундагы газ алмашуу жүрөт. Тери бүгүштөрү бакалоорлорго кумдун киришине жол койбойт.

Кан айлануу системасы хордалуулардыкы сыйктуу жабык. Кан жалгыз кан айлануу тегерегинде агат. Негизги кан тамырлары курсак жана арткы аортадан турат. Көмүр кычкыл газы менен байыган кан курсак аортасы аркылуу алдыга, бакалоорлордун капиллярларына агат. Анда кан көмүр кычкыл газын сууга берип, кычкылтек менен байыйт жана арткы аортага чыгат. Мындан кан кичирээк тамырлар, капиллярлар аркылуу денеге тарайт. Ткандарда көмүр кычкыл газы менен байыган кан курсак аортасына куюлат. Ланцетниктин жүрөгү болбойт. Ири тамыр беттеринин жыйрылыши менен кан агып турат.

Бөлүп чыгаруу органдары. Ланцетниктин бөлүп чыгаруу органдары муунак курттардыкына окшош түзүлүштөгү түтүкчөлөрдөн турат. Бирок түтүкчөлөр кулкунду узатасынан бойлой жайлашкан болуп, бакалоорлордун алдынdagы көндөйгө ачылат.

Нерв системасы хорданын үстүндөгү денени бойлой кеткен *нерв тұтұғунөн* турат. Нерв тұтұқчөсүнөн ички органдарга жана дененин сыртына абдан көп нервдер тарапат. Сезүү органдары абдан күчсүз өнүккөн. Теринин астында нерв тұтұқчөсүн бойлой бир тегиз жайлышкан жарыкты сезүүчү клеткалар көрүү милдетин аткарат. Алар жарыкты гана сезет. Ошондуктан тынчы кетип, кумдан чыккан ланцетник жарыктан качып, бат эле кумга көмүлүп алат. Терисинин сыртындағы нерв клеткалары аркылуу ланцетник химиялық жана механикалық таасирлерди туят.

Ланцетниктин омурткасыз жаныбарларга окшоштугу. Ланцетники орус окумуштуусу А. О. Ковальский ачкан. Түзүлүшүнүн көп белгилери: хорданын болушу, нерв системасынын тұтұқ сымал болуп, дененин арт жагында жайлышкандығы анын анық хордалуу жаныбар экендигин көрсөтөт. Ошону менен бирге бөлүп чыгаруу системасынын жана булчундарынын түзүлүшү, жүрөгүнүн жана баш мәэсисин болбостугу менен чыныгы хордалуулардан айырмаланат. Аны түзүлүшүн үйрөнүү менен бардық хордалуу жаныбарлардын келип чыгышын түшүнүүгө болот.

Көбөйшүү. Ланцетник – айрым жыныстуу жаныбар. Жыныстык органдары жаак алды көндөйүнүн капитал жагында жуп-жуп болуп жайлышкан. Жетилген жумурткалары сууга түшүп өрчүйт.

Хордалуулардын жалпы мүнөздөмөсү. Хордалуулардын денени бойлой өткөн ок скелети – хордасы болот. 43000 ге жакын түр кирет. Баш сөөксүздөргө жана баш сөөктүүлөргө, б.а. омурткалуулардын кенже тибине бөлүнөт. Баш сөөксүздөрдүн баш мәэси жана баш сөөгү өрчүбөгөн, скелети хордадан турат. Аларда хорда өмүрү бою сакталат. Бул типке ланцетниктер классы кирет.

Баш сөөктүүлөрдүн борбордук нерв системасы баш мәэ менен арка мәэден, скелети кемирчектен же сөөктөн турат; хорда эмбриондук өрчүү стадиясында гана болот. Аларга кемирчектүү жана сөөктүү балыктар, жерде-сууда жашоочулар, сойлоп жүрүүчүлөр, канаттуулар жана сүт эмүүчүлөр кирет.



1. Ланцетник кандай күн көрөт?
2. Ланцетниктин скелети жана булчундары кандай түзүлгөн?
3. Ланцетниктин тамак синириүү системасы кандай түзүлгөн?
4. Ланцетник кандай дем алат?
5. Ланцетниктин каны тулку боюн бойлой кандайча агат?
6. Ланцетниктин бөлүп чыгаруу системасы кандай түзүлгөн?
7. Нерв системасынын төмөнкү түзүлүш белгилери эмнеде?



Ланцетниктин төмөнкү түзүлүштө экендинин белгилери:

- а) баш мәсси болбойт;
- б) бакалоору менен дем алат;
- в) баш сөөгү өрчүбөгөн;
- г) скелети хордадан турат;
- д) кан айлануу системасы туюк;
- е) ооз тешиги тинтүүрлөр менен курчалган;
- ё) хорданын скелети өмүрү бою сакталып калат;
- ж) сүзгүчтөрү тери бүгүшүнөн турат.

Сөздүк дептерине жазып ал.

Хордалуулар, баш сөөксүздөр, омурткасыздар, омурткалуулар, баш сөөктүүлөр, ланцетник, хорда, ооз алды күйгүчү, бакалоор тешиктери, бакалоор бүгүштөрү, бакалоор алды көндөйү.

Туура жооптор: а, ё, г, е.

8.1. БАЛЫКТАР

Балыктар – сууда жашоочу хордалуу жсаныбарлар. Денеси эки капталынан жалпакташкан, кабырчыктуу, үч так, эки жуп сүзгүчтөрү бар. Бакалоор аркылуу дем алат. Жүрөгү эки камералуу, кан айлануу системасы бир тегеректен, нерв системаси баш мәэ жана жүлгүндөн турат.

Балыктардын түзүлүшү сазан балыгы мисалында үйрөнүлөт.


29-§ Тышкы түзүлүшү, скелети, сүзгүч тарсылдагы

Жашаган чөйрөсү, тышкы көрүнүшү. Сазан балыгы Орто Азиянын тоо дарыяларынан башка бардык суу бассейндеринде жашайт. Аны көлдөрдөн, шалы аянттарындағы жылуу суулардан, тынч аккан дарыя өзөндөрүнөн кездештируүгө болот. Сазандын чондугу 1 м ге чейин, салмагы 8–16 кг чейин барат.

Сазандын жана башка көптөгөн балыктардын денеси сүйрү формада: капитал жактарынан жалпакташкан, ал эми баш жана күйрук бөлүктөрү кууш келет (58-сүрөт). Балыктардын башы денесине кыймылсыз түрдө кошуулуп кеткен. Сен суунун абага караганда тыгыз чөйрө экендинин жана кыймыл жасаган телого

58-сүрөт. Сазан балыгынын сыртыны түзүлүшү:

- 1 – бакалоор капкакчасы;
- 2 – көкүрөк сүзгүчтөрү;
- 3 – курсак сүзгүчтөрү;
- 4 – аналдык сүзгүчү;
- 5 – күйрук сүзгүчү;
- 6 – арткы сүзгүчү;
- 7 – капитал сызығы.



көбүрөөк каршылық көрсөтөөрүн билесин. Ошондуктан балыктардын денесинин формасы жана түзүлүшү суунун каршылыгын женип, бат кыймылдоого мүмкүндүк берет.


Сүзгүчтөрү. Сазан балыгы денесин жана күйругун бирде онго, бирде солго ийип, сүзгүчтөрүнүн жардамында алга карай сүзөт. Балыктын так (арткы, күйрук, аналдык) жана жуп (көкүрөк, курсак) сүзгүчтөрү болот. Күйрук сүзгүчү айры. Аналдык сүзгүчтөрү күйругунун астында жайлашкан. Сүзгүчтөрү жука тери жаргакчадан жана аны керип турган сүзгүч нурлардан турат. Алга карай сүзүүдө күйрук сүзгүчтөрүнүн мааниси чоң. Балыктардын жуп сүзгүчтөрү денесин тен салмактуулукта кармап тuruуга жана кыймыл жасаганда бурулууга же токтоого, ошондой эле алга карай акырындык менен сүзүүгө жардам берет.

Териси кабырчыктар менен капиталган. Кабырчыктынын алдыңкы кыры териге бекип, арткы кыры өзүнөн кийинки кабырчыктын четине жабышып турат. Кабырчыктар балыктын денесин тышкы таасирлерден коргойт, анын сүзүшүнө тоскоол болбойт. Балык өскөн сайын кабырчыктар да чоңоюп отурат. Кабырчыктардагы шакектердин саны боюнча балыктын жашын аныктоого болот. Кабырчыктардын сыртындагы тери бездери бөлүп чыгарган жука былжырлуу катмар балыктын денесинин сууда сүрүлүүсүн азайтырып, кыймыл-аракетин женилдетет.

Балык денесинин түсү айлана-чөйрөдөн көз каранды. Түзсуз сууларда жашаган балыктардын денесинин жон жагы баткактын түсүнө окшоп каралжын, курсак жагы агыш түстө болот. Ошол себептүү суу түбүндөгү балыкты жогору жактан байкоо кыйын. Суунун бетинде сүзүп жүргөн балыкка ылдый жактан караганда

анын суу катмарынын агыш түсүнөн ажыратууга болбойт. Тулку боюнун түсү айланы-чөйрөгө ылайык болгондо жаныбарлар жырткычтардын көзүнө чалдыкпайт. Мындай кубулушка коргонуу түсү дейиilet. Сен өткөн сабактардан курт-кумурскалар коргонуу түсүнө ээ болушун билесин.

Скелети. Сазан балыгы скелетинин негизин бүт дөнеспин бойлой башынан куйругуна чейин өткөн омуртка тутуму түзөт. Омуртка тутуму өз ара чала кыймылдуу бириккен 39–42 омурткадан турат. Ар бир омуртка тулкудан, үстүнкү жана астынкы бир жуп омуртка догоорунан турат. Үстүнкү карама-каршы жаткан догоор өз ара туташкандыгы себептүү алардын арасында омуртка түтүгү пайда болот. Бул түтүктүн ичинде жүлүн жайлашкан. Тулкусундагы омурткалардын капитал жактарына кылыш сымал кабыргалары бекиген.



Күйрук омурткаларында кабыргалар болбойт. Алардын астынкы жагында узун кылкандуу сөөкчөлөр орун алган. Омуртка тутумунун алдынкы учу баш сөөгү менен ашташып бириккен.

Сүзгүчтөрүнүн скелети сүзгүч догоору жана ийин курчоо сөөктөрүнөн турат. Курчоо сөөктөрү омуртка тутуму менен туташпагандыгы менен башка омурткалуулардан айырмаланат.

Баш сөөгү баш мәени коргогон мәэ кутусунан, ооз көндөйүн курчап турган жаактардан, бакалоор желбиректеринен жана бакалоор капитактарынын сөөктөрүнөн турат.

Скелет булчундар үчүн таянычтын, ал эми ички органдар үчүн коргоо милдетин аткарат.

Булчундары терисинин астында жайлашкан болуп, сөөктөргө бекиген. Булчундардын жыйрылышы жана жазылышы натыйжасын-

да балыктар денесин ийип аракет жасайт. Тулкусунун арт жагы менен күйругундагы булчундары күчтүү өрчүгөн.

Сүзгүч тарсылдагы курсак көндөйүндө, ичегинин үстүндө жайлышкан. Ал ортосунан тартылып эки бөлүнгөн, газ менен толгон күмүш түстүү баштыкчадан турат. Ичке түтүкчө аркылуу ичегиси менен туташкан болот. Жумуртқадан чыкканына 2–3 күн болгондо, личинка суунун бетине көтөрүлүп, атмосфералык аба менен сүзгүч тарсылдагын толтурат.

Бети капилляр кан тамырлары менен капиталган. Балыктын суунун бетине көтөрүлүшү же суунун түбүнө сүңгүшү тарсылдак көлөмүнүн өзгөрүшүнөн көз каранды. Тарсылдагы кенигенде кандан ажырап чыккан газдар аны толтуруп, балык жогору көтөрүлөт. Газдар тарсылдактан ичке түтүкчө аркылуу ичегиге, андан ооз көндөйүнө жана бакалоорлордун жылчыктары аркылуу сууга чыкканда, тарсылдак бошойт. Денеси кыйла оордошкон балык суунун түбүнө сүңгүйт. Сүзгүч тарсылдагынын көлөмү өзгөрбөсө, балык белгилүү терендикте бир орунда турат.

Тарсылдык үндү күчтүп берүүчү резонатордун да милдетин аттарат. Бул болсо үндү жакшыраак угуу мүмкүнчүлүгүн берет.



- Денесинин формасы жашоо чөйрөсүнө кандай ылайыкташкан?
- Балыктардын сүзгүчтөрү кандай түзүлгөн?
- Балыктардын териси кандай түзүлгөн?
- Балыктардын омуртка тутуму кандай түзүлгөн?
- Сүзгүчтөрдүн скелети кандай түзүлгөн?
- Сүзгүч тарсылдагы кандай түзүлгөн?



- Балыктардын жуп сүзгүчтөрүнүн милдети:
 - алга карай жай сүзүү;
 - бурууу;
 - токтоо;
 - алга карай бат сүзүү;
 - төн салмактуулукту сактоо;
 - суунун каршылыгын женүү.

Сөздүк дептериңе жазып ал.

Сүйрү, сүзгүчтөр, балыктар, тери, скелет, омуртка тутуму, кабыргалар, омурткалар, омуртка түтүгү.



Суроого жооп тап. 1. Эмне себептен балыкчынын торуна же торчосуна кирип калган балык кайра чыга албайт? 2. Эмне себептен суунун түбүнде жашаган же бир топ ири балыктардын сүзгүч тарсылдагы болбойт?

Төмөнкү табышмактарда кайсы класска таандык жаныбарлар сүрөттөлгөн?

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 34. Башы бар, кулагы жок, | 35. Кабырчыктуу жаныбар, |
| Канаты бар, буту жок. | Канат күүлөйт, уча албайт. |

Туура жооптор: а, в, д.

4-лабораториялык машигуу. Балыктардын тышкы түзүлүшү жана кыймыл-аракети

Керектүү жабдуулар: тириүү же формалин эритмесинде катырылган сазан балыгы (формалиндүү эритмедеги балык үйрөнүүдөн мурда бир нече saat агып турган сууда жуулат), суулуу аквариум же кененирээк идиш, кол лупасы, айнек таякча.

Тириүү же формалин эритмесинде фиксация кылышын сазан балыгынын тышкы түзүлүшү үйрөнүлөт. Фиксация кылышын балыкты үйрөнүүдөн мурда аны бир нече saat сууда кармап, формалиндик жыты жоготулат.

Лабораториялык машигуу төмөнкү тартилте алып барылат:

1. Балыкты суулуу, кененирээк идишке салып, тулку боюнун түсүнө көнүл бур. Балык денесинин түсү курсак жана сырт жактарында бирдей болбостугунун себебин түшүндүрүп бер. Тулкусунун баш, дene жана куйрук бөлүктөрүнүн туташып кеткендиги, денесинин капитал жактарынан жалпактыгы жашоо чөйрөсү менен кандай байланышта экендигине көнүл бур.

2. Тириүү же жаңы кармалган балыктын териси былжырлуу зат менен капиталгандыгы себептүү балыкты колдо көпкө кармап турууга болбостугун текшерип көр. Балык денесиндеги кабырчыктардын жайлашысын аныктап ал. Кабырчыктардын алдыңкы учу териге бекигенине, ал эми арт жагы теринин үстүндө турушуна көнүл бур. Тери үстүндөгү дененин эки капиталын бойлой кеткен капитал сзыгын тап.


3. Балыктын оозу менен көздөрүнүн жайлашышина көнүл бур. Эриндери менен көздөрүнүн тышкы түзүлүшүн үйрөн. Башынын жогору жагында жайлашкан бир жуп мурун таноолорун тап. Денесинин эки капиталында башынан кийинирээк жайлашкан бакалоор жапкычтарын үйрөн. Аларды көтөрүп, бакалоор жаргактарына көз жүгүрт.

4. Балыктын денесиндеги сүзгүчтөрүн жайлашышина түзүлүшүн үйрөн. Көкүрөк жана курсак, жон, куйрук жана аналдык сүзгүчтөрүнүн түзүлүшүн үйрөн жана алардын милдетин түшүндүр.

5. Суулуу идиштеги же аквариумдагы тириүү балыктын кыймыл-аракетине байкоо жүргүз. Кыймылдагы же кыймылсыз балыктын сүзгүчтөрүн жана тулкусунун абалын аныкта. Балыктын оозун жана бакалоор жапкычтарынын ачылып-жабылуу себептерин түшүндүрүп бер. Аквариумга жем салганда же аквариумдун дубалына айнек таякча менен ургандагы балыктын кыймыл-аракетине байкоо жүргүз.

30-§**Балыктардын ички түзүлүшү**

Такмак сицирүү системасы. Балыктардын тамак сицирүү органдары ооз көндөйү, кулкун, кызыл өнгөч жана ичегиден турат (60-сүрөт). Көпчүлүк балыктардын жаактарында бир нече катар тиштер жайлашкан. Балык тиштери жардамында олжосун кармайт жана тиштеп турат. Жутулган азық кулкун жана кызыл өнгөч аркылуу карынга түштөт. Сазан жана башка айрым балыктардын карды жакшы өрчүбөгөн. Алар жуткан азық түздөн-түз ичегиге түштөт. Сазан майда омурткасыздар, балырлар, жашыл өсүмдүктөрдүн жаш бутактары менен тамактанат.




60-сүрөт. Балыктардын ички түзүлүшү:

- 1 – бакалоор; 2 – сүзгүч тарсылдагы; 3 – булчундар; 4 – омуртка тутуму; 5 – ооз тешиги; 6 – боор; 7 – өт баштыгы; 8 – карын; 9 – ичеги; 10 – көк боор; 11 – аналдык тешиги; 12 – табарсыты; 13 – бөйрөк; 14 – баш мээ; 15 – жүлүн; 16 – жумурткалыш; 17 – жыныстык тешиги; 18 – сийдик чыгаруу тешиги; 19 – жүрөк.

Азық уйку бези чыгарган зилдин таасиринде сицириле баштайт. Чала синген азық ичегиге келип түштөт. Бул жерде ага уйку близинин зили менен боор иштеп чыгарган өт суюктугу таасир этет. Синген азық ичегинин бети аркылуу канга сорулат.

Дем алуу системасы бакалоорлордон турат. Балыктар сууда эриген кычкылтектен менен дем алат. Оозу аркылуу жутулган сууну бакалоор жылчыктары аркылуу чыгарат. Бакалоорлор бакалоор догосунан турат. Ар бир догонун арт жагында кызгылтым түстүү желбирекчелери, алды жагында бакалоор кыргактары жайлашкан (61-сүрөт). Кыргактар суу менен келген азыктын сыртка чыгы-

шына жол бербейт. Желбирекчелер майда капилляр кан тамырлар менен капиталган. Суудан кычкылтек бакалоор желбиректеринин капиллярларындагы канга сорулат; көмүр кычкыл газы кандан сууга чыгат. Аяздуу кыш күндөрү муздун астына кычкылтектин өтпөстүгү жана ысык жай күндөрү суудагы кычкылтектин азайышы себептүү көптөгөн балыктар өлөт.




61-сүрөт. Балыктын бакалоорлорунун түзүлүшү жана иштеши:

1 – бакалоор кыргактары; 2 – бакалоор догосу; 3 – бакалоор желбирекчелери;
4 – бакалоордун капкагы (суунун бакалоор аркылуу багыты стрелкалар менен көрсөтүлгөн).

Кан айлануу системасы жүрөк, курсак жана артқы аорта, артерия, вена жана капилляр кан тамырларынан турат. Жүрөгү жүрөк карынчасы жана дүлөйдөн турат. Жүрөктөн чыккан кан тамырга артерия, жүрөккө келгенине вена дейиilet. Сазандын жүрөгү бакалоорлордон кийинирээк жайлашкан (62-сүрөт).

Балыктардын жүрөк карынчасы менен дүлөйнүн алмак-салмак жыйрылуусу менен кан дүлөйдөн жүрөк карынчасына, андан *курсак аортасына* чыгарылат. Курсак аортасынан бакалоор артерияларына,



62-сүрөт. Балыктын кан айлануу системасы жана жүрөгүнүн түзүлүшү:

1 – бакалоор капиллярлары; 2 – артқы аортасы; 3 – курсак аортасы; 4 – жүрөгү;
5 – артериялары; 6 – органдарындагы капиллярлар; 7 – жүрөктүн дүлөйү;
8 – жүрөктүн карынчасы; 9 – жүрөктүн венасы.

алардан капиллярларга өтөт. Капиллярлардагы кан көмүр қычылы газын сууга чыгарып, қычкылtek менен байыйт. Мындай канга артерия каны дейиilet жана ал кочкул қызыл болот. Артерия каны бакалоорлордон чыгып, омуртка тутумунун астынан бүткүл денени бойлой өткөн арткы аортага келет. Андан органдарга жакын жерлерде артерияларга, дene органдарында болсо капиллярларга ажырайт. Қычкылtek жана ичегиден сорулган азық заттар капиллярлардын бети аркылуу ткандарга, ал эми көмүр қычылы газы менен зат алмашуунун продуктулары болсо ткандардан канга өтөт. Ткандарда артерия каны көмүр қычылы газы менен каныккандыгы себептүү кочкул қызыл түстүү вена канына айланат жана вена кан тамырларына чогулуп, жүрөктүн дүлөйүнө куюлат.

Бөлүп чыгаруу системасы. Ткандарда пайда болгон зат алмашуунун продуктулары тасма түрүндөгү эки қызғылт-күрөн бөйрөктөрдүн жардамында кандан фильтрленип, сийдикти пайда кылат. Сийдик эки сийдик түтүкчөсү аркылуу табарсыкка, андан аналдык тешиктин арасында жайлышкан атайын тешик аркылуу сыртка чыгарып жиберилет (60-сүрөткө кара).

Зат алмашуу. Зат алмашуу процессинде тышкы чөйрөдөн алынган азық заттардан организм үчүн зарыл болгон заттар алынат. Бул заттар организмдин өсүшү, тукум калтыруу жана бардык жашоо-тиричилик процесстерин камсыз қылууга сарпталат. Балыктар муздак кандуу жаныбарлар болуп саналат. Алардын денесинин температурасы туруктуу болбостон, айлана-чөйрөдөгү температуранын таасиринде өзгөрүп турат.



1. Балыктардын тамак синириүү системасы кандай түзүлгөн?
2. Балыктардын жеген азығы кандай синирилет?
3. Балыктардын бакалоорлору кандай түзүлгөн?
4. Балыктар кандай дем алат?
5. Балыктар кан айлануу системасы органдары кандай түзүлгөн?
6. Кан кандай милдет аткарат?
7. Бөлүп чыгаруу системасы кандай түзүлгөн?
8. Зат алмашуу кандайча жүрөт?



Тамак синириүү органдары менен аларга мүнөздүү болгон белгилерди жуптап жаз.

- | | |
|-------------------|------------------------------------|
| a) күлкүн; | 1) тамак синет жана канга сорулат; |
| б) карын; | 2) өрчүбөйт; |
| в) уйку бези; | 3) үч катар тиштер жайлышкан; |
| г) өт баштыкчасы; | 4) азық калдыгын чыгарып турат; |
| д) ичеги; | 5) өт суюктугун чогултат; |
| е) арткы ичеги. | 6) зил иштеп чыгарат. |

Сөздүк дептерине жазып ал.

Синирыү зили, ёт баштықчасы, бакалоор догоюру, бакалоор кыргактары, бакалоор капиллярлары, бакалоор желбирекчелери, вена, артерия, курсак аортасы, артерия каны, вена каны.



Суроого жооп тап. Эмне себептен жайдын ысык құндөрүндө же кышында муздун астынданғы балыктар қычқылтектин жетишсиздиги натыйжасында өлүп қалат?


Жуп жооптор: а-3, б-2, в-6, г-5, д-1, е-4.

31-§**Нерв системасы жана сезүү органдары**

Борбордук нерв системасы. Балыктардың борбордук нерв система-сы баш мәэден жана жүлүндөн тураға. Жүлүн узун тұтұктөн турған болуп, омуртка тутумунун тұтұғы ичинде жайлашкан. Жүлүндүн қапталдарынан ички органдарга, теріге жана булчундарга нервдер чыгат (63-сүрөт).

Баш мәэ мәэ сөөк кутусунун ичинде жайлашкан болуп, нерв тұтұғы алдыңқы бөлүгүнүн өзгөрүшүнөн пайда болғон. Балық жана башка омурткалыу жаныбарлардың баш мәеси *алдыңқы*, *аралық*, *ортонқу*, *каракүш* жана *сүйрү* мәэ деп аталған бөлүктөрдөн тураға. Алар балыктың жашоо-тиричилигинде чон мааниге әз. Каракүш мәэ балыктың кыймыл-аракетин, сүйрү мәэ дем алуу, кан айлануу, синирыү органдарынын ишин жөнгө салат.

Сезүү органдары балыктарға айлана-чөйрөнү жакшы билүү мүмкүнчүлүгүн берет. Алар жардамында балық өзүнө азық



63-сүрөт. Балыктың нерв системасы жана баш мәесинин түзүлүшү:

- 1 – баш мәэ; 2 – жүлүн; 3 – алдыңқы мәэ; 4 – ортонқу мәэ; 5 – каракүш мәэ; 6 – сүйрү мәэ; 7 – аралық мәэ.

табат же жакындашкан душманын сезет. Суудагы шарттарды аныктоодо да сезүү чон жардам берет. Сезүү органдарынын ичинен көздүн мааниси аябай чон. Балыктын көздөрү кабаксыз болуп, башынын капитал жактарында жайлашкан. Алар жакынкы аралыктан көрөт, нерселердин формасы менен түсүн айырмалай алат. Көздөрүнүн алдында жайлашкан эки мурун таноосу жыт билүү клеткаларына ээ болгон баштыкчаларга ачылат.

Угуу органдары мээ сөөк кутусунун капиталдарында жайлашкан, сөөктөр менен капиталган ички кулактан турат. Суу үндү жакшы ёткөрөт. Тажрыйбалардан балыктар жәэкте жүргөн кишинин кадам басышын, сүзүп келе жаткан кайыктын добушун, конгуроонун жана октун үнүн жакшы уккандыгы аныкталган.

Даам билүү клеткалары балыктын ооз көндөйүндө, кулкунунда жана денесинин бардык беттеринде жайлашкан. Сазандын, тресканын жана башка бир топ балыктардын башында жайлашкан муруттары туюу милдетин аткарат.

Балыктын жашоосунда айныкса *каптал сызыктарынын* мааниси чон. Алар балык денесинин капиталдарында катарлашып жайлашкан тешикчелерден турат. Тешикчелер атايын сезүүчү клеткалары болгон түтүкчөлөр менен туташкан. Каптал сызыктары суунун агымын, суунун астындагы нереслерди сезүүгө жардам берет. Алардын жардамында көзү көрбөй калган балык да тосмолорду сезет, кыймылда болгон табылгасын кармап алат.

Рефлекстер. Эгерде балыкты нерсе менен түртсөк, ал заматта өзүн четке алат. Бул процесс төмөнкүчө жүрөт. Дүүлүгүү сезүүчү клетка талчалары аркылуу борбордук нерв системасынын баш мээ жана жүлүн бөлүгүнө берилет. Ал жерден дүүлүгүүгө алынган жооп тийиштүү органдарга берилет. Органдардагы булчундардын жыйрылуусу менен организм дүүлүгүүгө жооп берет. Балыктар табылгасын сезгенде да куду ушундай кубулуш жүрөт. Сазан сөөлжанды көргөндө дүүлүгүү көрүү нервдери аркылуу борбордук нерв системасына барат, ал жерден жооп заматта эле кыймылга келтирүүчү нерв талчалары аркылуу булчундарга келет. Натыйжада балык табылгасын кармап алат. Дүүлүгүүгө мындайча жооп кайтаруу рефлекстери тубаса болгондуктан, *шартсыз рефлекстер*, б.а. *инстинкт* деп аталат. Шартсыз рефлекстер тукум куугуч келип, балыктардын жашоосунун аягына чейин сакталат жана укумданту-

кумга берилет. Бир түргө кирген бардык жаныбарлардын шартсыз рефлекстери бирдей болот.

Жаныбарлардын жашоосунда пайда болгон рефлекстер да бар. Эгерде аквариумдагы балыктарга кандайдыр сигнал таасири менен, мисалы, лампочканы жандырып коюп, тамак берилсе жана мында-йча тамактандыруу бир нече жолу кайталанса, тамак берилбесе да бул сигнал балыктарды өзүнө тарта баштайт. Мындай рефлекстерге *шарттуу рефлекстер* дейилет. Шарттуу рефлекстер укумдан-тукуумга берилбейт жана узакка сакталбайт.

1. Балыктардын жүлүнүң кандай түзүлгөн?
2. Балыктардын кайсы сезүү органдары өрчүгөн?
3. Каптал сызыктар кандай милдет аткарат?
4. Балыктарда шартсыз рефлекс кандайча пайда болот?
5. Шарттуу рефлекстер кандай пайда болот?



Сезүү органдарын алардын белгилери менен жуптап жаз:

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| a) көздөрү; | 1) сезгир клеткалуу баштыкчалар; |
| б) жыт билүү; | 2) дene капталдарында жайлышкан; |
| в) капитал сызыктары; | 3) кабаксыз, жумулбайт; |
| г) угуу; | 4) баш сөөктөрү менен капиталган; |
| д) даам татуу; | 5) ооз, кулкун, дene бетинде болот; |
| е) туую. | 6) муруттардан турат. |



1. Балыктар капитал сызыктарынын жардамында:

- а) суунун агымын жана үнду билет;
- б) азыктын даамын билет;
- в) суунун агымын, басымын жана тосмону сезет.

2. Балыктардын каракуш мээси:

- а) кыймыл-аракетин жөнгө салат;
- б) тамак синириүү органдарынын ишин жөнгө салат;
- в) дем алуу органдарынын ишин жөнгө салат.

Сөздүк дептерине жазып ал.

Борбордук нерв системасы; баш мээ; жүлүн; каракуш, сүйрү мээ; таноолор, капитал сызыктары, шартсыз, шарттуу рефлекстер.



Суроого жооп тап. Балыктар кантип ылайка сууларда да жолунан адашпай азық табат жана тосмолорду алдын ала байкайт?

Жуп жооптор: а-3, б-1, в-2, г-4, д-5, е-6.

Туура жооптор: 1в, 2а.

32-§


Балыктардын көбөйүшү жана өрчүшү

Көбөйүү органдары. Сазан айрым жыныстуу; ургаачыларынын жыныстык органы дене көндөйүндө жайлашкан ири жумурткалыктан турат. Анда жумуртка клеткалары жетилет. Эркектеринде бир жуп узун уруктуктары болот. Өрчүү мезгилинде уруктуктар коюу ак суюктук — «сүт» менен толот. «Сүттүн» курамында миллиондогон урук клеткалары (сперматозоиддер) болот.

Урук чачуу. Жыныс клеткалары жетиле башташи менен балыктарда көбөйүү инстинкти пайда болот (64-сүрөт). Инстинкт аларды урук чачуу жана тукум калтыруу үчүн ыңгайллуу жер издеөгө үндөйт. Кээ бир балыктар көлмөлөрдүн акпай турган жерлерин, башкалары болсо агын сууларды тандайт. Отмө балыктардын кээ бир түрлөрү тузсуз суулардан деңиздерге, кээ бирлери деңиздерден тузсуз сууларга которулат. Кээ бир отмө балыктар, мисалы, Ыраакы Чыгыштагы лосось сымалдардан болгон кета жана горбуша балыктары икра чачуу үчүн Амур дарыясынан өзөндөрүнө өтөт. Угор балыгы Европа дарыяларынан миндеген километр алыстыкта жайлашкан Атлантика океанынын Саргасс деңизине барып урук чачат. Сазан балыгы көлмөлөрдүн тайыз жерлерине, суу сактагычтарга жана көлдөргө урук

64-сүрөт. Сазандын өрчүшү:

- 1 – уруктары; 2 – жумуртканын ичинде эмбриондун өрчүшү;
- 3 – 4 – 5 – жаш балыктын (чабактын) өрчүшүнүн түрдүү стадиялары;
- 6 – чоңойгон балык.



чачат. Ургаачы балык балырлардын үстүнө икрасын себет. Эркеги болсо уруктардын (икралардын) үстүнө өзүнүн «сүтүн» сээп кетет. Сүттөгү сперматозоиддер урук клеткаларын уруктандырат.

Өрчүшү. Сазандын уруктанган урук клеткаларынан ынгайлуу шарттарда 4–6 күндүн ичинде абдан майда балыкчалар (чабактар) өрчүп чыгат. Чабактар адегенде суудагы майда микроорганизмдер менен тамактанышат, кийинчөрөк майда омурткасыз жаныбарлар менен тамактанганга өтүшөт. Жылдын аягына келип алардын узундугу 5–10 см ге жетет.

Тукумуна кам көрүү. Сазан үчүн тукумуна кам көрүү урук чачуу үчүн жер тандоодон гана турат. Урук чаккандан кийин балык бул жерди таштап кетет. Тукуму жөнүндө кам көрбөгөн балыктар адатта абдан көп урук чачат. Мисалы, *окунь* 300 минге чейин, *треска* болсо бир нече миллиондогон урук чачат. Алардын тукумунун аз гана бөлүгү чоңойгонго чейин жашай алат. Анткени уруктарынын жана личинкаларынын абдан көп бөлүгү башка жаныбарларга жем болот.

Кээ бир балыктарда тукумуна кам көрүү инстинкти күчтүү өрчүгөн. Тузсуз сууларда кездешүүчү *тикен канат* балыгынын эркеги өрчүү учурунда балырларды шилекей бездери иштеп чыккан суюктук менен чаптап, ургаачылары үчүн ынгайлуу болгон уя жасайт. Бул уяга бир нече ургаачы балыктар уруктарын чачышат. Эркек балыктар уядагы уруктарды уруктандырат жана икралардан чыккан балыктарды өз алдынча тамактана алышканга дейре кайтарышат



А



Б

65-сүрөт. Балыктардын тукумуна кам корушү:

А – эркек тикен канат балык уясындагы уруктарын кайтарууда; Б – эркек дениз тайы ургаачысы чачкан уруктарды курсагындагы баштыкчада алыш жүрөт.

(65-сүрөт). Деңиз тайынын эркектери икраларын курсагындагы атаянын баштықчаларында алып жүрүшөт. Африка тиляпия балыгынын ургаачылары чачкан икраларды ооз көндөйлөрүндө алып жүрүшөт. Кандайдыр коркунуч туулуп калса, чабактары да эркек балыктардын оозуна кире качышат.



1. Балыктардын жыныстык клеткалары каерде жетилет?
2. Балыктардын көбөйүү инстинкти кандайча билинет?
3. Балыктардын уругу кандай уруктанат?
4. Өтмө балыктарда көбөйүү инстинкти кандайча көрүнөт?
5. Туумага өтө кам көрүү кандайча көрүнөт?
6. Туумага аз кам көрүү эмнеден турат?



1. Туумуна өтө кам көргөн балыктар:
 - a) көп урук чачат;
 - b) аз урук чачат, икраларын алып жүрөт;
 - c) көп урук чачат, денизден дарыяга өтөт.
2. Балыктардын «сүтү»:
 - a) жумуртка клеткалары менен толгон суюктук;
 - b) урук клеткалары менен толгон суюктук;
 - c) уруктанган урук клеткалары.



- Балыктардын аты менен алардын туумуна кам көрүү инстинктин жуптап жаз.
- | | |
|-----------------------|---|
| a) тиляпия; | 1) эркек балыктар уя жасайт; |
| б) тикен канат балык; | 2) уруктарын алып жүрөт; |
| в) дениз тайы. | 3) эркеги уруктарын, чабактарын оозунда алып жүрөт. |

Туура жооптор: 1в, 2б.

Жуптук жооптор: а-2, б-1. в-3.

33-§

Балыктардын көп түрдүүлүгү: кемирчектүү балыктар классы

Балыктардын жашаган чөйрөсүнө ылайыкташуусу. Түрдүү суу бассейндеринде жашоо шарттары да түрдүүчө болот. Ал тургай бир эле бассейндин түрдүү бөлүктөрүндө да шарт бирдей боло бербейт. Жашоо шарттары жана азыктардын көп түрдүүлүгү, өз ара кара-ма-каршылыктар, душмандардын көп болушу балыктардын түзүлүшү менен жүрүм-турумуунун түрдүүчө болушуна алып келген. Ошондуктан


дениз түбүндө жашаган балыктар жай аракеттенишет, денелери жалпак болгондуктан, жырткыч жаныбарлар аларды сезбейт. Кулпуруп турган бермет рифтеринин арасында жашаган балыктардын түсү да ар түрдүү жана кооз. Дениз жана океандардын теренінде жашаган балыктардын атайын жарық чыгаруучу органдары болот. Суунун үстү жағында, айрыкча, ачык дениздерде жашаган балыктардын булчундары жана сүзгүчтөрү, өзгөчө күйрук сүзгүчтөрү күчтүү өрчүгөндүктөн, алар тез сүзөт. Тулкусунун сүйрү формасы сүзүүнү женилдетет.

Скелетинин түзүлүш өзгөчөлүктөрүнө карай балыктар кемирчектүү жана сөөктүү балыктар классына бөлүнөт.

Кемирчектүү балыктар классы. Скелет кемирчектен турат, алардын бакалоор капкакчалары менен сүзгүч тарсылдактары болбойт. Бакалоордун жылчыктары 5–7 жуп болот. Кемирчектүү балыктар акулалар жана скаттар түркүмүн өз ичине алат.

Акулалар түркүмү. Акулалар кыйла ири, денеси торпедо сымал, күйрук сүзгүчү өтө күчтүү өрчүгөн (66-сүрөт). Терисинdegи кабырчыктары чыныгы сөөктүү балыктардыкынан таптакыр айырмаланат. Кабырчыктары калың пластинкачалардан түзүлгөн болуп, ар биригин үстүндө сыртынан эмаль менен капталган тишке окшош өсүндүлөрү бар. Акуланын жаагында мындай өсүндүлөр тиштерге айланат. Бардык омурткалуу жаныбарлардын, ошонун катарында, адамдардын тиштери да акуланыкына окшош түзүлгөн. Акула өтө кыймылдуу жырткыч балык болуп, чоң жаныбарларга, ошонун катарында, киринген адамдарга кол салат. Көпчүлүк акуулар тириү тууйт, кәэ бир түрлөрүү урук чачып көбөйт.

Акулардын чондугу ар түрдүү болгон 250 түрү белгилүү. Алардын арасынан узундугу 40–45 см болгон *тикендүү акула* эң кичинеси, узундугу 15 м келган *гигант акула* же 18 м ге жеткен *кит*



66-сүрөт.
Кемирчектүү
балыктар:

1 – акула; 2 – дениз түлкүсү – скат ба-лыгы; 3 – тикен күйрук скат.

акуласы эң чоңу болуп эсептелет. Бирок мындаи алп акулалардын тиштери абдан майда болуп, алар кичинекей рак сымалдар жана балыктар менен тамактанышат.

Скаттар түркүмү. Скаттардын денеси жалпак, ромб же диск сымал болуп, суунун түбүндө жашоого ылайыкташкан. Күйрүк сүзгүчү ичке камчыга айланган. Жалпак денеси менен туташып кеткен көкүрөк сүзгүч канаттарын толкун сымал терметип, жай сүзүшөт. Кээ биригинин атайын коргонуу органы, мисалы, күйругунун түбүндө уулуу былжырлуу зат менен капитланган тикени болот. Тропик дениздерде кездешүүчү электр скаттарда чыңалуусу 70 Вт электр тогун пайда кылуучу органы да болот. Скаттар уулуу тикенинин же электр зарядынын жардамында табылгасын жабыркатат же душманын качууга аргасыз кылат.

Скаттар башка көпчүлүк кемирчектүү балыктар сыйктуу тириү тууйт. Ал өтө тукумчул болбостон, бир ургаачы скат 1–3 төн 20–30 га чейин тукум берет. Көпчүлүк скаттар дениздин түбүндөгү моллюскалар менен тамактанышат. Эң чоң, алп *манта* гана суунун ичиндеги майда рак сымалдар жана чабактар менен тамактанат. Скаттардын 350 гө жакын түрү бар. Кээ бир түрлөрүнө витаминдуү майы үчүн аң ууланат.



1. Балыктар жашоо шарттарына кандай ылайыкташкан?
2. Кемирчектүү балыктар кандай түзүлгөн?
3. Акулалар кандай түзүлгөн?
4. Акулалардын терисинdegи кабырчыктары кандай түзүлгөн?
5. Скаттар суунун түбүндө жашоого кандай ылайыкташкан?
6. Скаттар кандай коргонуу чараларына ээ?



- | | |
|---|---|
| 1. Кемирчектүүлөр түзүлүшү:
а) күйрүк сүзгүчү өрчүгөн;
б) скелети кемирчектүү;
в) жылчыктары 5–7 жуп;
г) жылчыктары 1–3 жуп;
д) капкакчалары жазы;
е) капкакчалары болбойт. | 2. Акулалардын түзүлүшү:
а) денеси ромб сымал, диск сымал жалпак;
б) денеси сүйрү формада;
в) кабырчыктары пластинка;
г) сүзгүчтөрү жипке оқшош;
д) тиштеринде эмаль бар;
е) сүзгүчү денесине туташкан. |
|---|---|



- | | |
|--|--|
| Балыктардын жашоо чөйрөсүн жана белгилерин жуптап жаз.
а) терен сууда;
б) суунун түбүндө;
в) суунун бетинде;
г) коралл рифтеринде. | 1) денеси сүйрү формада;
2) жарык таратуучу органы бар;
3) денесинин түсү көп түрдүү;
4) денеси жалпак. |
|--|--|

Сөздүк дептерине жазып ал.

Кемирчектүү, сөөктүү балыктар; акула, тикендүү акула, гигант акула, кит акуласы, скат, дениз түлкүсү, манта, электр скат.

Суроого жооп тап. Эмне себептен коралл рифтеринин арасында жашаган балыктар түркүн-түмөн жана кооз түстөрдө болот?


Туура жооптор: 1б, в, е; 2б, в, д.

Жуптук жооптор: а-2, б-4, в-1, г-3.

34-§ Сөөктүү балыктар классы: негизги системалык топтору жана мааниси

Осетр, же кемирчек сөөктүү балыктар түркүмү. Бул түркүмгө таандык балыктардын ичке жана узун денесин бойлой арка, каптал жана курсак жактарында 5 катар ромб формасындагы сөөктүү пластинкачалар жайлашкан (67-сүрөт). Башынын алды жагы узун түмшукту түзөт. Ооз тешиги башынын төмөнкү жагында. Скелети негизинен кемирчектен турат, бирок башынын кутусу сөөк менен капталган. Өзөк скелети хордадан турган болуп, жашоосунун аягына чейин сакталып калат.

Орто Азия сууларында кемирчек-сөөктүү балыктардан *осетр* жана *жалган күрөк тумшук* балыгы кездешет. Сырдария жана



67-сүрөт. Осетр сымал балыктар:


1 – осетр; 2 – белуга; 3 – стерлядь; 4 – Амудария чоң қыл куйругу (жалган күрөк тумшук).

Амударыянын төмөнкү жана ортоңку агымындагы осетр балыгынын узундугу 2 м ге, салмагы 30 кг га барат. Амударыянын этегинде жана ортоңку агымында жалган күрөк түмшук балыгы таралган. Анын узундугу 75 см ге, салмагы 2 кг га барат, чабактар, курт-кумурскалардын гусеницалары менен азыктанат. Ал сейрек кездешүүчү түр иретинде коргоого алынган.

Лосось сымалдар түркүмү. Лосось сымалдарга өзөк скелеттүү жана баш кутусу чала сөөккө айланган балыктар кирет. Арка сүзгүчүнүн артында дагы бир сүзгүчү болот. Көпчүлүк түрлөрү көбөйүү мезгилинде дениздерден тузсуз сууларга каторулат. Дениздерде жашаган лосось, кета, бүкүр балык да ушул түркүмгө кирет. Сырдария жана Амударыяда *гүл май*, б. а. *форель* таралган.

Карп сымалдар түркүмү. Дене скелети сөөктөн турат. Бул түркүмдүн өкүлдөрү бардык суу бассейндеринде кенири таралган болуп, бир нече жүздөгөн түрлөрдү өз ичине камтыйт. Биз таанышкан сазан да ушул түркүмгө кирет. Арал денизи, Зерафшан, Амудария жана Сырдария бассейндеринин дарыя жана көлдөрүндө кездешүүчү *мурутчан балык*, too дарыяларында жана өзөндөрүндө таралган *кара балык*, Арал денизинин жәэктерине жакын жерлерде, Сырдария, Амудария жана Зерафшандын төмөнкү агымдарында жашаган *май балык* жана *ак балык*; ошондой эле Арал денизинде жана ага күйгөн дарыяларда кездешүүчү сомдор да ушул түркүмгө кирет. Орто Азиянын сууларында Ыраакы Чыгыш дарыяларынан *ак амур* жана *лец* балыгы алып келинип климатташтырылган (68-сүрөт).

Манжа канат балыктар түркүмү. Манжа канат балыктар скелети менен сүзгүчтөрүнүн түзүлүшү кургакта жашаган омурткалуулардын буттарына окшойт. Түркүмдүн жалгыз өкүлү – латимерия Инди океанынын Африка жәэктерине жакын жеринен табылган.



Аны үйрөнүү кургакта жашаган омурткалуу жаныбарлардын келип чыгышын түшүндүрүүдө чоң мааниге ээ болот.

Балыктардын мааниси. Балыктын эти менен икрасы өтө даамдуу тамак. Айныкса осетр жана лосось сымалдардын эти жоругу бааланат. Дүйнө боюнча ар жылы 150 млн тоннага жакын балык ууланат. Негизги бөлүгү дениздерден кармалат. Ал үчүн атайын кеме – траулерден пайдаланылат. Балык чарбасынын таштандыла-рынан мал чарбасы үчүн балыктын уну, айыл чарбасы үчүн жер семирткичтер өндүрүлөт. Балыктын майы фармацевтикада витамин-дүү дары-дармек иретинде колдонулат. Өзбекстанда балык ички суулардан кармалат. Сазан, ак амур, ак балык, лещ, жылан баш негизги аң уулануучу балыктар саналат.

Табигый шарттарда балыктын икрасы жана чабактары көптөгөн санда кырылат. Ошондуктан балыктар атайын заводдордо өрчүтүлүп, андан кийин табигый суу бассейндерине коюп жиберилет. Балыктарды башка суу бассейндерине которуштурууга болот. Ыраакы Чыгыш дарыяларынан республикасыздагы сууларга ак амур, лещ, жылан баш сыйктуу балыктар алыш келип, климатташтырылган.

Балыктардын келип чыгышы. Алардын байыркы теги ланцетникке окшош жөнөкөй түзүлгөн хордалуулар болгон. Тарыхый өнүгүү процессинде алгачкы хордалуулардан жуп сүзгүч канат жаныбарлар пайда болот. Алар жырткыч болгон. Олжо издең активдүү жашо-онун натыйжасында нерв системасы жана сезүү органдары өрчүп отуруп, алардан балыктар пайда болгон.

1. Кемирчек-сөөктүү балыктар кандай түзүлгөн?
2. Орто Азия сууларында кайсы кемирчектүү балык таралган?
3. Лосось сымалдар кандай түзүлгөн?
4. Манжа канат балыктар кандай түзүлгөн?
5. Кайсы балыктарга аң ууланат?
6. Жасалма өрчүтүү, климатташтыруу кандай ишке ашырылат?



- | | |
|---|---|
| 1. Сөөктүү балыктын скелети:
а) сөөктөн турат;
б) сөөк, хордадан турат;
в) сөөк, кемирчек-сөөктөн. | 2. Кемирчек сөөктүү балыкта:
а) 5 катар сөөк кабырчыгы;
б) 2 катар кемирчек кабырчыгы;
в) кемирчектүү кабырчыгы бар. |
|---|---|



- | | |
|--|---|
| Балыктардын түрлөрүн таралган жерлери менен жуптап жаз.
а) мурутчан балык;
б) май балык;
в) кара балык; | 1) Сырдария, Амудария төмөнкү агымы;
2) Инди океанынын Африка жээктери;
3) тоо дарыялары; |
|--|---|



- г) форель;
д) жалган күрөк түмшук;
е) латимерия.
- 4) дарыя бассейндери, көлдер;
5) Сырдарья, Амударья;
6) Сырдарья, Амударянын ортонку, төмөнкү ағымдары.

Сөздүк дептериңе жазып ал.

Осетрлер, кемирчек-сөөктүү балыктар, жалган күрөк түмшук, лосось сымалдар, кета, форель, карп сымалдар, кара балык, ак балык, ак амур, лещ, сом, латимерия.

Туура жооптор: 1в, 2а.

Жуптук жооптор: а-5, б-1, в-3, г-5, д-6, е-1.

8.2. ЖЕРДЕ-СУУДА ЖАШООЧУЛАР КЛАССЫ

Жерде-сууда жашоочулар биринчи болуп кургактыкта жашоого өткөн жаныбарлар. Түзүлүшү суулуу жана кургак чөйрөгө ылайык-ташкан. Төрт буту менен аракеттенет, өткө жана тери аркылуу дем алат. Жүрөгү уч камералуу. Жумурткасын сууга тууйт, личинкасы сууда өрчүйт.

Алар менен суу бакасы мисалында таанышабыз.

35-§


Суу бакасынын тышкы түзүлүшү, скелети

Жашоо чөйрөсү жана жашоо-тиричилиги. Суу бакасы жер бетинде кенири таралган, суук түндүк чөлкөмдөрдө, бийик тоолуу аймактарда гана кездешпейт. Жылдын жылуу мезгилинде аны нымдуу жер, суу бассейндери жана ага жакын жерлерден кездештирүүгө болот. Жашоосунун көп бөлүгүн кургакта өткөрсө да, эч качан суудан алыстабайт. Арык түбүндөгү баткакка көмүлүп, же суу астындагы өсүмдүктөр арасында, же дарак тамырларына жакын көндөйлөрүнө кирип алып, кышкы уйкуга кетет.

Суу бакасы күндүз жээкке жакын жерлерде аңчылык кылат. Ал конуз, чиркей, чымын, жөргөмүш сыйктуу майда омурткасыз жаныбарлар менен тамактанат. Ууга чыккан бака кыймылсыз ол-

туруп, олжосун аңдыйт. Бакалар кыймылдаган табылгасын гана сезишет. Табылгасын көргөн бака оозунан узун жабышкак тилин чыгарат жана аны тили менен тартып алат.

Тышкы түзүлүшү. Баканын денеси жалпак, чоң жазы башы тулку боюна чек арасыз кошулуп кеткендиктен, мойну билинбейт. Башы тулку боюна кыймылдуу ашташып кошуулгандыгы менен балыктардан айырмаланат (69-сүрөт). Мойну кыска болсо да бака башын ар тарарапка бурат жана ие алат. Башынын капиталдарына бөртүп чыккан көздөрүн үстүнөн жана астынан кыймылдуу кабактары коргоп турат. Кабактары көздөрүн нымдалап, кургап калуудан сактайт. Көзүнүн алдында бир жуп таноосу көрүнүп турат. Алар жыт билүү жана аба өткөрүү милдетин аткаралат. Мурун көндөйү ооз көндөйү менен туташкан. Бака жана башка жерде-сууда жашоочулар атмосфера абасы менен дем алат. Аба таноолор аркылуу өпкөгө өтөт. Таноолору жана көздөрү башынын үстү жагында. Көздөрү менен таноолорун



69-сүрөт. Баканын сырткы түзүлүшү:

- 1 – таноосу; 2 – кабагы; 3 – көзү; 4 – тарсылдак жарығы; 5 – алдыңкы буту;
- 6 – күн жилиги; 7 – кар жилиги; 8 – алаканы менен манжалары; 9 – арткы буту;
- 10 – таманы жана манжалары; 11 – балтыры; 12 – саны.

гана суудан чыгарып, абадан дем алат жана айланча-чөйрөгө байкоо жүргүзөт. Бака суунун астына чумкуганда клапандары таноолорун тосот жана дем алуу жолдоруна суу кирбейт.

Көзүнүн арт жагындағы тарсылдак жаргакчасы угуу органы саналат. Эркек бакалардын башынын капитал жактарында үндү күчтөтүүчү боз баштыкча – резонаторлору болот. Бакалар өрчүү маалында резонаторлорунан пайдаланып, чардашат.


Баканын жана бардык кургакта жашаган хордалуу жаныбарлардын эки жуп жөрмөлөөчү буттары өрчүгөн. Алдыңкы буттары омуроо, каруу жана манжа; арткы буттары сан, балтыр жана таман бөлүктөрүнө бөлүнөт. Алдыңкы буттары төрт бармакчалуу болуп,

бешинчи бармакчасы өрчүбөгөн. Арткы буттарындагы беш бармакчасынын арасында бекем тартылган сұзгұч жаргакчалары бар. Арткы буттары алдыңқы буттарына караганда узун жана күчтүү. Кургакта бака арткы буттары менен секириет, сууда арткы буттарын алмак-салмак бүгүп, кайра түздөө менен сүзөт.

Терисинде былжырлуу суюктук иштеп чыгаруучу бездери болот. Суюктук терисин нымдап, кургап калуудан сактайт.

Скелети жана булчундары. Скелетинин негизги бөлүктөрү сандыкына окшош сөөктөрдөн турат (70-сүрөт). Кургакта жашоочоғо ылайыкташканы, буттарынын пайда болушу себептүү скелет түзүлүшүндө бир топ өзүнө мүнөздүү өзгөчөлүктөр пайда болгон. Алсак, омуртка тутуму моюн омурткасы аркылуу баш сөөгү менен кыймылдуу ашташып кошулган. Кабыргалары өрчүбөгөндүктөн, көкүрөк клеткасы да болбайт. Куйрук омурткалары биригип, бир узун куйрук сөөгүн түзөт.

Алдыңкы жана арткы буттарынын скелети *курчоо скелети* аркылуу омуртка тутуму менен туташкан. Алдыңкы буттарынын скелети бир омуроо, эки каруу жана бир нече манжа сөөктөрүнөн турат. Алар омуроо курчоосу: экиден акырек, омуроо жана далы сөөктөрү аркылуу омуртка тутумуна биригет. Курчоо сөөктөрүнүн экинчи учу төш



сөөгүнө туташкан. Арткы буттары сан, балтыры, таман жана манжа сөөктөрүнөн турат. Арткы буттардын курчоосун өз ара кыймылсыз бириккен жамбаш сөөктөру түзөт. Алдыңкы жана арткы буттарынын бардык сөөктөрү бири-бири менен муундары аркылуу кыймылдуу

бириккен; булчундары балыктардықына караганда күчтүү өрчүгөн. Алардын кыймылы балыктардықына караганда татаал келет.

1. Тышкы түзүлүштүн кургакка ылайыкташыши эмнеден турат?
2. Баканын сууда жашоого ылайыкташуу белгилери кайсылар?
3. Баканын омуртка тутуму кандай түзүлгөн?
4. Баканын алдыңкы буттары кандай сөөктөрдөн турат?
5. Баканын арткы буттары кандай сөөктөрдөн турат??



1. Баканын башы денесине:
 - а) кыймылдуу, 2 омуртка аркылуу бириккен;
 - б) кыймылсыз бириккен;
 - в) кыймылдуу, бир омуртка аркылуу бириккен.
2. Баканын алдыңкы буттарынын скелети:
 - а) ийин, каруу, манжа сөөктөрүнөн турат;
 - б) ийин, балтыр, манжа сөөктөрүнөн турат;
 - в) ийин курчоосу, омуроо, бармак сөөктөрүнөн турат.
3. Баканын арткы буттарынын скелети:
 - а) сан, каруу, манжа сөөктөрүнөн турат;
 - б) сан, балтыр, таман, манжа сөөктөрүнөн турат;
 - в) сан, жамбаш, балтыр, манжа сөөктөрүнөн турат.



Сөздүк дептерине жазып ал.

Суу бакасы, кабактар, резонаторлор, ийин курчоосу, төш, жамбаш, куйрук сөөгү, көкүрөк, ақырек, далы.



Суроого жооп тап. Эмне себептен баканын мурун таноосу ооз көндөйү менен тулашкан? Ал эми балыктардын мурун таноосу ооз көндөйү менен тулашпаган?

Табышмактарда кайсы жаныбарлар сүрөттөлгөн?


- | | |
|-------------------------------------|---|
| 36. Башында жаргакчасы шишип чыгат, | 37. Күндүз күнү жашынат,
Артынан курулдаган үнү чыгат. |
|-------------------------------------|---|

Туура жооптор: 1в, 2а, 3б.

36-§


Баканын ички түзүлүшү

Тамак сицирүү системасы. Баканын тамак сицирүү органдары балыктардықына абдан окшош болуп, ооз көндөйү, кулкун, кызыл өңгөч, карын жана ичегиден турат (71-сүрөт). Ооз көндөйүндө кыймылдуу тили жана жаактары бар. Жогорку жаагында жана таңдайында конус сымал тишчелери болот. Бакалардын арткы ичегиси кенейип, клоаканы түзөт.



Дем алуу системасы. Бака өпкө жана теринин жардамында атмосфералык абадан дем алат. Өпкөсү жөнөкөй түзүлгөн бир жуп баштыкчадан турат. Баштыкчанын бетинде жана териде аябай көп капиллялар бар. Андагы канга атмосфералык абадан кычкылтек өтүп турат. Дем алыш жаткан баканын колкосу ылдай түшүп жана көтөрүлүп турат. Колкосу ылдай түшкөндө аба таноолору жана ооз көндөйү аркылуу өпкөгө өтөт. Колкосу көтөрүлгөндө өпкөдөгү көмүр кычкыл газына каныккан аба дагы ооз көндөйү жана таноолору аркылуу сыртка чыгып кетет.

Кан айлануу системасы жүрөк, артерия, вена жана капилляр кан тамырларынан турат (72-сүрөт). Жүрөк бир карынча жана эки дүлөйдөн турат. Карынча менен дүлөйлөрдүн алмак-салмак жыйрылышы натыйжасында кан тамырларды бойлой кыймылга келет. Кан айлануу системасы чоң жана кичине кан айлануу тегерегинен турат. Кан айлануунун чоң тегерегинде кан жүрөк карынчасынан артериялар аркылуу дененин бардык органдарына барат. Кан тканадарга кычкылтехи берип, көмүр кычкыл газы менен каныккан түрдө жүрөктүн он дүлөйнө кайтып келет (72-сүрөт). Кан айлануунун кичине тегерегинде кан жүрөк карынчасынан өпкөнүн артериялары



аркылуу өпкөгө жана териге келет. Өпкө жана теридеги капиллярлардан кан көмүр кычыл газын абага берет, кычылтек менен каныгып, жүрөктүн сол дүлөйүнө куюлат. Ошентип, жүрөктүн сол дүлөйүндө кычылтекке бай артериялык кан, он дүлөйүндө көмүр кычыл газы менен каныккан веналык кан болот. Эки дүлөйдүн бирдей жыйрылышы натыйжасында артериялык жана веналык кандар бир мезгилде жүрөк карынчасына түшүп, толук эмес аралашат.

Бөлүп чыгаруу системасы балыктардыкына окшоп эки узун тасма сымал бөйрөктөн турат. Бөйрөктөр курсак көндөйүндө, омуртка тутумунун капиталдарында жайлашкан. Ар бир бөйрөктөн бирден ичке түтүкчө – сийдик жолу чыгып, клоака көндөйүнө ачылат. Сийдик клоака аркылуу тышкы чөйрөгө чыгып кетет.


Зат алмашуу. Бака – балык сяяктуу муздак кандуу жаныбар. Анын организминде зат алмашуу жай жүргөндүктөн, дene температурасы сырткы чөйрө температурасынан көз каранды, б. а. аба ысык болгондо температурасы жогорулап, суук болгондо төмөндөйт. Суук түшкөндө бакалар начар аракеттенишет. Кышында кандайдыр бир далдаа жер таап, чээнге кирип кетишет.

Нерв системасы. Баканын баш мээси балыктардыкына караганда жакшыраак өрчүгөн, анда эки дөмпөктөн турган жарым шарлар пайда болот (73-сүрөт). Бака балыктарга караганда жай аракеттениши, денеси жабышыңкы келгендиги себептүү анын кыймылын жана денесинин тен салмактуулугун башкарып турган каракуш мээси начар өрчүгөн.

Сезүү органдарынын түзүлүшү кургак чөйрөгө ылайыкташкан. Эки кабагы көздөрүн коргоп, нымдалап турат. Угуу органдары ички жана ортонку бөлүктөрдөн турат. Ортонку кулагы көздүн арт жағында жайлашкан тарсылдак жаргакчасынан башталат. Үн толкундары тарсылдак жаргакчаны термелткенде термелтүү толкуун ортонку

73-сүрөт. Баканын нерв системасы:

- 1 – баш мээси;
- 2 – жүлүнү;
- 3 – нервдер;
- 4 – алдыңкы мээси;
- 5 – аралык мээси;
- 6 – ортонку мээси;
- 7 – каракуш мээси;
- 8 – сүйрү мээси.



кулак түтүгүнүн ичинде жайлашкан угуу сөөкчөлөрү аркылуу ички кулакка берилет.



1. Баканын тамак сиңирүү органы кандай түзүлгөн?
2. Бака кандай дем алат?
3. Баканын дем алуу системасы кандай түзүлгөн?
4. Баканын кан айлануу системасы кандай түзүлгөн?
5. Бөлүп чыгаруу системасы балыктыкынан кандай айырмаланат?
6. Баш мээнин түзүлүшү балыктыкынан кандай айырмаланат?



1. Баканын жүрөгү:
 - а) сол жана он дүлөйдөн, карынчадан турат;
 - б) сол жана он дүлөйдөн, он карынчадан турат;
 - в) сол жана он карынчадан, дүлөйдөн турат.
2. Баканын бөлүп чыгаруу органдарына:
 - а) бир тасма сымал бөйрөк, сийдик жолу кирет;
 - б) бир тасма сымал бөйрөк жана табарсык кирет;
 - в) бир жуп тасма сымал бөйрөк жана табарсык кирет.

Сөздүк дептериңе жазып ал.

Клоака, кан айлануунун чоң жана кичине тегеректери, көмүр кычкыл газы, мээ жарым шарлары, тарсылдак жаргакча.



Суроого жооп тап. Бака көлмөлөрдүн жакасында активдүү күн көрөт. Ал эми курбака болсо суудан алысъраак жашап, түнкүсүн активдүү болот. Курбака менен баканын жашоосундагы мындай айырма алардын түзүлүшүндөгү кандай өзгөчөлүктөр менен байланышкан?

Туура жооптор: 1а, 2а.


37-§

Жерде-сууда жашоочулардын көбөйүшү, өрчүшү жана көп түрдүүлүгү

Баканын урук чачышы. Жаз келип, күндөр ысый башташи менен бакаларга жан кирип, сууга жакын жерлерден тамак издей баштайт. Өрчүү мезгили жакындашкан сайын эркек бакалар үндөрүн катуу чыгарып, чардайт. Ургаачы бакалар сууга чачкан уруктарынын үстүнө эркек бакалар урук суюктуктарын төгүшөт. Бир бака 5000–10000 ге чейин урук чачышы мүмкүн. Уруктан-ган икраннын кабыкчасы көөп, килкилдек туңук катмарга айланат. Жумуртканын үстүнкү бөлүгү каралжын түстө болгондуктан, күн

нурунун таасиринде жакшы ысыйт. Бакалардын уруктары суунун бетинде топ-топ болуп, калкып жүрөт.

Өрчүшү. Уруктанган икрадан личинка (көнөк баш) өрчүп чыгат (74-сүрөт). Көнөк баштын көрүнүшү чабактарга окшоп кетет. Анын узун жана жазы қуйругу, капталдарында жайлышкан эки даана тышкы бакалоорлору болот. Өрчүгөн сайын тышкы бакалоорлор кулкундун бетинде жайлышкан ички бакалоорлор менен оошот. Көнөк баштын жүрөгү эки камералуу, кан айлануу системасы да бир тегеректен турат. Денесинин капталдарында капитал сыйыктары болот.



74-сүрөт. Баканын өрчүшү:

- 1 – уруктары; 2 – 3 – 4 – 5 – өрчүүнүн түрдүү доорлорундагы көнөк баш;
6 – 7 – 8 – көнөк баштын бакага айланышы.

Жумурткадан чыккан көнөк баш икрадан калган азык зат эсебинен жашайт. Кийинчөрээк майда балыр, бир клеткалуу жаныбар жана балырларга жабышкан түрдүү микроорганизмдер менен тамактанат. Адегенде анын арткы буттары, андан кийин алдыңкы буттары пайда болот; бакалоорлору өпкө менен оошот. Кан айлануу системасынын органдары да кайра куралат. Жаш бака суунун бетине чыгып, атмосферанын абасы менен дем ала баштайт. Куйругунун акырындык менен жоголушу натыйжасында көнөк баш жаш бакага айланып, кургактыкка чыгат. Алар үч жылдан кийин чоноёт жана өрчүй баштайт.

Көп түрдүүлүгү. Жерде-сууда жашоочуларга 4 000 ден ашуун түр кирет. Алар куйруксуздар (бакалар, курбакалар) жана куйруктуулар

(тритондор, саламандралар) түркүмдөрүнө бөлүнөт. Күйруктуулар Борбордук Азияда кездешпейт. Алардын эн ириси Тұштүк-Чыгыш Азияда таралған гигант саламандранын узундугу 1,7 метрге жетет. Өзбекстандын аймагында күйруксуздардан суу бакасы менен жашыл курбака кенири таралған.

Жашыл курбака бақага караганда кыйла ири, түсү ач жашыд же боз, терисинде сасык ағыш уулу суюктук иштеп чыгарчу бездери болот. Ал күндүзү кемириүүчүлөрдүн ининде, дарак тамырлары жана дөңгөктөрдүн астында, жер төлөлөрдө жашынып жатат. Тұнкүсүн гана ууга чыгат. Анын арткы буттары салыштырмалуу күчсүз болгондуктан, жөрмөлөп же кыска-кыска секирип жүрөт. Териси орой, өпкөсү салыштырмалуу жакши өрчүгөн. Ал тұнкүсүн курулдап сайрайт. Курбака көбөйүү учурунда гана сууга түшөт. Ал көлмө суулар жана бассейндерге шурудай тизилген жумурткаларын тууйт.

Мааниси. Жерде-сууда жашоочулар – пайдалуу жаныбарлар. Курбака өсүмдүктөргө зиян жеткирген курт-кумурскаларды кырып, чоң пайда келтиреет. Ал түндө 100 гө, 9 айдын ичинде үч мингे чейин курт-кумурска жейт. Зыянкеч курт-кумурскалар (чымындар) дын суудагы личинкаларын, суу боюндагы курт-кумурскаларды кырып, чоң пайда берет. Өздөрү да түрдүү жаныбарлар үчүн азық болот. Бакадан медицина жана биологияда лабораториялык жаныбар иретинде пайдаланылат.

Келип чыгышы. Алгачкы жерде-сууда жашоочулар мындан 300 млн жыл мурда түzsуз сууда жашаган манжа канат балыктардан пайда болгон. Байыркы манжа канат балык сүзгүчтөрүнүн скелети жерде-сууда жашоочулар буттарынын скелетине окшойт. Байыркы манжа канаттар өпкөсү менен дем алган. Алар түzsуз суулуу тайыз дарыя жана көлдөрдө жашаган. Суу кургаганда булчундуу сүзгүчтөрү жардамында бир жерден башка жерге жөрмөлөп өткөн. Өпкөлүү манжа канаттардан байыркы жерде-сууда жашоочу күйруктуулар, алардан күйруксуздар келип чыккан.



1. Жерде-сууда жашоочулардын икралары кандай уруктанат?
2. Жерде-сууда жашоочулар кандай өрчүйт?
3. Жерде-сууда жашоочулардын көбөйүшүнүн жана өрчүшүнүн кайсы өзгөчөлүктөрү балыктардыкына окшойт?
4. Жерде-сууда жашоочулар кандай түркүмдөргө бөлүнөт?
5. Жерде-сууда жашоочулар кандай мааниге ээ?
6. Жерде-сууда жашоочулар кандай келип чыккан?



1. Бака уруктарын:
 - а) суунун түбүнө чачат;
 - б) балырларга жабыштырып чачат;
 - в) суунун бетине топ-топ кылып чачат.
2. Алгачкы жерде-сууда жашоочулар:
 - а) денизде жашаган балыктардан келип чыккан;
 - б) тузсуз сууда жашаган манжа канаттардан келип чыккан;
 - в) денизден тузсуз сууга жашоого өткөн.

Сөздүк дептерине жазып ал.

Көнөк баш, ички бакалоорлор, жашыл курбака, күйруксуздар, күйруктуулар, тритон, саламандра, өпкөлүү манжа канаттар.

Туура жооптор: 1в, 2б.

8.3. СОЙЛОП ЖУРҮҮЧҮЛӨР КЛАССЫ


Сойлон жүргүүчүлөр – биринчилик кургакта жашоочу жаныбарлар. Териси кургак, дем алууда катышпайт. Жумурткаларын кургакка тууйт. Өпкөсү менен дем алат. Кабырчыктуулар, таш бакалар, крокодилдер түркүмдөрүнө бөлүнөт.

38-§

Шамдагай кескелдириктин түзүлүшү, көбөйшү жана өрчүшү

Жашаган чөйрөсү, тышкы түзүлүшү. Шамдагай кескелдирик Орто Азиянын чөл жана тоо алды зоналарында тараалган. Териси бозомук же жашыл бозомук түстө болгондугу себептүү аны жырткыч жаныбарлар жакшы байкашпайт. Алар жуп-жуп болуп жашашат, түрдүү курт-кумурскалар менен тамактанышат.

Шамдагай кескелдириктин узундугу куйругу менен бирге 15–20 см ге жетет. Конус сымал башы кыймылдуу келип, кыска мойну аркылуу тулку боюна кошулат. Тумшугунун учунда эки таноосу, андан жогорураакта, башынын эки капиталында көздөрү жайлашкан (75-сүрөт). Көзүндө жогорку жана астыңкы кабактары менен бирге жаргакчага окшош ирмелүүчү үчүнчү кабагы да болот. Тез-тез ачылып жана жабылып туруучу бул кабагы кескелдириктин көзүн тынымсыз нымдалп турат. Көздөрүнүн арт жагында жайлашкан тегерек тарсылдак



75-сүрөт. Шамдагай кескелдириктин сырты түзүлүшү:
1 – таносуу;
2 – көзүү; 3 – тили;
4 – кабырчыктары;
5 – кулак тешиги.

жаргакчасы сырты угуу органы болуп саналат. Кескелдирик абдан жакшы уват. Ал тургай жөрмөлөп бараткан күрт-кумурсканын добушун да сезет. Кескелдириктин тили туюу органы; ал узун тилин бат-бат чыгарып, айланасындагы нерселерди билип алат.

Кескелдириктин буттарында 5 тен манжасы болот. Буттары тулкуга капитал жактарынан бириккендиктен денесин көтөрүп тұра албайт. Ошондуктан кыймылдагы кескелдириктин курсагы жерде сүйрөлөт; күйругу жүрүүгө жардам берет.

Кургак териси мүйүз кабырчыктар менен капиталған. Кабырчыктар кескелдириктин түмшугунда жана курсак жағында ири калканча сымал пластинкаларды, манжаларынын учунда өткүр мүйүз тырмакчаларды түзөт. Мындей калың мүйүз кабырчыктуу тери жаныбардын өсүшүнө тоскоолдук кылат. Ошондуктан бардық сойлоп жүрүүчүлөр сияктуу кескелдириктер да түлөө мезгилинде гана өсөт. Жай мезгилинде кескелдирик 4–5 жолу түлөйт. Анын эски териси үзүм-үзүм болуп көчөт, ордуна жаңысы чыгат. Денеси жаны териси катканга чейин өсө берет.

Ички түзүлүшү көп жагынан баканыкына окшош келсе да, кәэ бир органдары андан айырмаланып турат. Атап айтканда анын башы 8 моюн омурткасы аркылуу тулку боюна кыймылдуу бириккен. Көкүрөк омурткаларынын ар бирине капитал жактарынан бирден кабырга туташкан. Кабыргалардын экинчи учу төш сөөгүнө келип туташкан. Көкүрөк омурткалары, кабыргалар жана төш сөөгү биригип, көкүрөк клеткасын түзөт. Көкүрөк клеткасында өпкө жана жүрөк жайлышкан.

Кескелдирик өпкөсү аркылуу гана дем алат. Кескелдириктин өпкөсү баканыкына караганда татаалыраак түзүлгөн, башкача айтканда өпкөсү көптөгөн торлорго бөлүнгөн. Ошондуктан өпкөнүн газ алмашшуу бети кийлага чоңойгон.

Кескелдириктин жүрөгү баканыкы сыйктуу эки дүлөйчө жана карынчадан туруп, бир кыйла татаал түзүлгөндүгү менен жерде-сууда жашоочулардықынан айырмаланат. Ошого карабастан алардын организминде зат алмашуу жай жүрөт. Кескелдириктер муздак кандуу жаныбар болгондуктан денесинин температурасы айланы-чөйрөнүн температурасынан көз каранды. Ошону үчүн суук түшөөрү менен алардын кыймылдуулугу басандап, бардык сойлоп жүрүүчүлөр сыйктуу дендароо болуп калышат.

Кескелдириктин тамак синириүү, бөлүп чыгаруу жана нерв системалары да жерде-сууда жашоочулардықына окшойт. Бирок тен салмактуулукту жана кыймылдын айкалышын башкарган каракүш мәсси алардықына караганда күчтүү өрчүгөн. Ошондуктан кескелдириктер жерде-сууда жашагандарга салыштырмалуу шамдагай келишет жана кыймылдары ар түрдүү болот.

Көбөйшү жана өрчүшү. Сойлоп жүрүүчүлөрдүн жумурткалары ургаачысынын жыныстык жолунда уруктанат. Эркегинин сперматозоиддери ургаачысынын клоакасына түшөт. Сойлоп жүрүүчүлөрдө башка чыныгы кургактыкта жашоочу жаныбарлар сыйктуу ички уруктануу процесси жүрөт.

Ургаачы кескелдирик 5 тең 15 ке чейин болгон уруктанган жумурткаларды күн жакши тие турган жерге тууйт. Жумурткалар топурак менен жука кылып көмүлөт. Жумурткалар кыйла ири жана сарысы көп болуп, сырты калың кабык менен капиталган. Кабык жумуртканы кургап калуудан сактайт. Жумуртканын сарысы өрчүп жаткан түйүлдүк үчүн азық саналат. Жумурткадан чондоруна охшогон жаш кескелдириктер чыгат.

Регенерациясы. Эгерде жырткыч жаныбар кескелдириктин күйругунан кармаса, ал күйругунун бир бөлүгүн таштап, карматпай кетет. Күйругунун үзүлүп калган бөлүгү кыйлагала кыймылда болот. Бул кубулуш күйрук омурткаларынан биригинин ортосунан сынышы натыйжасында болот. Кийинчөрээк күйрук кайрадан өсүп, калыбына келет, б. а. *регенерация* жүрөт.

1. Кескелдириктин денеси кандай түзүлгөн?
2. Кескелдириктин кайсы сезүү органдары өрчүгөн?
3. Түзүлүшүнүн кайсы өзгөчөлүктөрү баканыкынан өзгөчө?
4. Кескелдириктин жумурткасы кандай уруктанат?
5. Кескелдирик кандай өрчүйт жана өсөт?
6. Регенерация кандайча ишке ашат?





- Органдарын аларга мұнөздүү белгилери менен жуптап жаз.
- | | |
|-------------|--|
| а) буттары; | 1) үстүнкү, астынкү, ирмелүүчү кабактар; |
| б) мойну; | 2) ички, ортонку, тышки бөлүктөр; |
| в) көзү; | 3) денесине капитал жагынан бириккен; |
| г) кулагы; | 4) ача, туую мүчөсү эсептелет; |
| д) тили; | 5) 8 омурткадан турат; |
| е) териси. | 6) кургак, кабырчыктар менен капиталган. |

Сөздүк дептериңе жазып ал.

Ирмелүүчү кабак, тарсылык жаргакча, туую органы, түлөө, көкүрөк клеткасы, ичтен уруктануу, жумуртка сарысы, рефлектор.



Суроого жооп тап. 1. Баканын эки кабагы болот. Эмне себептен шамдагай кескелдириктин үчүнчү кабагы да өрчүгөн? 2. Эмне себептен аракеттенип жаткан кескелдириктин жана крокодилдин денеси жерде сойлойт?

Жуп жооптор: а-5, б-1, в-3, г-5, д-6, е-1.

39-§

Сойлоп жүрүүчүлөрдүн көп түрдүүлүгү: кабырчыктуулар түркүмү

Кескелдириктер. Кабырчыктуулар түркүмүнө түрдүү кескелдирик жана жыландар кирет. Денеси кабырчыктар менен капиталган. Чөлдөрүбүздө кескелдириктерден талаа агамасы, боз эчки эмээр жана бутсуз кескелдирик – сары жылан кездешет. Эски үйлөрдүн дубалдарында түнкүсүн аракеттениген геккондорду жолуктурууга болот. Күндүз дубалдардын жылчыктарына жашынат; түнкүсүн чыкылданган добушу угулат. Алар түрдүү курт-кумурска жана жөргөмүштөр менен азыктанат. Чөлдердө ири кескелдириктерден эчки эмээрди кездештириүүгө болот.

Кескелдириктердин арасында бутсуз түрлөрү да болот. Мисал иретинде сары жыланды (жылан кескелдирикти) жана ийик сымал кескелдирикти көрсөтүүгө болот. Ошондуктан аларды кээде жыландар менен чаташтырышат.


Жыландар. Жыландардын буттары болбойт. Денесин ары-бери иймендетип, кабыргаларына таянган түрдө аркеттенет. Жыландарда чыныгы кабак болбойт. Алардын тунук кабактары сааттын айнен-

ги өндөнүп көздү жаап турат. Кескелдириктер сыйктуу жыландар да түлөйттүп. Бирок жыландар түлөгөн учурда териси бүтүн бойдон байпак сыйктуу көчүп түштөт. Жыландардын жогорку жана төмөнкү жаак сөөктөрү чоюлгуч байламталар жардамында бириккен жана кыймылдуу. Алар оозун чоң ачып, өзүнүн денесинен да жоон болгон табылгасын бүкүлү бойдон жута алат. Жыландар абада тараалган үндөрдү укпайт.

Уулуу жыландардын ооз көндөйүндөгү жогорку жаагынын арт жагында уу бездери жана жогорку жаагынын алды жагында уу чыгаруучу эң ири тиштери жайлашкан (76-сүрөт). Жылан чакканда бездер иштеп чыккан уу ошол тиштердеги борозчо же түтүкчө аркылуу табылгасынын же душманынын организмине өтөт. Жыланын учу айры тили кескелдириктики сыйктуу туюу жана даам татуу органы болуп саналат. Жыландардын угуу органы жакшы өрчүбөгөн. *Оролмо* жана *чакылдак* жыландардын жылуулукту алыстан сезе турган органдары болот.


76-сүрөт. Кара жылан жана анын башы:

1 – уу салуучу тиши;
2 – уу бези; 3 – тили.



Жылан жөргөмүш сымалдар, курт-кумурска, балық, бака, курбака, кескелдирик, майда канаттуулар жана сүт эмүүчүлөр менен азыктанат. Бирден бир нече онго дейре жумуртка тууйт.

Кызылкум, Устюрт жана Амударяя күмдарында узундугу 70 см ге чейин жеткен күм *оролмо жыланы* тараалган. Ал уулуу эмес. Табылгасын башка жыландар сыйктуу денеси менен ороп алып, кысып өлтүргөндөн кийин жутуп жиберет. Баласын тириү тууйт. Сууларда кездешкен *кадимки суу жылан* майда балык жана бакалар менен азыктанат. Балыкчылык чарбаларына мындей жыландар бир топ зиян келтириши мүмкүн. Оазистердеги жарлардан, урандылардан, кашарлардан, ал тургай үйлөрдөн *чаар ала жылан* бат-бат кездешип турат. Чаар ала жылан түрдүү ка-



77-сүрөт. Өзбекстандын уулуу жыландары:

1 – калкан тумшук; 2 – кара чаар жылан; 3 – чарк жылан; 4 – көлбар жылан; 5 – кобра.

наттуулар жана алардын балапандары, кемириүүчүлөр жана кескелдириктер менен азыктанат.

Өзбекстандын түштүк аймактарында *кобра* жыланы кездешет. Анын узундугу 170 смден 2 м ге чейин болот. Кооп туулганда же адам жакындашканда денесинин алдыңкы бөлүгүн жерден көтөрөт да, мойнун көнөйтеп, эскертуүчү түр көрсөтөт. Кобра курбака, кемириүүчүлөр, кескелдириктер жана башка жыландар менен азыктанат. Ал өтө уулуу, анын уусунан медицинада колдонулат. Түштүк аймактардагы тоолордо жана тоо этектеринде узундугу 120 см ге чейин жеткен *көлбар жылан* кездешет. Жылан канаттуулар, кемириүүчүлөр жана кескелдириктер менен тамактанат. Көлбар жыланын уусу өтө кооптуу. Орто Азиянын түштүгүндөгү чөлдөрдө жана тоо этектеринде узундугу 80–90 см келген *чарк жылан* таралган. Тынчы алынган жылан ордунда айланып баштайт жана терисиндеги кабырчыктарын сүртүп, айланып жаткан чарк сыйктуу үн чыгарат. Ал чакканда денеде күчтүү оору пайда болот, көбүнese адамдар айыгып кетишет.

Ташкент жана Самарканд областтарынын тоо этектеринде, Мырзачөл жана Харезм чөлдөрүндө *калкан тумшук* жыланды жолуктурууга болот. Ал чаккан адамдын денеси шишип, температурасы жогорулайт. 10–15 күндөн кийин айыга баштайт.

Уулуу жыландар чакканда жабыркаган жерден уу кан менен бирге кол менен кысып же ооз менен соруп чыгарып салынат. Андан кийин жараатка марганцовка, уксус же содалуу суу менен нымдалган бинт же пахта басылат. Алгачкы иш-чаралар жасал-

гандан кийин ууга каршы сыворотка кабыл алуу үчүн тездик менен ооруканага кайрылуу зарыл.



1. Кабырчыктуулар кандай түзүлгөн?
2. Кескелдириктер кандай түзүлгөн?
3. Жыландар кескелдириктерден кандай айырмаланышат?
4. Өзбекстандын аймагында кайсы уулуу жыландар тараалган?



- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Түлөгөндө териси: <ul style="list-style-type: none"> а) бүтүн бойдон көчөт; б) үзүм-үзүм көчөт; в) акырын көчөт. | <ol style="list-style-type: none"> 2. Жылуулукту сезүү органы: <ul style="list-style-type: none"> а) оролмо жана ок жыланда; б) чакылдак, көлбар жыланда; в) оролмо, чакылдакта болот. |
| <ol style="list-style-type: none"> 3. Сары жыландын: <ul style="list-style-type: none"> а) буттары болбойт; б) жогорку, төмөнкү жаактары байламта аркылуу кошулган; в) кабактары болбойт. | |



Кескелдириктердин аттары менен аларга мүнөздүү өзгөчөлүктөрүн жуптап жаз.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> а) геккондор; б) эчки эмээр; в) сары жылан; г) агамалар. | <ul style="list-style-type: none"> 1) бутсуз кескелдирик; 2) чөл, талааларда тараалган; 3) эски имараттардан кездешет; 4) ири кескелдирик. |
|---|--|



Сөздүк дептерине жазып ал.

Чөл агамасы, сары жылан, кобра, көлбар жылан, калкан түмшүк, геккон, эчки эмээр, чаар ала жылан, оролмо жылан.

Суроого жооп тап. Эмне себептен шамдагай кескелдириктиң көзү жумулат, ал эми жыландын көзү жумулбайт?

Төмөнкү табышмактарда кайсы жаныбарлар сүрөттөлгөн?

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 38. Бир кулач келген бою бар, <p style="text-indent: 2em;">Ала чаар тону бар.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 39. Узун гана ичеги, <p style="text-indent: 2em;">Учунда түйүнчөгү.</p> |
| <ol style="list-style-type: none"> 40. Ала камчы согот, <p style="text-indent: 2em;">Чымчыктарды сорот.</p> | |
| <ol style="list-style-type: none"> 41. Иймендеген из кеткен, <p style="text-indent: 2em;">Күмүш көйнөктүү ким өткөн?</p> | |

Туура жооптор: 1б, 2в, 3а.

Жуптук жооптор: а-3, б-4, в-1, г-2.

40-§**Таш бакалар, крокодилдер түркүмдөрү**

Таш бакалардын денеси арт жана курсак жактарынан сөөк жана мүйүздөн турган чопкут-калкандар менен капиталган. Чопкуту ка-бырга, омуртка жана омуроо сөөктөрү менен туташкан. Коркунуч болгон кезде таш бака башын, буттарын жана куйругун чопкутунун ичине тартып алат. Мойну узун, башы өтө кыймылдуу келет. Тили жоон жана эттүү, тиштери өрчүбөгөн, жаактары мүйүз сымал пластиналар менен капиталган. Көзү жана жыт билүү органдары жакшы өрчүгөн. Омуртка тутумунда моюн, куйрук омурткалары өз ара кыймылдуу, башка омурткалары арткы чопкуту менен киймылсыз бириккен (78-сүрөт).



78-сүрөт. Таш бакалар:
1 – саз таш бакасы; 2 – чөл таш бакасы.


Көпчүлүк таш бакалар кургактыкта, кәэ бир түрлөрү сууда жашашат. Тузсуз сууда жашоого ылайыкташкан түрлөрүнүн манжаларынын арасында сүзгүч жаргакчалары болот. Дөнз таш бакаларынын буттары калактын милдетин аткаралат.

Өлкөбүздүн чөл жана адырларында *Орто Азия таш бакасы* кенири тараалган. Таш бака тулан чөп менен тамактанат. Кәэде буудай жана беденин жаш чөптөрүн жеп, бир топ зыян да келтириет. Күн куйкалаган жай башталаары менен адырларда таш бакалар үчүн азық болчу өсүмдүктөр куурап кетет. Алар күзгө чейин чәэнге киришет. Кеч күздө аба муздай баштаганда, алар далдаа жерлерге жашынып алышип, кышкы уйкуга кетишет.

Европанын түштүгүндө *саз таш бакасы* кездешет. Ал жакшы сүзөт жана чумкуйт, сууда кездешүүчү омурткасыз жаныбарлар менен тамактанат. Ыраакы Чыгыштын суу бассейндеринде жашаган терилүү таш баканын сөөктүү чопкуту болбайт.

Тропик дениздерде жашаган *деңиз таш бакасы* өтө ири болуп, анын салмагы 300 кг дан ашат. Таши бака калак сымал буттарынын жардамында сууда сүзүп жүрөт, жумуртка тууш үчүн гана кургактыкка чыгат.

Крокодилдер түркүмү. Крокодилдер эн чоң кескелдириктерге окшойт. Денесинин узундугу 7 м ге чейин барат (79-сүрөт). Териси үстү жагынан өтө калың калканчалар менен капиталган; арткы буттарынын манжалары арасында жаргакчалар тартылган, капитал жактарынан кысыңкы келген күчтүү узун күйругу жардамында сүзөт жана чумкуйт. Эн ири *Нил крокодилинин* узундугу 7 м ге жетет. Америка материгинде таралган *алигатор* жана Индия гавиалдарынын узундугу 6,5 м ге чейин болот.



79-сүрөт. Крокодилдер:
1 – Нил крокодили;
2 – Миссисипи
крокодили.

Крокодилдер – жырткыч жаныбарлар. Көздөрү жана таноолору башынын үстүндөгү атايын дөмпөкчөлөрдө жайлышкан. Суудагы крокодилдин таноолору менен көздөрү суудан чыгып турат. Ушундай түрдө крокодил сууга жакындашкан ири жаныбарларды жай байкоого алат жана сездирбей жакындашып, аларды кармайт. Ургаачы крокодил кургактыкка чыгып, өзү казган чункурчага ондогон жумуртка тууйт жана көбүнese жумурткаларын кайтарат. Жумурткадан

чыккан балдарын сууга алып барат. Башка сойлоп жүрүүчүлөргө салыштырмалуу татаал түзүлгөн. Алардын өпкө көндөйү тосмолор менен көптөгөн камераларга бөлүнгөн, жүрөгү төрт камералуу. Вена жана артериянын каны жүрөктөн чыккандан кийин аралашып кетет.

Крокодилдердин териси жогору бааланат. Терисинен кооз портфель, сумка, бут кийимдер жасалат. Кээ бир мамлекеттерде, мисалы, Кубада крокодилдер атайын бассейндерде өрчүтүлөт.

Сойлоп жүрүүчүлөрдүн келип чыгышы. Сойлоп жүрүүчүлөр илгери жерде-сууда жашоочулардан келип чыккан. Мындан 300 млн жыл мурда жердин бетиндеги климаттын барган сайын кургакташыши таасиринде сууда жашоочулар кургак климатка ылайыкташып барган; алардын териси калындашкан; өпкөсү кенеийип, териси дем алууда катышпай калган. Жумурткаларынын кабыгы да калындашып, алар кургактыкка жумуртка тууй баштаган. Алардан азыркы сойлоп жүрүүчүлөр пайда болгон. Жерде-сууда жашоочулардын башка бир бөлүгү өзгөрүп, алардан азыркы куйруктуулар жана куйруксуздар келип чыккан.



1. Таш бакалардын чопкуту кандай түзүлгөн?
2. Чөл таш бакасы кандай күн көрөт?
3. Крокодилдер сууда жашоого кандай ылайыкташкан?
4. Крокодилдердин татаал түзүлүш белгилери эмнеден турат?
5. Сойлоп жүрүүчүлөр кандай пайда болгон?



1. Таш бакалардын чопкуту:
 - а) кабыргалар, далы сөөктөрү менен туташып кеткен;
 - б) кабыргалар, моюн жана омурткалар менен туташкан;
 - в) кабыргалар, омурткалар жана омуроо менен туташкан.
2. Крокодилдердин ургаачысы:
 - а) чункур казып, жумуртка тууйт;
 - б) түрдүү жаныбарларды уулайт;
 - в) дем алат.
3. Крокодилдин таноосу, көзү:
 - а) башындагы чункур чада;
 - б) башындагы дөмпөкчөдө;
 - в) башынын алдыңкы учунда.



Крокодилдер менен алар тараалган жерлердин аттарын жуптап жаз.

- а) Нил крокодили;
 - б) аллигаторлор;
 - в) гавиалдар.
- 1) Америка;
 - 2) Индия;
 - 3) Африка.

Сөздүк дептериңе жазып ал.

Таш бакалар, чопкут-калкан, Орто Азия таш бакасы, дениз таш бакасы, саз таш бакасы, терилүү ташбака, крокодилдер, Нил крокодили, аллигаторлор, гавиалдар.



Суроого жооп тап. Крокодилдин жүрөгү төрт камералуу болгону менен, ал жerde артерия жана вена кандарап аралашпайт. Анда эмне себептен кан тамырлар анын денесине аралашкан канды алыш келет?

Төмөнкү табышмактарда кайсы түркүмгө таандык жаныбарлар сүрөттөлгөн?

42. Устү таш да, асты таш,
Ортосунда эттүү баш.

43. Жөрмөлөгөн ташты көр,
Таштан чыккан башты көр.

Туура жооптор: 1в, 2а, 3б.

Жуптук жооптор: а-3; б-1; в-2.

8.4. КАНАТТУУЛАР КЛАССЫ


Канаттуулар – абага ылайыкташкан жылуу кандуу жаныбарлар. Денеси күш жүнү менен капиталган. Сөөктөрү жеңил, түтүкчө сымал сөөктөрүнүн көңдөйүнө аба толгон, жаактары мүйүз тумшукка, алдыңкы буттары канатка айланган. Дене температурасы тышкы чойрө температурасынан көз каранды эмес. Дем алууда өткө менен биргө аба баштыкчалары да катышат. Жүрөгү төрт камералуу, жылуу кандуу жаныбарлар жумуртка тууп көбөйөт.

Алардын түзүлүшү көк көгүчкөндүн мисалында үйрөнүлөт.

41-§

Көк көгүчкөндүн тышкы түзүлүшү


Дене бөлүктөрү. Денеси баш, моюн, тулку бой жана буттардан турат (80-сүрөт). Чоң болбогон тоголок башы узун жана өтө кыймылдуу мойну аркылуу тулку бойго туташкан. Көгүчкөн мойнун буруп тамакты чокушу; тумшугу менен курсагындагы, канатындагы жана жонундагы күш жүндөрүн тазалашы мүмкүн. Учканда жаяйылган канаттары көтөрүү бетин түзөт (81-сүрөт). Канаттуулардын буттарынын төмөнкү бөлүгү, шыйярагы жана манжалары мүйүз кабырчыктуу одуракай тери менен капиталган. Жерде көгүчкөн буттарына гана таянып жүрөт.

**80-сүрөт. Көгүчкөндүн сырткы түзүлүшү:**


1 – башы; 2 – моюну; 3 – канаты; 4 – күйругу; 5 – ұстунқұ түмшугү; 6 – астыңқы түмшугү; 7 – тили; 8 – таноосу; 9 – кулак тешиги; 10 – манжасы тырмагы менен; 11 – шыйрагы.

81-сүрөт. Көгүчкөндүн канатынын түзүлүшү:

1 – күн жилиги; 2 – кар жилиги; 3 – манжа сөөктөрү; 4 – булчуну; 5 – қыска чалғындары; 6 – узун чалғындары.



Дене каптоосу. Канаттуулардын териси күш жүн менен кепталган. Күш жүндөрү түзүлүшү боюнча күш жүнү жана тыбытка бөлүнөт. Контурдуу күш жүндөр аткарған милдетине карай контурдук-жабуучу (дene бетиндеги күш жүндөр), контурдук чалғындар (канаттар), башкаруучу (күйрук) жана мамык күш жүндөрүнө бөлүнөт. Күш жүнү ичке, катуу өзөкчөдөн жана анын эки жагындары жазы, жумшак желпүүрлөрдөн турат. Желпүүрлөрү өзөкчөдөн чыгып, удаалаш эки жолу бутактанган мүйүз сакалчалардын (кылчалардын) калың торчосунан түзүлгөн. Күш жүндүн өзөкчөсүнөн чыккан 1-катарадагы кылчалар өз ара параллель жайлышкан. Ар бир кылчанын эки жанында мындан да ичке 2-катарап кылчалар абдан майда илгичтер жардамында туташып кеткен (82-сүрөт). Күш жүндөр женил, ийилгич, дээрлик абаны өткөрбөйт. Канаттуулар учканда канатындары жана күйругундары



82-сүрөт. Канаттуулардын күш жүндөрүнүн түзүлүшү:

А – контурдук чалғындары; Б – контурдук жабуучу күш жүн. В – тыбыт:
1 – калемчеси; 2 – биринчи жана экинчи катардагы кылчалары; 3 – өзөкчесү.

Күш жүндөрү бири-бириниң үстүнө черепица сыйктуу түшүп, көтөрүү бетин пайда кылат.

Контурдуу күш жүндөрдүн астында майда мамык күш жүндөр бар. Алардын желпүүрлөрү жумшак жана көндөгөй болот; 2-катардагы кылчалары болбойт. Суу канаттууларында тыбыт күш жүндөрү да болот. Тыбыт күш жүнүнүн өзөкчөсү абдан кыска; кылчалары анын учунда кисточка сыйктуу жайлышкан. Тыбыттар денедеги жылуулукту жакшы сактайт. Канаттуулар түлөгөндө эски күш жүндөрү төгүлүп, ордуна жаңы күш жүндөр пайда болот.

Терисинде бездер өрчүбөгөн; суу канаттууларында гана куйруктун негизинде чычаң бези болот. Тумшугу менен бул безден май сымал суюктук чыгарып, күш жүндөрүнө сүртөт. Май канаттарды ийилчээк жана серпилгич кылат, суу жуктурбайт. Күш жүндөрү жок бут шыйрагынын терисинdegи майда кабырчыктар сойлоп жүрүүчүлөрдүн мүйүз кабырчыктарына окшойт. Алардын күш жүндөрү да, тумшугу да, тырмактары да мүйүздөн турат.



1. Канаттуулардын денеси кандай түзүлгөн?
2. Контурлуу күш жүндөр кандай түзүлгөн?
3. Мамык жана тыбыт күш жүндөр кандай түзүлгөн?
4. Контурлуу күш жүндөр кандай милдет аткарат?
5. Тыбыт күш жүндөр кандай милдет аткарат?
6. Чычаң бездерини кандай милдет аткарат?



1. Күш жүндөр жакшы өрчүгөн:
а) токой канаттууларында;
б) чөл канаттууларында;
в) суу канаттууларында.
2. Мүйүз сымал кабырчыктар:
а) буттун жана манжаларда;
б) тумшук жана моюнда;
в) буттун балтырында болот.

3. Суу канаттууларынын: а) контурлуу күш жүнү калын; б) түмшүгү мүйүз менен капиталган; в) чычаң бези өрчүгөн.



Күш жүндөрүн аткарған милдеттери менен жуптап жаз.

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| а) контурдук чалғындары; | 1) учканда денесин багыттайт; |
| б) башкаруучу; | 2) денесинин бетин капитайт; |
| в) жабуучу күш жүнү; | 3) жылуулукту сактайт; |
| г) тыбыт күш жүнү. | 4) көтөрүү бетин пайдада кылат |

Сөздүк дептериңе жазып ал.

Күш жүн капитоосу, контурлуу күш жүн, контурлуу чалғындар, мамык күш жүн, контурлуу жабуучу күш жүн, тыбыттар.



Суроого жооп тап. 1. Канаттуулардын мойну денесине салыштырмалуу узун жана кыймылдуу, ал эми денесинин кыска жана кичине болушу алар үчүн кандай маниге ээ? 2. Эмне себептен үй канаттуулары уча албайт? 3. Эмне себептен канаттуунун эти тез сине турган диеталык тамак саналат?

Туура жооптор: 1в, 2а, 3в.

Туура жуптуктар а-4, б-1; в-2, г-3.

42-§

Көк көгүчкөндүн скелети, булчундары


Скелети. Көк көгүчкөндүн жана башка канаттуулардын скелети баш сөөктөн, омуртка тутумунан, канаттардан, буттан, далы жана жамбаш курчоолорунан турат (83-сүрөт). Скелеттин түзүлүшү канаттуулардын учууга ылайыкташкандыгын билдириет. Түтүк сымал сөөктөрү көндөйүндө аба болгондуктан, өтө женил болот. Бир топ сөөктөр кошуулуп өскөндүгү себептүү күштардын скелети сойлоп жүрүүчүлөрдүкүнө караганда кыйла бекем келет.

Баш сөөгү тоголок баш сөөк кутучасынан, көздөрдүн чоң чанагынан, үстүнкү жана алдыңкы жаактардан турат. Жаактары мүйүз менен капиталган түмшүкка айланган; тиштери болбойт. Баш сөөктөрүнөн алдыңкы жаак гана кыймылдуу келет.

Омуртка тутумунун моюн бөлүгү узун болуп, өз ара кыймылдуу бириккен омурткалардан түзүлгөн. Канаттуу башын артка карај 180° ка бурушу, денесин кыймылдатпай жана эңкейтпей эле айланасындағы тамакты чокушу мүмкүн. Арка омурткалары өз ара

83-сүрөт. Көгүчкөндүн скелети:

1 – баш сөөгү; 2 – үстүнкү түмшугу; 3 – алдыңкы түмшугу; 4 – моюн омурткалары; 5 – далысы; 6 – арка омурткалары; 7 – акырек; 8 – мұрғ сөөк; 9 – төш сөөгү; 10 – төштүн кыры; 11 – жото жилик; 12 – кашка жилик; 13 – таманы; 14 – буттун кетмени; 15 – манжалары; 16 – жамбаш; 17 – манжасы; 18 – кары жилик; 19 – кабыргалары; 20 – күйрук омурткалары.



Кыймылсыз бириккен. Бел, күймұлчак жана күйрук омурткалары өз ара биригип, жалғыз күймұлчак сөөгүн түзет. Күйрук сөөгү канаттуулардың күйругундагы буруучу күш жүндөр үчүн таяныч болот. Омуртка тутумундагы арка бөлүгү қабыргалар жана төш сөөгү менен бирге көкүрөк клеткасын түзет. Төш сөөгүнүн төмөнкү жагы жазыланып, кайыкка окшош төш кырын пайда қылат. Бул сөөккө канаттарды кыймылга салуучу булчундар бекиген. Кабырга сөөктөрүнүн бир учу арка омурткалар менен, экинчи учу төш сөөгү менен кыймылдуу кошуулган.

Канат курчоосу мұрғ, далы жана акырек сөөктөрүнөн турат. Акыректер төмөнкү бөлүгү менен кошуулуп ачакейди түзет. Канат скелети жалғыз күн жиликтен, эки каруу (укурук сөөк жана кары жилик) жана бир нече манжа сөөктөрүнөн турат. Канаттуулардың канатында үч гана манжасы болот, мунусу менен алар жердесууда жашоочулардың жана сойлоп жүрүүчүлөрдүн беш манжалуу алдыңкы буттарынан айырмаланат. Канаттагы бир нече майда манжа сөөктөрү кошуулуп, бүтүн бир сөөкту түзет. Манжа санынын азайышы жана майда сөөктөрдүн кошуулуп кетиши натыйжасында манжа сөөгү бекем болот.

Бут курчоосу үч жуп жамбаш сөөгүнөн турат. Бул сөөктөр омуртка тутумунун бел, күймұлчак бөлүмдөрү жана биринчи күйрук омурткалары менен кыймылсыз биригип кеткен.

Көгүчкөндүн бут скелети жоон сан, эки балтыр, шыйрак жана манжалардан турат. Шыйрак сөөгү канаттууларга гана мұнөздүү, ал бир нече майда сөөктөрдүн биригишинен курагат. Шыйрактын төмөнкү учунан манжа сөөктөрү келип туташкан. Шыйрак канаттуунун денесин жердин бетинде көтөрүп турат жана конуп жаткан канаттуунун денесине таасир этүүчү соккуну азайтат.

Булчундары. Бир жуп чоң төш булчунунун массасы башка бардык булчундарынын массасына тең келет. Төш булчундарынын бир учу далыга, экинчи учу төш сөөгүнүн кырына бекийт. Чоң төш сөөктөрү жыйрылганда канаттар түшүрүлөт. Акырек булчундарынын жыйрылышы натыйжасында канаттар көтөрүлөт.

Жакши өрчүгөн буттун булчундары канаттуулардын жердеги кыймылына жардам берет. Буттун муундары аркылуу тарамыштар еткөн. Алардын учу манжаларга бекийт. Канаттуу бутакка конгонда алар жыйрылат жана манжалар кысылып, бутакты бекем кармайт. Ошондуктан канаттуулар дарактардын бутагында эркин отурушу, ал тургай жыгылбай укташы мүмкүн.



- Скелеттик түзүлүшүнүн кайсы өзгөчөлүктөрү канаттуулардын учууга ылайыкташканынан көз каранды?
- Баш скелети кандай сөөктөрдөн турат?
- Кайсы сөөктөр көкүрөк клеткасын түзөт?
- Канаттардын скелети кандай сөөктөрдөн турат?
- Буттун скелети кандай сөөктөрдөн турат?
- Канаттуулардын кайсы булчундары күчтүү өрчүгөн?



- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> Канаттуулардын жаактары: <ol style="list-style-type: none"> башка кыймылдуу бириккен; мүйүз түмшүкка айланган; мүйүз тиш менен капиталган. | <ol style="list-style-type: none"> Төштүн кырына: <ol style="list-style-type: none"> choң төш булчундары; акырек бекийт; кичине төш булчундары бекийт. |
|--|---|
- Канаттуулардын көкүрөк клеткасын:
 - арка омурткалары, кабыргалар жана төш сөөгү түзөт;
 - кабыргалар, акырек жана төш сөөгү түзөт;
 - акырек, төш жана омурткалар түзөт.



Канаттуу булчундарын аткарған милдети менен жуптал жаз.

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> choң төш; акырек асты; бут. | <ol style="list-style-type: none"> канатты көтөрүү; жерде кыймыл-аракет жасоо; канатты түшүрүү. |
|---|--|

Сөздүк дептерине жазып ал.

Мүйүз түмшук, баш сөөк кутусу, төштүн кыры, мұрұ сөөк, шыйрак, чон төш булчундары, ақырек асты булчундары.

5-лабораториялык машигуу. Канаттуулардын тышкы түзүлүшү жана күш жүндөрү

Керектүү жабдуулар: канаттуунун тулуму, күш жүндөрүнүн комплекти, кол лупасы, микроскоп.

Лабораториялык машигуу төмөнкүдөй тартиpte жүргүзүлөт:

1. Тулумдун жардамында канаттуунун тышкы түзүлүшүн үйрөн. Башын, моюнун, канаттарын, күйругу менен буттарын күнт кооп карап чык.

2. Күштүн түмшугунун түзүлүшүнө байкоо жүргүз. Тилин, мурун жана кулак көндөйлөрүн тап.

3. Канаттуу буттарынын төмөнкү бөлүгүнүн кабырчыктар менен капиталгандыгына байкоо жүргүз. Буттарындагы манжаларын сана, манжаларынын кандайча жайлашкандыгына көңүл бур.

4. Канаттуунун күш жүндөрүнө күнт кооп байкоо жүргүз. Күш жүндөрүнүн денеде кандай жайлашкандыгына көңүл бур. Эң ири жана эң майда күш жүндөрү кандай жайлашкандыгын аныкта.

5. Контурдук жабуучу күш жүндөрүнө байкоо жүргүз, кылчасын, желпүүрүн жана өзөкчөсүн тап. Желпүүрлөрдөгү кылчалардын жайлашышын лупа же микроскоптун жардамында текшер. Желпүүрдү ийне менен тытып, микроскопто биринчи жана экинчи катар кылчаларды үйрөн.

6. Желпүүрү тытылган күш жүнүн манжаларындын арасынан өткөрүп, желпүүрдүн кайра калыбына келишине байкоо жүргүз.


7. Күш жүндөрүнүн жана тыбыттын түзүлүшүн салыштырып, алардын ортосундагы айырманы аныкта. Күш жүндөрүнүн жана мамыктын түзүлүшүн дептериң чийип ал.

8. Канаттуулар менен сойлоп жүрүүчүлөрдүн тышкы түзүлүшү жана тери каптоосунун ортосунда кандай окшоштук бар экендигин аныкта.

43-§

Канаттуулардын ички түзүлүшү жана сезүү органдары

Тамак сириүү системасы. Канаттуулар азыкты түмшугу менен чокыйт. Түмшугунун түзүлүшү тамактын түрү, тамактануу усуулан көз каранды. Тиштери болбогондуктан канаттуулар тамакты бүкүлү бойдон жутат. Чоңураак тамакты (жемди) түмшугу менен чокуп, үзүп алыш жутат. Дан жечүй канаттуулардын (мисалы, көгүчкөндүн) кызыл өнгөчүнүн түп жагы кенип, тамакты убактылуу кармап туруучу орган – жемсөөгө айланган (84-сүрөт). Бөтөгөсү эки бөлүмдөн турат. Биринчи бездүү бөлүмүндө карын суюктугу бөлүнүп чыгат, анын таасиринде тамак жумшарат. Экинчи бүлчүндүү бөлүмдө тамак майдаланат. Канаттуу жуткан майда таштар тамактын майдаланышына жардам берет.



84-сүрөт. Көгүчкөндүн тамак сириүү, бөлүп чыгаруу жана дем алуу системалары

- 1 – ооз көндөйү; 2 – жемсөөсү;
- 3 – кызыл өнгөчү; 4 – бөтөгөсү;
- 5 – уйку бези; 6 – клоакасы;
- 7 – бөйрөгү; 8 – кокосу; 9 – өпкөсү;
- 10 – аба баштыкчасы; 11 – боору.

Дене температурасынын түрүктуу болушу жана учушу алардан абдан көп энергияны талап кылат. Ошондуктан канаттуулар бат-бат азыктанат, жашоосунун көп бөлүгүн тамак издөөгө сарптайт. Тамак алардын ичегисинде тез сирилдет.


Ичегиси клоакага ачылат. Клоакага жыныстык органдарынын чыгаруу жолу жана сийдик түтүкчөлөрү да ачылат. Клоакада сийдик кыгы менен аралашып сыртка чыгарылат.

Дем алуу системасы. Канаттуулар кыйла татаал түзүлгөн өпкө аркылуу дем алат. Дем алууда *аба баштыкчалары* да катышат. Баштыкчалар ички органдар арасында жайлышып, өпкө менен байланышкан. Канаттуулар жерде көкүрөк клеткасынын кеңейип-кысылыши натыйжаласында дем алат. Абадагы күштүн канаттары

кыймылдаганда аба баштыкчалары да кысылып-кеңеет. Учкан күштүн өпкөсүндө газ алмашуу эки жолу: аба өпкөгө киргенде жана баштыкчалардан чыккан аба өпкө аркылуу өткөндө жүрөт. Канаттары канча көп кыймылдаса, өпкө аркылуу абанын айланышы ошончо тездешет. Ошондуктан учкан канаттуунун дем алышы кысылбастан, тетирисинче, тездешет. Көгүчкөн бир минутта тынч турган абалда 26 жолу, учканда 400 жолу дем алат. Баштыкчаларга кирген аба денесин сергитеет.

Кан айлануу системасы эки кан айлануу тегерегинен турат. Жүрөгү төрт камералуу: эки дүлөйчө жана эки карынчадан турат (85-сүрөт). Ошондуктан артерия жана вена кандары таптакыр бөлүнгөн болуп, жүрөктөн денеге кычкылтекке бай артерия каны куюлат. Жүрөктүн иштеши алардын кыймылынан көз каранды. Мисалы, тынч турган көгүчкөндүн жүрөгү 165 жолу, учканда 550 жолу жыйрылат. Зат алмашуу процесси канаттуулардын организминде абдан тез жүргөндүктөн, алардын дene температурасы 42°C ту, кээ бирлериники $44,5^{\circ}\text{C}$ ту түзөт.

85-сүрөт. Көгүчкөндүн кан айлануу системасы жана жүрөгүнүн түзүлүшү
 1 – жүрөк; 2 – өпкө; 3 – кан айлануунун кичине тегереги; 4 – кан айлануунун чоң тегереги; 5 – он дүлөй; 6 – он карынчасы; 7 – сол дүлөй; 8 – сол карынчасы; 9 – аорта; 10 – өпкө артериялары; 11 – вена; 12 – өпкө венасы.




Сезүү органдары. Канаттуулардын көзү абдан жакшы өрчүгөн. Кээ биринин көзү кишиникине караганда 100 эсे сезгири келет. Алар түстөрдү да башка жаныбарларга караганда жакшы ажыратат. Канаттуулар жакшы учушат, бирок жыт билүүсү начар.

Нерв системасы. Канаттуулардын баш мээси кыйла ири жана татаал түзүлгөн (86-сүрөт). Алардын түрдүүчө кыймылы баш мэенин, айныкса, алдыңкы жарым шарлардын күчтүү өрчүгөндүгүнөн көз каранды. Каракүш мэссиинин кабыгында бүрмөлөрү көп. Алардын татаал кыймыл-аракети каракүш мээден көз каранды. Бирок алардын көптөгөн аракеттери (жу甫ташуу, уя салуу, жумуртка басуу, балапанга кам көрүү) тубаса инстинкт саналат.

86-сүрөт. Канаттуунун баш мээсинин түзүлүшү

А – үстү жагынан көрүнүшү;
 Б – капталынан көрүнүшү:
 1 – чоң жарым шарлар; 2 – ортоңку мээ; 3 – каракуш мээ;
 4 – сүйрү мээ.



Канаттуулардын жашоосунда түрдүү шарттуу рефлекстер пайда болуп турат. Мисалы, жумурткадан чыккан жаш балапандар баштап көзгө көрүнгөн бардык нерсени чокуп көрүштөт. Кийинчөрээк алар жегенге боло турган жана болбой турган нерселерди айырмaloону үйрөнөт; өзүнүн ээсин тааный турган, анын үнүнө көнүл бура турган болот. Канаттууларда абада болжол менен жол табуу касиети да жакшы өрчүгөн. Бул касиет алардын учуп кетиши жана келишинде чоң роль ойнойт.

Күштар түрдүү үндөр аркылуу байланыш жасайт. Алар сайроо менен кошо тынчсыздануу, коркунуч, чакыруу жагдайларын билдирген үндөр чыгарышып, өзүнүн түрүндөгү индивиддерге кабар берет. Карга, майна, чыйырчык, айныкса, тоту күштар кээ бир сөз, ал тургай фразаларды эстеп калып, кайталашы мүмкүн.



1. Канаттуулардын тамак синириүү системасы кандай түзүлгөн?
2. Канаттуулар кандай дем алат?
3. Канаттуулардын кан айлануу системасы кандай түзүлгөн?
4. Канаттуулардын баш мээси кандай түзүлгөн?
5. Канаттууларда кандай рефлекстер пайда болот?
6. Канаттуулардын кайсы сезүү органдары өрчүгөн?



1. Клоакага ачылган органдар:
 - а) ичеги, бөтөгө, жыныстык бездери;
 - б) ичеги, жыныстык бездери, сийдик жолу;
 - в) сийдик жолу, өт, жыныстык бездери.
2. Канаттуулардын баш мээсинин:
 - а) алдыңкы бөлүгү жана каракуш мээси күчтүү өрчүгөн;
 - б) ортоңку жана каракуш мээси жакшы өрчүгөн;
 - в) жарым шарлары жана каракуш мээси начар өрчүгөн.

Сөздүк дептериңе жазып ал.

Жемсөө, булчундуу бөтөгө, бездүү бөтөгө, аба баштыкчалары, артериялык кан, веналык кан, каракуштун бүрмөлөрү.



Суроого жооп тап. Дыйкандарыбыздын «Канаттуунун кыгынан көбүрөөк салынганда, эгин кургап қалат» дейишинин себеби эмнеде? 2. Канаттуулар кантит бир жолу өпкөгө кирген абадан эки жолу дем алат?

Туура жооптор: 1б, 2а.


44-§

Канаттуулардын көбөйүшү, өрчүшү жана келип чыгышы

Көбөйүнүн башташы. Кышкы аяздуу құндөр өтүп, аба жылый башташы менен канаттуулар көбөйүгө даярдык көрө башташат. Кәэ бирлери эрте жазда, башкалары жаздын ортолорунда көбөйүгө киришет. Көбөйү мезгили жумуртқадан чыккан балапандар үчүн тамактын мол болушунан көз каранды.

Жуптардын түзүлүшү. Көпчүлүк канаттуулардын эркеги жана ургаачысы көбөйү мезгилиnde түгөй тандайт. Майда канаттуулар, мисалы, *чымчык сымалдардын* жана *бактектердин* жуптугу бир сезон, жырткыч жана башка ири канаттуулардын (илегилек, карга) жуптугу көп жылдар сакталат. Айрым канаттуулар бир эркеги жана бир нече ургаачыларынан турган үйүр түзөт. Кәэ бир *тоок сымалдардын* (керенкур, каракурлар) турукту түгөйлөрү болбойт. Эркек канаттуулар жупташуу алдынан сайрашат же бийге түшүп жаткандай кыймыл жасашып, ургаачыларын чакырышат. *Керенкурлардын* жана *каракурлардын* короздору ачык талаада өз ара тартышуу үчүн чогулушат. Алар канаттарын жана куйруктарын жайышып, өздөрүн көрсөткөнгө аракет жасашат. Мындай учурда алардын ортосунда кыска мөөнөттүү кармашуу да болуп өтөт.

Уя салуу. Көпчүлүк канаттуулар жумуртка тууш үчүн уя салат (87-сүрөт). Жырткыч канаттуулар, илегилектер, көгүчкөндөр, чар каргалар бутак жана чөптөрдөн чөйчөк сымал уя салат. Тоңқулдак жана көк чымчык сыяктуу токой канаттуулары дарактардын көндөйүнө, өрдөктөр менен каркыралар жерге уя салат. Айыл чабалекейлери үйлөрдүн чабак жыгачтарына же дубалдарга тоголоктолгон ылайды шилекейи менен чаптап уя



жасайт. Кээ бир канаттуулар, мисалы, күкүк жана кайралар уя салбайт. Күкүк жумурткасын башка күштардын уясына таштап кетет. Кайралар жумурткаларын аска ташка тууйт жана аны басып жатат.



Жумуртканын түзүлүшү. Канаттуулардын жумурткасы чоң болот (88-сүрөт). Борборунда сары түстүү суюктук бар, сарысын суюк белогуг курчап турат. Сарысы эки жагынан жипчелердин жардамында кабыкка илинип турат. Түйүлдүк сарысынын сыртында жайлашкан. Жумуртка баскан канаттуу жумурткалары тегиз ысышы үчүн аларды буттары менен тез-тез оодарып турат. Жумуртка оодарылганда сарысы да оодарылгандыктан, түйүлдүк дайыма сарысынын сыртында, б. а. канаттуунун денесине жакын турат.

Жөжөлүү жана уялуу канаттуулар. Кыргоол, бөдөнө, өрдөк, каз сыяктуу канаттуулар балапандарынын денеси мамык күш жүн менен капиталып, көзү ачык болгондуктан, жумурткадан чыккандан көп өтпөй энесинин артынан чуркап кетет. Аларга жөжөлүү канаттуулар дейилет.

Көгүчкөндүн, чабалекейдин, чымчыктын, карганын, илегилектин жана бардык жырткыч канаттуулардын жумурткадан чыккан балапандары алсыз болуп, көздөрү жумук, қулак тешиктери жабык, жыланач денеси сейрек түктөр менен капиталган болот. Аларды ата-эне канаттуулар көпкө дейре багышат. Мындаидай канаттууларга уячыл канаттуулар дейилет.

Тукумуна кам көрүшү. Канаттуулардын тукумуна кам көрүшү жумуртка басуу, балапандарын багуу, аларды жылытуу жана коргоодон турат. Эне канаттуу кандайдыр кооп туулса, душманын качырып, балапандарын коргоого аракеттенет. Бирге уялашкан канаттуулар, мисалы, *кара кучкачтар* душманын сезип калышса, үнүнүн барынча шоокум көтөрүп, башка канаттууларды жардамга чакырат. Жөжөлүү канаттуулардын ургаачысы кооп туулганда өзүнө мүнөздүү үн менен балапандарына кабар берет, балапандары заматта далдаа жерлерге жашынат. Эне канаттуу душманын качырып кирет. *Тоодактын* ургаачысы жырткыч жаныбардын көңүлүн өзүнө тартуу, аны балапандарынан алыс алып кетүү үчүн айла иштетет. Жарадар болгонсуп, канатын сүйрөп, жырткычтын алдына түшүп чуркайт. Канаттуулар тамак болчу нерселерди тапканда да үн салып, балапандарын чакырат.

Канаттуулардын келип чыгышы. Канаттуулар байыркы сойлоп жүрүүчүлөрдөн келип чыккан. Эң байыркы күш – археоптерикстин ташка айланган сөөк жана канаттары табылган (89-сүрөттөр). Жаактары, тиштери жана 20 омурткалар күйругу менен археоптерикс сойлоп жүрүүчүлөргө; денесинин күш жүнү менен капиталганы, алдыңкы буттарынын канатка айланганы менен канаттууларга окшойт. Бутундагы манжаларынын бири артка, калган үчөөсү алдыга караганы анын даракта жашаганынан кабар берет. Бирок археоптерикс азыркы канаттуулардын теги боло албайт. Алардын тегиprotoавис эсептелет. Protoавис археоптерикстен бир нече миллион жыл мурда жашаган. Анын да азыркы канаттуулардынына окшоп кыр сөөгү өрчүгөн болгон.



89-сүрөт. Археоптерикс: ташка айланган калдығы (солдо) жана соёк калдықтарынан калыбына келтирилген канаттуу (ондо).



1. Кайсы канаттуулар туруктуу жуптук түзүшөт?
2. Кайсы канаттуулардын жуптугу туруктуу болбойт?
3. Канаттуулардын уясы кандай формаларда болот?
4. Канаттуулардын жумурткасы кандай түзүлгөн?
5. Жөжөлүү канаттууларга мүнөздүү болгон белгилер кайсылар?
6. Уячыл канаттууларга мүнөздүү болгон белгилер кайсылар?
7. Канаттуулар түкүмунан кандай кам көрүшөт?



1. Күкүк өзүнүн жумурткасын:
 - a) чейчөк сымал уясына тууйт;
 - б) дарактын көндөйүндөгү уясына тууйт;
 - в) башка канаттуулардын уясына таштап кетет.
2. Көбөйүү усулу боюнча канаттуулардын топтору:
 - а) уячыл жана жөжөлүү;
 - б) жумуртка басуучу, уячыл;
 - в) жумуртка басуучу жана жөжөлүү.



Канаттуунун аты менен ал уя салган жерлерин жуптап жаз.

- | | |
|---------------|---------------------------------|
| а) илегилек; | 1) дарактардын бутагы; |
| б) тонкулдак; | 2) үйлөрдүн шыптары, дубалдары; |
| в) чабалекей; | 3) жердин бети; |
| г) құқұк; | 4) дарактардын көндөйү; |
| д) қыргоол. | 5) уя салбайт. |

Сөздүк дептерине жазып ал.

Жуптук тандоо, уя салуу, түйүлдүк диски, жипчелер, жөжөлүү канаттуулар, уячыл канаттуулар, археоптерикс.



Суроого жооп тап. Эмне себептен эски жумуртка сууга салынса, анын томпок жагы жогоруда болот?

Төмөнкү табышмактарда эмне сүрөттөлгөн?

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 44. Бышырсан – тамак таттуу, | 45. Казыктын үстүндө кар |
| Бышырбасан – чыгат канаттуу. | турбайт. |

Туура жооптор: 1в, 2а.

Туура жуптуктар: а-1, б-4, в-2, г-5, д-3.

45-§ **Канаттуулардын сезондук кубулуштарга ылайыкташуусу**

Жашоо-тиричилигин жыл мезгилдерине карай өзгөртүрүшү боюнча канаттууларды отуруктуу, көчкүн жана келгин топторго бөлүүгө болот.

Отуруктуу канаттуулар. Жыл бою бир жerde жашаган чакчыгай, бактек, көгүчкөн, кекилик, торгой, қыргоол, боз чымчык, майналарга отуруктуу күштэр дейиilet. Айрым канаттуулар жайдын аягында кышка бир аз азык камдайт. Көк чымчыктар урук, курт-кумурскаларды қабыктын жылчыктарына, дарактагы эңилчектердин арасына катып коюшат. Жем азайган кыш же эрте жаз күндөрү алар катып койгон азыктарын таап жешет.

Көчкүн канаттуулар. Жашаган жерин өзгөртүп турган канаттууларга көчкүн канаттуулар дейиilet. Чар карга, ала карга, таранчы жана кара чыйырчыктар суук түшө башташы менен үйүр болуп кары аз, бирок азыгы мол жерлерге көчүп кетишет.



90-сүрөт. Ак кунастын учуп өтүү жолу (кызыл түстөгү сыйык); кыштоочу жери (сары түстө); уя салып балапан чыгарчу жери (жашыл түстө).

Келгин канаттуулар. Мындай канаттуулар күзүндө бир аз суук же мелүүн климаттуу аймактардан жылуу өлкөлөргө учуп кетишет жана ошол жерлерде кышташат (90-сүрөт). Учудан мурда алар үйүрлөргө топтолушат.

Канаттуулар түрдүү убакыттарда учуп кетишет. Чабалекей, бул-бул, заргалдак жана илегилектер кыила эрте, жайдын аягы же эрте күздө, уялаган жеринде аба жылуу, жем жетиштүү болушуна карабастан учуп кетишет. Өрдөк, каз жана ак куулар кеч күздө, жашап жаткан суу бассейндери муздал, азык болбой калгандан кийин учуп кете башташат. Канаттуулар кыштоочу жерлерине ар дайым бирдей жолдон учуп барышат.

Канаттуулардын учуп кетишинин себептери. Алардын учуп кетиши – бул уялаган жериндеги климаттын сезондук өзгөрүшүнө ылайыкташуусу. Түндүк жана орто алкактардагы канаттуулар жылдын эң ыңгайлуу жылуу мезгилинде уя салып, жөжө ачышат, аларды багып чонойтушат. Жылдын ыңгайсыз, азык табуу кыйын кыш мезгили башталаардан мурдараак кыштоочу жерлерине учуп кетишет. Алардын жазында өз мекендерине учуп келиши көбөйүү инстинктинен көз каранды. Күзүндө күндүн кыскарышы кыштоочу жерге учуп кетүү учун сигнал болот.

Учуп өтүү жолдорун аныктоо. Кыштоочу жерлерине учуп бара жаткан канаттуулардын жол табышында күнгө карай болжол алууда мааниге ээ. Анткени, көптөгөн канаттуулар күндүзү тамактанып, түнкүсүн учушат. Тажрыйбаларда алардын жылдыздарга карап жол

табышы аныкталган. Айрым канаттуулар Жер магнит талаасынын өзгөрүшүн кабыл алышы да мүмкүн.

Канаттууларга шакек салуу. Кыштаган жерин, учуп өтүү жолун, таралышын, канча жашашын аныктоо үчүн канаттуулар шакектелет. Ал үчүн канаттуунун бутуна шакектөө пунктунун адреси жазылган жеңил шакек салынып коюп жиберилет. Аны кармаган адам шакекти алыш, кат аркылуу көрсөтүлгөн адреске жөнөтүүгө тийиш. Шакектөө аркылуу Орто Азия ак кунастарынын Түндүк Индияда, Европа ак кунастарынын Түштүк-Чыгыш тропик Африкада; бул-булдардын тропик Африкада жана чабалекейлердин Африка жана Индияда кыштаганы аныкталган.

- 
1. Кайсы канаттууларга отуруктуу дейилет?
 2. Кайсы канаттууларга көчкүн дейилет?
 3. Кайсы канаттууларга келгин дейилет?
 4. Эмне себептен канаттуулар учуп кетишет?
 5. Канаттуулардын учуп өтүү жолдорун кантип аныкташат?
 6. Эмне максатта канаттууларга шакек салынат?

- 
1. Биздин ак кунастарыбыз:
 - a) Тропик Африкада кышташат;
 - b) Индияда кышташат;
 - c) Түштүк-Батыш Африкада кышташат.
 2. Канаттууларды шакектөөдөн негизги максат:
 - a) көбөйүү мезгилин аныктоо;
 - b) көбөйүү жерин аныктоо;
 - c) учуп өтүү жана кыштоо жерин аныктоо.

- 
- Күштэрдин тобун жана аларга мүнөздүү өзгөчөлүктөрүн жуптап жаз.
- | | |
|---------------|--|
| a) отуруктуу; | 1) бизде күзүндө жана жазында кездешет; |
| б) көчкүн; | 2) кээ бир түрлөрү азық камдайт; |
| в) келгин; | 3) курт-кумурскалар пайда болгондо учуп келет; |
| г) өткүнчү. | 4) өзүнүн жерин өзгөртөт. |

Сөздүк дептерине жазып ал.

Отуруктуу канаттуулар, көчкүн канаттуулар, келгин канаттууларды шакектөө.

Табышмак кайсы жаныбарга тиешелүү?

- 
46. Күштэрдин эң кичинеси,
Көпөлөктөй келет ириси.

Туура жуптуктар: а-2, б-4, в-3, г-1.

Туура жооптор: 1б, 2в.

46-§

Канаттуулардын көп түрдүүлүгү: оазис жана чөл канаттуулары

Оазис канаттуулары. Шаар жана айылдарбызыздагы бак жана парктардагы, талаалар жана жайыттардагы канаттуулардын арасынан чымчык сымалдар көпчүлүктү түзүшөт.

Чымчык сымалдар түркүмү. Бул түркүмгө чабалекей, чар карга, чыйырчык, булбул, таранчы жана башка канаттуулар кирет. Алардын эркеги чоң жана түстүү болушу, үнү, башындагы таажыга окшош күш жүнү менен ургаачыларынан ажырап турат. Чымчык сымалдар бардык канаттуулар түрүнүн дээрлик жарымын өз ичине алат (91-сүрөт).



91-сүрөт. Өреөн канаттуулары. Чымчык сымалдар түркүмү:

- 1 – кара чыйырчык; 2 – сагызган; 3 – чабалекей; 4 – таан;
- 5 – ала карга; 6 – көк чымчык; 7 – ўй таранчы; 8 – чар карга.

Чабалекейдин денесинин арт жагы көгүш кара, курсак жагы ак, мойну жана мандайы кызғыш конур түстө, канаттары ичке жана узун, куйругу да узун, бирок ачакей түрүндө болот. Анын буттары кыска жана күчсүз өрчүгөн; жазы жана кыска түмшүгү өтө кең ачылат. Чабалекей түмшүгүнүн жардамында абада учуп жүргөн күрт-кумурскаларды илип кетет.

Чабалекей ўйдүн шыптарындагы жыгачтарга, кээде дубалдарга да шилекейи менен аралаштырылган ылайдан уя салат. Уяга 4–6

жумуртка тууп, ургаачысы басат. Балапандарын курт-кумурска менен тамактандырат. Чабалекейлер дээрлик күн бою абада болушат. Табылгасын да абада кармайт. Учуп бара жаткан чабалекей суунун бетине тийип өтүп, киринет жана суу ичет.

Чымчык сымалдардан эң ири түрлөрү болуп чар карга, таан жана ала карга саналат. *Чар каргалар* кыштоо үчүн түндүктөн өлкөбүзгө учуп келишет; март айларында кайра учуп кетишет. Кышында чар каргалар таандар менен бирге чон-чон үйүрлөрдү түзүшөт. Үйүрлөр бийик дарактардын бутактарында түнөшөт.

Чымчык сымалдардын көпчүлүк түрлөрү – бардык нерселерди жей бере турга канаттуулар. Мисалы, *кара чыйырчыктар* көбүнесе талаалардагы курт-кумурскаларды терип жайт, бирок бышыкчылык мезгилинде жер-жемиштерди жана мөмөлөрдү чокуйт. Көпчүлүк дан жечү канаттуулар балапандарын курт-кумурскалар менен тамактандырат. Чымчык сымал канаттуулардан, айныksa курт-кумурска жечүлөрү айыл чарбасына чон пайда келтириет. Алар абдан көп сандагы зыянкеч курт-кумурскаларды кырып салышт. Кээ бир чымчык сымалдар (мисалы, таранчылар, чыйырчыктар) бышыкчылык мезгилинде мөмөлөрдү жана дандарды жеп, кыйла зыян да тийгизишет.

Көгүчкөн сымалдар түркүмү. Шаар жана айылдарыбыздын көчөлөрүндө, парктарда *көк көгүчкөндөр* жана бактектер көп кездешет. Көгүчкөндөр төгүлгөн дандарды, жапайы чөптөрдүн уруктарын терип жешет; жарга, аска, урандыларга жана бийик имараттардын башына уя салышат. Көк көгүчкөн бардык бакма көгүчкөндөрдүн тукум башы болуп саналат.

Бактектер көбүнчө тамак издеپ, кишилер жашаган үйлөргө чейин кирип барышат. Алар ар түрдүү дан, жашылча жана мөмөлөрдүн уруктары менен тамактанышат; бактектер жуп-жуп болуп жашашат; жыл бою 5 жолу балапан чыгарат.

Чөл канаттуулары. Ачык талаа, чөлдөрдө далдаа жерди табуу кыйын. Анда жашаган күштар жерден тамак издешет; жерге жумуртка тууп, балапан чыгарышат. Чөл канаттууларынын буттары менен мойну узун жана күчтүү, күш жүнү жер түсүндө болот. Бул аларга душманынан оной качып кутулуга жана аларды алыстан сезүүгө жардам берет.

Тоодактар түркүмү. Тоодактар – ири, тез чуркаган канаттуулар, Өзбекстанда кездешкен тоодактардын күш жүндөрү жер түсүндө



92-сүрөт. Тоодактар жана төө күш сымалдар түркүмү:
1 – тоодак; 2 – төө күш.

болгондуктан, алыстан көрүнбөйт. Алар жапайы өсүмдүктөрдүн жалбырактары, өркүндөрү, уруктары, жер асты түйнектөрү, түрдүү курткумурска, кескелдириктер жана майда кемирүүчүлөр менен тамактанышат; жуп-жуп болуп жашашат. Ургаачысы топурактын үстүндөгү чункурчага бир нече жумуртка тууп басып жатат. Тоодак (92-сүрөт) сейрек кездешүүчү канаттуу иретинде “Өзбекстан Республикасынын Кызыл китебине” киргизилген.

Төө күш сымалдар түркүмү. Төө күштар – эң ири канаттуулар, канаттары учууга ылайыкташпаган; күш жүндөрү желпүүрдү түзбөйт; төшүнүн кыры жок. Күчтүү жана узун буттары жардамында тез чуркайт. Буттары эки манжалуу. Таманы калың тери менен капиталгандыктан, ысык күмдө да күйбөйт. Жапайы өсүмдүктөрдүн уруктары, ири курткумурскалар менен тамактанат. Африка төө күшүнүн бою 3 м ге, салмагы 100 кг га барат. Саатына 60–70 км ылдамдык менен чуркай алат. Төө күштар Африка талааларында чакан үйүр болуп жашайт. Эркечи түмшугу менен жерди оюп, уя салат. Ургаачысы уяга 4–9 жумуртка тууйт. Жумурткаларынын салмагы 1,5 кг га жетет. Жумурткаларын күндүзү ургаачысы, түнкүсүн эркеги басат. Ургаачысынын күш жүндөрү боз-күрөн түстө, чөл пейзажында алыстан көзгө урунбайт. Эркек төө күштүн күш жүндөрү кара, күйругу менен канаттарынын учунда ак күш жүндөрү бар. Төө күштардан Африка төө күшу Африкада, Түштүк Америкада нанду жана Австралияда эму тараалган.



1. Оазистерде кандай канаттуулар көп кездешет?
2. Чабалекей аба чөйрөсүнө кандай ылайыкташкан?
3. Чымчык сымалдар кандай пайда келтиришет?
4. Чөл жана талаа канаттуулары чөйрөгө кандай ыңайлашкан?
5. Тоодактар кандай жашашат?



1. Чымчык сымалдардын эркеги:
а) буттары узун, канаттары түстүү;
б) ири жана түстүү, сайрайт;
в) таажысы бар, тез чуркайт.
3. Африка төө күштәрү:
а) чоң үйүр болуп жашайт;
2. Чабалекей үйлөрдүн шыптарына:
а) уя салат;
б) конуп эс алат;
в) конуп сайрайт.
б) жуп-жуп болуп жашайт;
в) чакан үйүр болуп жашайт.



Канаттуулардын аттары менен аларга мүнөздүү болгон өзгөчөлүктөрүн жуптап жаз.

- а) чабалекей;
- б) бактек;
- в) чар карга;
- г) кара чыйырчык;
- д) көк көгүчкөн;
- е) тоодак;
- ё) Африка төө күшү.
- 1) жыл бою 5 жолу жөжө чыгарат;
- 2) "Кызыл китең"ке киргизилген;
- 3) үйлөрдүн шыптарына уя салат;
- 4) буттары эки манжалуу;
- 5) табылгасын абада кармайт;
- 6) мөмөлөргө бир аз зыян келтириет.
- 7) таандар менен үйүр түзөт.

Сөздүк дептерине жазып ал.

Чымчык сымалдар, чабалекей, таан, ала карга, чар карга, кара чыйырчык, көгүчкөн, тоодак, Африка төө күшү, эму, нанду.

Суроого жооп тап. 1. Эмне себептен торгой, кыргоол, тоодак жана төө күш жерге, ал эми таранчы, чыйырчык жана каргалар болсо дарактын бутактарына ин курат? 2. Эмне себептен акыркы жылдарда чабалекейлер шаарларыбызда аз ин куруп калды?

Төмөнкү табышмактарда кайсы канаттуулар жөнүндө маалымат берилген?

- | | |
|--|---|
| 47. Зуу-зуу барат,
Шыптан карайт. | 48. Атлас сымал канаты,
Жакшы кабар – адаты. |
| Ылай-чөп чокуйт,
Себетин токуйт. | 49. Гүлгө шыктуу түрү бар,
Кубулжуган үнү бар. |
| 50. Шыпта турат көндөйлүү таш,
Көндөйдө бар түксүз баш. | |

Туура жооптор: 1б, 2а, 3в.


Туура жуптуктар: а-5, б-1, в-7, г-6, д-3, е-2, ё-4.

47-§

Суу жана жээк канаттуулары

Суу канаттуулары. Суу канаттуулары жашоосунун негизги бөлүгүн сууда сүзүп өткөрүштөт. Алардын манжаларынын арасына жаргакчалар тартылган; буттары бир аз арт жакта жайлашкан. Канаттуулардын күш жүндөрү менен тыбыттары жыш жайлашып, суу өткөрбөй турган катмарды түзөт. Канаттуулар чычан бездери

бөлүп чыгарған май сымал суюктукту түмшугу менен кысып алып, күш жұндөрүнө сұртүп турушат. Бул суюктук күш жұндөргө сууну жуктурбайт; аларды серпилгич жана ийилгич кылат. Сууда жашаган канаттуулардың көпчүлүгү сууда жакшы сүзүшөт жана чумкушат, тамагын да суудан табышат. Суу канаттуулары кургактықта жай жана олдоксон басышат.



Каз сымалдар түркүмү. Бул түркүмгө өрдөктөр, кездар жана ак қуулар кирет (93-сүрөт). Алардын түмшугунун четтеринде ар түрдүү формадагы мүйүздүү пластинкалар жайлышкан, түмшугунун учу болсо жазы тарткан. Каз сымалдардың жумуртқадан чыккан балапандары ургаачысынын артынан ээрчиp жүрүшөт.

Өрдөктөр суу түбүндөгү ылайды түмшугундагы мүйүз пластинкалар аркылуу сыздырып өткөрүп, майда жаныбарлар менен өсүмдүктөрдү кармап калат. Орто Азиянын сууларында *кайырма*, *чүрөк* жана *суксурлар* кездешет. Кайырманын эркегинин башы кочкул жашыл, мойну ак, соносунун түмшугу кызғылтым, куйругу ағыш болот. Алар күзүндө кыштоочу жерлерине учуп өтө баштайт. Азиянын түштүгүндө, Түндүк Африкада, Борбордук Америкада, өлкөбүздүн түштүгүндөгү сууларда кышташат. Эрте жазда дарыя боюндагы камыштардын, калың чөптөрдүн арасына уя салышат. Кайырма, чүрөк жана башка өрдөк сымал канаттууларга аң ууланат. Кайырмалар бакма өрдөктөрдүн теги саналат.

Каздар өрдөктөргө караганда чонураак; эркеги менен ургаачысынын түсү бирдей болот. Алар өсүмдүктөр менен тамактанышат. Күчтүү түмшугунун четинде күрч мүйүз пластинкалары жардамында өсүмдүктөрдү кыркып алып жейт. Өзбекстанда бакма

каздардын теги болгон боз *каздар* уя салып, балапандарын чыгарышат. Бул канаттуу Амударыянын жээктери менен Зерафшан дарыясынын төмөнкү агымында кездешет. Европанын, Тұндук Африканын, Тұштүк-Чыгыш Азиянын жана Орто Азиянын сууларында кышташат. Каздарга эти үчүн аң уланат.

П и н г в и н д е р т ү р к ү м ү. Канаттары кыска жана ичке, сүзгүч калакка айланган. Буттары тулку боюнун арт жагына бириккендиктен, жерде тик турушат. Калак сымал канаттары жардамында саатына 30 км ылдамдык менен чумкүй алат. Пингвиндер Антарктида, Тынч океан аралдары, Австралия, Тұштүк Америка жана Африканын жээктеринде тараалған. Балық жана рак сымалдар менен тамактанат. Кәэ бир түрлөрүнүн, мисалы, *император пингвининин* бою 120 см, салмагы 45 кг келет. Колония болуп уя салат. Суукка өтө чыдамдуу. Император пингвини 60–70°C суукта да жумуртка тууп, балапан чыгарат.

Жээк канаттуулары. Жээк канаттуулары суулардын тайыз жерлеринен, жээктерден жана саздардан тамактанышат. Көпчүлүгүнүн мойну жана буттары узун болот. Ошондуктан алар тайыз жерлерде жана ылайда жакшы жүрөт; түмшугунун жардамында тамагын алат; бирок сууда сүзө алышпайт.

К у н а с с ы м а л д а р т ү р к ү м ү. Кунастар кыйла ири, буттары жана түмшугу узун күштар. *Ак кунастын* канаттары жазы жана кара. Узун буттары сазда оной аракеттенүү мүмкүнчүлүгүн берет. Ак кунас чоң дарактын бутактарына же эски имараттардын үстүлөрүнө уя салат; бака, чычкан, түрдүү курт-кумурска жана кескелдириктер менен тамактанат. Абдан пайдалуулугу жана саны азайып кеткендиги үчүн корголот



1. Суу канаттууларынын сууга ынгайлашшуу өзгөчөлүгү эмнеде?
2. Эмне себептен алардын күш жүндөрүнө суу жукпайт?
3. Каз сымалдар суудагы ылайдан кантип азық табат?
4. Пингвиндердин тулку бою кандай түзүлгөн?
5. Жээк күштарынын түзүлүшү чөйрөгө кандай ынгайлашкан?
6. Кунастар кандайча жашашат?



- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Пингвиндин буттары: <ol style="list-style-type: none"> a) денесинин арт жагында жайлашкан; b) жоон жана узун болот; c) ичке жана кыска болот. | <ol style="list-style-type: none"> 2. Каздын эркеги жана ургаачысы: <ol style="list-style-type: none"> a) бирдей чондукта; b) бирдей түстө; c) айырмаланбайт. |
|---|---|

3. Кунастардын узун буттары:

- а) тайыз суда бат аракеттенүгө жардам берет;
- б) сазда женил аракеттенүү мүмкүнчүлүгүн берет;
- в) суунун ичкерисине кирип барууга жардам берет.



Канаттуулар менен алардын өзгөчөлүктөрүн жуптап жаз.

- | | |
|----------------|-----------------------------------|
| а) өрдөктөр; | 1) канаты кыска жана ичке; |
| б) каздар; | 2) мүйүз пластинкалары бар; |
| в) пингвиндер; | 3) дарактардын бутагына уя салат; |
| г) кунастар. | 4) ылайды сузуп тамактанат. |

Сөздүк дептериңе жазып ал.

Чычаң бези, мүйүз пластинкалары, боз каз, ак куу, кайырма, чүрөк, сук-сур, император пингвини, ак кунас.



Суроого жооп тап. 1. Кокусунан сууга түшкөн тоок күш жүндөрү нымдалып, денесинин муздашы натыйжасында өлүшү мүмкүн. Ал эми каздар болсо суда жашайт. Каздар суда жашоого кандай ыңгайлашкан? 2. Эмне себептен жаздыктар суу канаттууларынан тыбытынан гана даярдалат?

Табышмак кайсы жаныбарга тиешелүү?

51. Таркылдаган үнү бар,
Жылан жечү түрү бар.


Туура жооптор: 1а, 2б, 3в.

Жуптук жооптор: а-4, б-2, в-1, г-3.

48-§

Жырткыч канаттуулар

Жырткыч күштәр, негизинен, омурткалуу жаныбарлар менен азыктанат. Дене түзүлүшү жана кыймыл-аракети табылганы издең табууга жана кармоого ылайыкташкан. Алсак, узун күрч тырмактарынын учу илгич сымал кайрылган болуп, табылганы кармоого жана өлтүрүүгө ылайыкташкан; кыска күчтүү жана учу ылдый кайрылган түмшүгү табылгасынын этин үзүп алуу мүмкүнчүлүгүн берет (94-сүрөт). Көзү күрч болгондуктан, табылгасын алыштан көрөт. Жырткычтар жуп-жуп болуп жашайт. Ири күштардын жуптугу өмүрү бою сакталат. Дарактарга жана бийик аскаларга уя салышат, жылаңач балапан чыгарышат. Алар күндүзгү жырткыч канаттуулар жана үкүлөр түркүмүнө бөлүнөт.

**94-сүрөт. Жырткыч канаттуулар:**

1 – айры куйрук; 2 – күйкө; 3 – бүркүт; 4 – кыргый; 5 – жору; 6 – сары үкү.

Күндүзгү жырткыч канаттуулар түркүмү. Орто Азиянын аймағында күндүзгү жырткыч канаттуулардан *айры куйрук*, *күйкө*, *жору*, *ылаачын*, *бүркүт*, *карчыга* жана башкалар кездешет.

Айры куйруктар оазистерден, тоо жана талаалардан, кыскасы бардык дарактуу жерлерден кездешет. Учуп бара жаткан айры куйрукту куйругуна карап оной таанууга болот. Айры куйруктар Борбордук Африкада жана Түштүк Азияда кыштайт, март айларында учуп келип, дарактардын бутагына уя салат. Айры куйрук абдан пайдалуу канаттуу, ал бака, кемириүүчү, түрдүү курт-кумурска, ошондой эле күшканалардын күрөндүлөрү жана тарптар менен тамактанат, майда канаттууларды кармап жейт. Ал абада бийик учуп, табылгасын издейт.

Жорулар – өлкөбүздө кездешкен жырткыч канаттуулардын эң ириси. Денесинин узундугу 1,5 м ге, канаттарын жайганда көндиги

3 м ге чейин жетет; салмагы 6–12 кг болуп, башынын алдыңқы бөлүгүндөгү жана мойнундагы күш жұндөрү өтө сейрек. Жоруңу учкан мезгилде жазы жана узун канаттуулардагы ағыш күш жұндөрүн манжага окшотуп жазғанынан таанып билүүгө болот. Жорулар тарп менен тамактанышат. Өрөөндүү жерлердин үстүнөн сааттаң учуп, тарп издешет. Жорулар ири жаныбарларга кол сала алышпайт, анткени алардың тырмактары начар өрчүгөн. Бирок абдан күчтүү, учу кайрылган түмшугу менен алар ири түяктуулардың терисин да үзө алышат.

Көпчүлүк күндүзгү жырткыч канаттуулар зыяндуу кемириүүчүлөрдү, курт-кумурскаларды кырып, айыл чарбасына пайда келтириет. Башкалары ооруга чалдыккан же картайган жаныбарларды жок кылып, башка жаныбарлардың ооруга чалдыгышынын алдын алат, алардың тукумунун жакшырышына жардам берет.

Үкүлөр түркүмү. Үкүлөр – жашоо-тиричилигин түнкүсүн өткөрүүгө ылайыкташкан жырткыч канаттуулар. Аларга түн киргендөн кийин гана аң уулаган жырткычтар: үкүлөр, жапалактар, бабыргандар кирет. Үкүлөрдүн түмшугунун учу кайрылган, тырмактары курч болуп, тириү табылганы кармоо мүмкүнчүлүгүн берет. Алар абдан чоң көздөрүнүн жана балбылдаган караптеринин жардамында түнкү караңғылыкта да майда жандыктарды көрө алат. Өтө сак кулактары угулар-угулмаксан болгон түнкү шыбыртты да уват. Күш жұн катмары күндүзгү жырткыч канаттуулардықынан айырмаланып, көпшөк жана жумшак болот. Ошондуктан алар үн чыгарбай учушат.

Кадимки сары үку – үкүлөрдүн арасынан эң чону. Башынын үстүндө кулакка окшош эки топ күш жұнү тикчийип турат. Ал түрдүү кемириүүчүлөр менен тамактанат, кәэде жөргөмүштөрдү жана айрым майда канаттууларды да кармап жейт.

Бабырган – үкүгө караганда кыйла кичине. Түнкүсүн зым карагай же дарактын кургаган бутагына отуруп алып, табылгасын андыйт. Ал өсүмдүктөргө зыян келтирген конуз, чегиртке жана кемириүүчүлөрдү кырып, абдан чоң пайдасын тийгизет.

Канаттуулардын мааниси. Алар зыянкеч курт-кумурска жана кемириүүчүлөрдү кырып, табияттагы санын чектеп турат. Өздөрү да көпчүлүк жаныбарлар үчүн тамак болот. Алар мөмө жана уруктар менен тамактанып, өсүмдүктөрдүн таралышына жардам берет. Нектарчы канаттуулар гүлдөрдү чандаштырат. Кекилик, кара кур,

kyrgool, өрдөк, каз, бөдөнө, көгүчкөн жана башкаларга эти үчүн өнөр жай көлөмүндө же спорттук усулда аң ууланат. Дениз өрдөгү – гааганын уясына төшөгөн тыбыты женил өнөр жайда пайдалануу үчүн чогултулат. Канаттуулардын кыгы азоттуу жана фосфорлуу заттарга бай жер семирткич эсептелет.

Канаттууларды коргоо алардын тынчын албастыктан жана уяларын бузбастыктан турат. Аларды талааларга үйрөтүү үчүн талаа четине дарак тигилет. Кар көп жааган кыш күндөрүндө майда канаттуулар үчүн бадал жана дарак бутактарынын арасына жем салгычтар орнотулуп, ага дан сээп коюлат.

1. Канаттуулар жырткыч жашоого кандай ылайыкташкан?
2. Айры күйрук кандай күн көрөт?
3. Жору өзүнүн табылгасын кантип табат?
4. Жору кандай күн көрөт?
5. Үкүлөр кандай түзүлгөн?
6. Үкүлөр кантип аң уулашат?
7. Жырткыч канаттуулардын жаратылыштагы мааниси кандай?
8. Канаттуулар адамдын жашоосунда канлай мааниге ээ?



1. Жырткыч канаттуулардын жуптугу:
 - а) бир сезон бою сакталат;
 - б) көбөйүү мезгилинде сакталат;
 - в) өмүр бою сакталат.
2. Үкүлөр түнкүсүн тиричилик кылышат:
 - а) көздөрү чон, карактери кен;
 - б) көздөрү башынын капталдарында;
 - в) денеси жазы, күш жүндөрү жыш жайлышкан.



Жырткычтарды алардын өзгөчөлүктөрү менен жуптап жаз.

- | | |
|-----------------|---------------------------------------|
| а) айры күйрук; | 1) башында эки топ күш жүнү бар; |
| б) жоро; | 2) күйругу айры, дарактарга уя салат; |
| в) сары үкү; | 3) түнкүсүн аң уулайт; |
| г) бабырган. | 4) абада канат сермебестен уча алат. |

Сөздүк дептерине жазып ал.

Жырткыч канаттуулар, күндүзгү жырткычтар, айры күйрук, жору, сары үкү, бабырган.



Суроого жооп тап. Үкүлөр түзүлүшүнүн кайсы өзгөчөлүктөрү аларга тымызын учуу, ар кандай шыбыртты угуу жана түнкүсүн көрүү мүмкүнчүлүгүн берет?

Туура жооптор: 1в, 2а.

Туура жуптуктар: а-2, б-4, в-1, г-3.


49-§

Канаттуулар чарбасы

Бакма канаттуулар породаларынын көп түрдүүлүгү. Айыл чарба продуктуларын өндүрүү максатында бакма канаттуулардан тоок, каз, өрдөк, күрп, кәэде бөдөнө багылат. Алар адамдын керектөөлөрүн канаттандырган сапаттары боюнча бири-биринен өзгөчө породаларга бөлүнөт. Породалар адамдар тарабынан жасалма жол менен алынган жаныбарлар болуп эсептелет.

Тооктор бакма канаттуулардын ичинен эн көп багылат (95-сүрөт). Азыркы тооктун породасы тропик токойлордо жашаган жапайы банкыв тоокторунан келип чыккан. Мындан болжол менен 4500 жыл мурда Байыркы Индияда банкыв тооктору колго үйрөтүлө башталган. Продуктулары боюнча азыркы тооктор эт, эт-жумуртка, жумуртка багытындагы породаларга бөлүнөт. Породалар сырткы көрүнүшү менен да бири-биринен айырмаланат.

95-сүрөт. Бакма тооктордун породалары:
 1 – орус ак тоогу;
 2 – первомайский;
 3 – загорский.



Жумуртка багытындагы породалардан Орус ак тоогу жана Лекгорн багылат. Алар салыштырмалуу кичине, салмагы 1,6–2,4 кг келет, тез жетилет жана ар бир тубар тоок жылына 200–300 дөн же андан да көбүрөөк жумуртка берет. Мынтай тооктор 5–6 айда жумуртка бере баштайт, жумурткалары 50–65 г келет.

Эт-жумуртка багытындагы тооктун породасы (Загорск, Ньюгемпшир, Первомайский) бир кыйла чонураак болуп, салмагы 2,5–4,0 кг га жетет. Жумурткалары майда, түлөгөн доордо (15–20 күн) жумуртка туубайт.

Эт багытындагы тооктордун (Корнуэль, Плимутрок породалары) салмагы 3,0–4,5 кг га жетет, аз жумуртка туўйт. Алар жөжө алуу үчүн гана өстүрүлөт, эки айлык жөжөлөрүнүн салмагы 1,6 кг жана андан жогору болот.

Өрдөктөр. Жапайы кайырма өрдөк мындан 3 000 жыл илгери колго үйрөтүлгөн. Бакма өрдөктүн жумурткасынын даамы анча деле жакшы болбогондуктан, эт алуу максатында өстүрүлөт. Алардын Москва, Пекин, Украина породалары көбөйтүрүлөт. Өрдөктөрдүн эки айлык жөжөсүнүн салмагы 2,6 кг жана андан да көбүрөөк болот.

Каздар. Бакма каздар жапайы боз каздардан келип чыккан. Алар колго үйрөтүүнүн натыйжасында чоңоюп, учуу жөндөмдүүлүгүн жоготушкан. Бакма каздар эт жана мамык тыбыт алуу үчүн өстүрүлөт.

Күрпүтүн породасы Америка материгинде жашаган жапайы күрптөн келип чыккан. Күрпүтүн Америкадагы жергилиттүү эл колго үйрөткөн. Бул канаттуу XVI кылымда Европага алып келинген. Күрп бакма канаттуулардын ичинен эң ириси болуп, салмагы 16 кг га чейин жетет.

Өнөр жайлых канаттуулар чарбасы. Өзбекстанда элди канаттуулар чарбасынын продуктулары менен камсыз кылуу үчүн канаттуулар чарбасы фабрикалары жана асыл тукум заводдору түзүлгөн. Фабрикаларды өндүрүштүк процесстер механизациялаشتырылган. Ар бир фабрикада асыл тукум берүүчү тоок-короз үйүрү жана жумуртка тууй турган канаттуулар цехи, жөжө чыгаруучу (инкубациялык) цехтер, жумуртканын, күштүн этин жана өндүрүштүн калдыктарын иштетүүчү цехтер болот. Эт өндүрүлгөн фабрикаларда, мындан тышкары, эт үчүн багылган же жөжөлөр (бройлер) өстүрүлгөн цехтер болот. Мынтай цехтерде жөжөлөрдүн салмагы 1,4–1,5 кг га жеткенге чейин 60–70 күн багылат. Бройлердин эти жумшак, даамдуу, майы аз болот.

Фабрикада тооктор атайын капастарда сакталып, жем салгычы менен сугаргычы капастан тышта жайлышкан акырчага коюлат. Атайын аппараттар цехтеги температураны, нымдуулукту жана күндүн узундугун жөнгө салып турат. Кышында бөлмөнүн ичине жасалма жарык берилип, күн узайтырылганда тооктор көбүрөөк жумуртка тууйт. Жөжөлөр атайын инкубаторлордо чыгарылат.



1. Тооктун породалары кандай максаттарда багылат?
2. Тооктун кайсы породалары жумуртка багытында өстүрүлөт?
3. Тооктун кайсы породалары эт үчүн өстүрүлөт?
4. Өрдөктөр кандай максаттарда багылат?
5. Каздар кандай максаттарда багылат?
6. Канаттуулар фабрикасында кандай цехтер бар?
7. Бройлерлер кандай чыгарылат?



1. Бройлерлер багылат:
а) жумуртка алуу үчүн;
б) эт алуу үчүн;
в) тыбыт алуу үчүн.

2. Күрпүлөр:
а) Индияда колго үйрөтүтгөн;
б) Америкада колго үйрөтүтгөн;
в) Тропик Африкада үйрөтүлгөн.

Сөздүк дептериңе жазып ал.

Канаттуулар чарбасы, породалар, банкив тооктору, күрптөр, өнөр жайлыханканаттуулар чарбасы, бройлер.

Бул табышмактарда кайсы жаныбардын кулк-мүнөзү чагылдырылган?

52. Кармашууда эки тоок,
Баштарында кызыл жоолук.
54. Эрте таңда үн салат,
Казанга түшсө — таттуу тамак.

53. Кызыл таажы тагынган,
Колго үйрөтүп багылган.
Кыйкырыгы таш жарат,
Кана, муну ким табат?

Туура жооптор: 16, 26.

8.5. СҮТ ЭМҮҮЧУЛӨР КЛАССЫ

Сүт эмүүчүлөр — жогорку түзүлүштөгү жылуу кандуу жаныбарлар. Денеси жүн менен капиталган, кулак калканы, сүт жана тер бездери болот. Эриндери жумашак, баласын сүт менен бағат. Қотчулугу тириү бала тууйт. Баш мээ жарым шарларынын кыртышында жылан издүү бүгүштөрү өрчүгөн.

Сүт эмүүчүлөрдүн түзүлүшүн иттин мисалында үйрөнөбүз.

50-§

Бакма иттин тышкы түзүлүшү, скелети жана булчундары

Тышкы түзүлүшү. Сүт эмүүчүлөрдүн буттары адатта кыйла күчтүү жана узун болуп, денесинин астында жайлашкан. Ошондуктан алардын денеси жерден тик көтөрүлүп турат. Ит жүргөндө манжаларына таянат. Башы кыймылдуу моюн аркылуу денесине бириккен. Сүт эмүүчүлөрдө үчүнчү кабак өрчүбөгөн, сүт эмүүчүлөрдүн сырткы кулагы жана кулак калканы өрчүгөн. Иттердин кулак калканы кыймылдуу келет.


Жүн каптоосу. Териси жүн менен капиталган болот. Жүн каптоосу эки катмардан турат. Сырткы катмары узун жана ийилгич, бирок

орой кылкан жұндөрдөн, асткы катмары кыска жана жумшак жұндөрдөн – тыбыттан түзүлгөн. Жумшак жұндөрдүн арасында аба көп болот жана жаныбардын денесинде температураны жакшы сактайт. Орой кылкан жұндөр болсо тыбыттар менен бирге терини коргоп турат. Сүт эмүүчүлөрдүн денесинде туюу милдетин аткарған ири жана узун кылдары да бар.

Көпчүлүгүнүн терисинде тер бездери бар. Бездер ысық абада дene температурасын туруктуу сактоо, кошумча бөлүп чыгаруу органдынын милдетин аткарат. Ысық абада бездер аркылуу бөлүнүп чыккан тер жаныбардын денесин муздатуу менен бирге организмден артык баш түздарды чыгарат. Иттин терисинде тер бездери болбондуктан алардын денеси дем алуу аркылуу муздайт. Ошондуктан иттер ысыкта оозун ачып, бат-бат дем алат.

Сүт эмүүчүлөрдүн манжаларынын учунда мүйүз тырмактары же түяктары болот. Кәэ бир жаныбарлардын башында (бодо малдар, кериктер, антилопалар) мүйүз заттар жакшы өрчүтөн.

Скелети. Сүт эмүүчүлөрдүн скелети баш сөөк, омуртка тутуму, көкүрөк клеткасы, алдыңқы жана арткы буттардан жана алардын курчоолорунан турат (96-сүрөт). Сүт эмүүчүлөрдүн баш мәсси кыйла күчтүү өрчүгөндүктөн баш сөөк кутусу да башка омурткалару жаныбарлардына караганда чоң болот. Омуртка тутуму моюн, арка, бел, куймулчак жана күйрүк бөлүктөрүнөн турат. Моюн бөлүгү 7 омурткадан турат. Арка омурткалары 12–15 болуп, алар кабыргалар жана төш сөөгү менен биргеликте көкүрөк клеткасын түзөт. Бел омурткалары өз ара кыймылдуу бириккендиктен жаныбарлардын денеси белинен бүгүлүшү мүмкүн. Куймулчак бөлүгүндөгү




96-сүрөт. Иттин скелети:

- 1 – баш сөөгү; 2 – моюн омурткалары; 3 – арка омурткалары; 4 – бел омурткалары; 5 – жамбаш сөөктөрү; 6 – күйрүк омурткалары; 7 – кашка жилик; 8 – балдак сөөк; 9 – жото жилик; 10 – шыйбылчактын сөөктөрү манжа сөөктөрү менен; 11 – далы; 12 – күн жилик; 13 – кары жилик; 14 – укуруук сөөк; 15 – кабыргалар.

3–4 омуртка жамбаш сөөктөрү менен кошуулуп кеткен. Куйрук омурткаларынын саны (үчтөн бир нече онго чейин) куйруктун узундугунаң көз каранды.

Бут скелети алдыңкы бут курчоо сөөктөрү эки далынын мүрү сөөктөрү менен кошуулушунан жана эки ақыректен турат. Иттин ақырек сөөктөрү өрчүбөгөн. Арткы буттарынын курчоосу, башкacha айтканда жамбаш 3 жуп жамбаш сөөктөрүнөн турат.

Тиштери түрдүүчө түзүлгөн. Жаактарынын алдыңкы бөлүгүндө шынаа сымал кашка тиштери, алардан аркараакта конус сымал ири кылкыйма тиштери, ооз көндөйүнүн эки каптал жагында жапыз азуу тиштери жайлашкан. Иттин жана башка жырткыч жаныбарлардын кашка тиштери кыйла майда, кылкыйма тиштери жана алардын жанындагы жырткыч тиштери күчтүү өрчүгөн (97-сүрөт). Тиштердин түзүлүшү аткарған милдетинен көз каранды. Тиштер жаактардын чункурларында жайлашкан.



97-сүрөт. Иттин баш сөөгү жана жаак булчундары:

1 – бет жаагы; 2 – баш чарасы; 3 – үстүнкү жаагы; 4 – астынкы жаагы; 5 – кашка тиштери; 6 – кылкыйма тиштери; 7 – жырткыч тиши; 8 – азуу тиштери; 9 – көз чанагы; 10 – чайнаткыч булчундары.

Булчундары. Сүт эмүүчүлөрдүн булчундары ар түрдүү. Көпчүлүгүнүн арка булчундары, кол жана бут булчундары, кол жана бут курчоосунун булчундары күчтүү өрчүгөн. Иттин астынкы жаагын кыймылга келтирген булчундары да жакшы өрчүгөн.



1. Сүт эмүүчүлөрдүн жүн каптоосу кандай түзүлгөн?
2. Тер бездері кандай милдет аткарат?
3. Сүт эмүүчүлөрдүн скелети кандай бөлүктөрдөн турат?
4. Омуртка тутуму кандай түзүлгөн?
5. Буттарынын скелети кандай түзүлгөн?
6. Сүт эмүүчүлөрдүн тиштери кандай түрлөргө бөлүнөт?



1. Сүт әмүүчүлөрдүн буттары:
 - а) денесинин астында тик жайлашкан;
 - б) денесинин капиталдарында жайлашкан;
 - в) көкүрөгүнөн аркараакта жайлашкан.
2. Сүт әмүүчүлөрдүн манжаларының учунда:
 - а) сөөк түяк же тырмактар болот;
 - б) жумшак жаздықчалары бар;
 - в) мүйүз тырмактар же түяктар болот.



Тиштерди жана аларга мүнөздүү өзгөчөлүктөрдү жуптап жаз.

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> а) кашпа; б) кылкыйма; в) азу. | <ol style="list-style-type: none"> 1) конус сымал; 2) жапыз; 3) шынаа сымал. |
|--|---|

Сөздүк дептеринде жазып ал.

Сыртык кулак, кулак раковинасы, мұры сөөк, кашка тиштер, кылкыйма тиштер, азу тиштер.



Суроого жооп тап. 1. Эмне себептен ысык абада ит тилин саландатып, шилекейин ағызып турат? 2. Жатып эс алган ит денеси менен буттарын бүгүп алат. Мынданай жагдай анын түзүлүшүнүн кайсы өзгөчөлүктөрү менен байланыштуу?


Туура жооптор: 1а, 2б.

Туура жуптуктар: а-3, б-1, в-2.

51-§

Иттин ички тұзулышу

Тамак сицириүү системасы. Тамак сицириүү органдары ооз көндөйү, кулкун, кызыл өнгөч, карын, ичке, жоон жана тұз ичегилерден турат (98-сүрөт). Иттин ооз көндөйүндө тиштери жана тили жайлашкан. Тили жардамында ал тамактын даамын түят. Ооз көндөйүндөгү шилекей бездеринен чыккан шилекей азыкты нымдап турат. Ит тили менен азыкты шилекейге аралаштырат. Ооздо майдаланган азык зат карындын зили менен аралашып, бир аз бөлүгү сиңет жана ичегиге өтөт. Ичегиде тамак ичеги жана уйку бездеринен чыккан тамак сицириүү зили менен боордон чыккан өт суюктугунун таасиринде сицириледет. Азыктын сицирилбеген бөлүгү жоон ичегиге түшөт; ал жерден тұз ичеги жана аналдық тешик аркылуу чыгып кетет (98-сүрөт).




98-сүрөт. Иттин тамак синирүү, дем алуу жана болуп чыгаруу системасы:

- 1 – ооз көндөйү; 2 – кокосүү;
- 3 – өпкөсүү; 4 – бооруу;
- 5 – бөйрөгүү; 6 – түз ичегиси;
- 7 – боор эти (диафрагма);
- 8 – карыны;
- 9 – уйку бези;
- 10 – ичке ичегиси;
- 11 – сокур ичегиси;
- 12 – жоон ичегиси;
- 13 – табарсыгы.

Дем алуу системасы. Аба мурун көндөйү, кулкун, коко (трахея) жана бронхтор аркылуу көкүрөк клеткасындагы өпкөгө кирет. Көкүрөк клеткасы диафрагма жаргакчысы аркылуу курсак бөлүгүнөн бөлүңгөн. Дем алганда кабыргалар көтөрүлүп, диафрагма курсак көндөйүнө сүрүлөт. Мында көкүрөк клеткасынын көлөмү чоңоюп, атмосфералык басым таасиринде аба өпкөгө атып кирет. Дем чыгарылганда кабыргалар кайра түшүп, диафрагманын күмбөз сымал көкүрөк клеткасына көтөрүлүшү натыйжасында көкүрөк клеткасы тараыйп, аба өпкөдөн чыгат.

Кан айлануу системасы. Жүрөгү төрт камералуу болуп, эки карынчадан жана эки дүлөйдөн турат (99-сүрөт). Кан айлануунун



99-Иттин кан айлануу системасы жана жүрөгүнүн түзүлүшү:

- 1 – кан айлануунун кичине тегереги;
- 2 – кан айлануунун чон тегереги;
- 3 – жүрөгү;
- 4 – он дүлөйү;
- 5 – он карынча;
- 6 – толтосуу;
- 7 – өпкө артериясы;
- 8 – өпкө венасы;
- 9 – сол дүлөйү;
- 10 – сол карынча.


Эки тегереги бар: чоң жана кичине. Сүт эмүүчүлөр да канаттуулар сыйктуу жылуу кандуу жаныбарлар. Алардын артериялык каны веналык канынан толугу менен бөлүнгөн.

Бөлүп чыгаруу системасы. Бөлүп чыгаруу органдары курсак көндөйүндөгү бел омурткаларынын эки капталындағы буурчак сымал жуп бөйрөктөн турат. Бөйрөктөрдө пайда болгон сийдик эки сийдик жолу аркылуу табарсыкка төгүлөт. Сийдик табарсыктагы чыгаруу түтүгү аркылуу сыртка чыгарып жиберилет.

Дем алуу жана кан айлануу системалары жакшы өрчүгөндүктөн сүт эмүүчүлөрдүн денесинде зат алмашуу тез жүрөт. Алар да канаттуулар сыйктуу дene температурасы туруктуу, жылуу кандуу жаныбарлар. Бирок алардын дene температурасы канаттуулардыкына караңдана бир нече градус төмөн. Иттин денесинин температурасы орточо $37\text{--}38^{\circ}\text{C}$ ка тен.

Баш мээси да башка омурткалуу жаныбарлардыкы сыйктуу беш бөлүктөн турат (100-сүрөт). Бирок алдыңкы мээнин чоң жарым шарлары кыйла татаал түзүлгөн болуп, алардын кыртышы бүгүштөрдү — бырыштарды пайда кылат. Бырыштар канчалык көп болсо, мээнин кыртышында ошончо көп клеткалар болот. Жаныбардын жашоо-тиричилигинде пайда болгон түркүн-түмөн шарттуу рефлекстер мээ кыртышынын иш-аракетинен көз каранды.

Сезүү органдары. Жыт билүү, угуу, көрүү, даам татуу, туюу органдары болот. Бирок сезүү органдары түрдүү жаныбарларда түрдүүчө өрчүгөн. Кургакта жашаган жаныбарлар жытты жакшы ажыратышат. Жаныбарлар жыт аркылуу өзүнүн түрүндөгү башка жаныбарларды, балдарын, жынысын, табылгасын же душманын ажыратада алат. Ар дайым сууда жашаган дельфиндер жана киттер жытты жакшы сезишпейт, бирок табылгасынын жытын бат андышат. Топуракта жашаган момолойдун көзү жумук болот.



100-сүрөт. Иттин мэсинин түзүлүшү:

- 1 – чоң жарым шарлар;
- 2 – мээнин кобулдары;
- 3 – каракуш мэеси;
- 4 – сүйрү мээ.

Сүт эмүүчүлөрдү угуу органдарынын ички, ортоңку жана сырткы бөлүктөрү болот. Сырткы кулак калкан жана үн өткөрүүчү жолдон турат. Кулактын калканы үндү күчтөтүгө, анын багытын аныктоого жардам берет. Көрүү органдары күштарга караганда начар өрчүгөн. Бирок алардын көздөрү нерселердин формасын жакши ылгайт. Маймылдар жана адамдар нерселердин түсүн канаттууларга карағанда жакши баамдашат.

Сүт эмүүчүлөрдүн териси туую милдетин да аткарат. Жаныбарлар терисинде ооруну, температуралы, нерселердин абалын (суюк, каттуу, жумшак) сезген туую органдары жайлашкан. Дененин түрдүү жерлериндеги узун жана жоон кылдар да туую органдары саналат. Мындай кылдар көбүнесе таноолордун жана көздөрдүн алдында жайлашканыктан «муруттар» деп да аталат.



1. Тамак синириүү системасы кандай бөлүктөрдөн турат?
2. Сүт эмүүчүлөр кандай дем алат?
3. Кан айлануу системасы кандай түзүлгөн?
4. Бөлүп чыгаруу системасы кандай түзүлгөн?
5. Сүт эмүүчүлөрдүн баш мээси кандай түзүлгөн?
6. Сүт эмүүчүлөрдүн кайсы сезүү органдары өрчүгөн?



1. Ооз көндөйүндө азық зат:
 - а) шилекей менен аралашат, синирилет;
 - б) майдаланат, майлар эмүлсияланат;
 - в) шилекей менен аралашат.
2. Сүт эмүүчүлөр канаттууларга караганда:
 - а) нерселердин формасын жакши ылгайт;
 - б) жакынкы нерселерди жакши көрөт;
 - в) алыскы нерселерди жакши көрөт.



Баш мээнин бөлүктөрүн функциясы менен жуптап жаз.

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| а) чон жарым шарлар; | 1) татаал кыймылдарды башкарат; |
| б) каракүш мээ. | 2) шарттуу рефлекс пайды кылат. |

Сөздүк дептериңе жазып ал.

Тамак синириүү зили, шилекей, курсак диафрагмасы, сийик жолу, баш мээнин чон жарым шарлары, туую.



Суроого жооп тап. Сүт эмүүчүлөр кыймыл-аракетинин татаалдашуусу алар түзүлүшүнүн кайсы өзгөчөлүктөрү менен байланыштуу?

Туура жооптор: 1в, 2а.

Жуптук жооптор: а-2, б-1.


52-§

**Сүт эмүүчүлөрдүн көбөйшү,
өрчүшү жана келип чыгышы**

Көбөйшү. Көпчүлүгүнүн жумуртка клеткалары абдан кичине, сарысы аз болот. Жумуртка клеткалары жумурткалыкта жетилет; кийин жумуртка тұтұгүнө түшүп, уруктанат. Уруктанган жумуртка клеткасы жумуртка тұтұгүндө өрчүй баштайт. Сүт эмүүчүлөрдүн эмбриону баштықчага окшош атайдын орган – жатында өрчүйт. Эмбрион жатынга түшкөндөн кийин анын бетине жабышат. Төмөн түзүлүштөгү сүт эмүүчүлөрдүн жатыны болбойт; алардын уруктанган жумурткасы тышкы чөйрөдө өрчүйт.

Өрчүшү. Жатында өрчүгөн эмбрионго түйүлдүк дейилет. Түйүлдүк *тон* аркылуу жатындын бети менен байланышат. Жатын кан тамырлары киндик аркылуу түйүлдүк тонуна келген кан тамырларга тиип турат (101-сүрөт). Азық зат жана кычкылтек түйүлдүк тону аркылуу эненин канынан түйүлдүктүн канына өтөт; зат алмашуунун керексиз продуктулары түйүлдүктүн канынан эненин канына чыгарып жиберилет.

Түйүлдүктүн эненин курсагында өрчүү дооруна бооздук дейилет. Бооздук бир нече аптадан бир жылга чейин, кәэде андан да көпкө созулат. Бооздуктун мөөнөтү жана түйүлдүктүн саны жаныбарлардын жашоо-тиричилигинен көз каранды. Дарактардын көндөйүндө, ийиндерде жана башка далдоо жерлерде тууган жаныбарлардын бооздук доору кыска болуп, алар ондон ашык көздөрү жумук бала туйт. Ачык жерлерде тууган, кыймылдуу жаныбарларда бооздук доору узакка созулат; алар ири, кыила өрчүгөн 1–2 бала туйт; балдары бир нече saatтан кийин энесинин артынан ээрчий турган



101-сүрөт. Сүт эмүүчүлөрдүн жатындағы түйүлдүгү:

- 1 – түйүлдүк тону;
- 2 – киндик;
- 3 – жатындын булчундуу бети;
- 4 – түйүлдүк;
- 5 – түйүлдүк чели.



102-сүрөт. Жырткыч тиштүү кескелдирик жана анын баш сөөгү.

болот. Чычкандар жылына 5–8 жолу, бодо малдар болсо бир гана жолу тууйт.

Балдарын сүт менен багуу. Сүт эмүүчүлөр балдарын сүт менен бағат. Сүт ургаачы жаныбардын төшү же курсагындагы сүт бездеринде пайда болот. Бездердин тұтұкчөсү әмчектин учун ачылат. Әмчектердин саны жаныбардын тукумчулдуғунан көз каранды. Мисалы, 3–8 күчүк тууган бакма иттердин 8, 1–4 улак тууган әқкилердин 2 әмчеги болот. Сүттүн курамында жаныбарлардын балдары өрчүшү үчүн керектүү болгон бардык заттар: суу, май, углевод, белок, витамин жана минералдык түздар болот.

Сүт эмүүчүлөрдүн келип чыгышы. Сүт эмүүчүлөрдүн бир топ өзгөчөлүктөрү, атап айтканда, скелети, булчундары, тамак синириүү, дем алуу, бөлүп чыгаруу, кан айлануу системаларынын түзүлүшү сойлоп жүрүүчүлөрдүкүнө бир топ окшош келет. Сүт эмүүчүлөрдүн терисинде да сойлоп жүрүүчүлөрдүкүнө окшош кабырчыктары болот. Алардын жүнү да кабырчыктардан келип чыккан. Мындан тышкary, төмөн түзүлүштөгү сүт эмүүчүлөрдүн сойлоп жүрүүчүлөрдүкүнө окшош клоакасы болот; алар тири туубастан, жумуртка тууп көбөйт. Бул далилдер сүт эмүүчүлөр менен сойлоп жүрүүчүлөрдүн ортосундагы тектештиktи көрсөтөт.

Сүт эмүүчүлөрдүн теги мындан 200–300 млн жыл мурда жашаган байыркы жырткыч тиштүү кескелдириктер болгон (102-сүрөт). Окумуштуулар скелеттин калдыктарын текшеришип, алардын буттары сойлоп жүрүүчүлөрдүкү сыйктуу капиталдарында эмес, денесинин астында жайлашкандыгын, тиштери да адистешкенин аныкташкан. Жырткыч тиштүү кескелдириктиң сойлоп жүрүүчүлөрдүкүнө окшош белгилери да болгон. Алар кыска буттары менен жоон жана узун күйруктарын сүйрөп жүрүшкөн.

Климаттын муздашы менен муздак кандуу ири сойлоп жүрүүчүлөр кырылып, ордун жылуу кандуу сүт эмүүчүлөр ээлеген.



1. Кайсы белгилери сойлоп жүрүүчүлөрдүкүнө окшойт?
2. Түйүлдүк тону деген эмнэ?
3. Бооздук деген эмнэ?
4. Кайсы сүт эмүүчүлөрдүн бооздук доору кыска болот?



1. Сүт эмүүчүлөрдүн эмбриону:
 - а) абдан кичине болот;
 - б) жумуртка тұтұғундө өрчүйт;
 - в) жатында өрчүйт.
2. Төмөн сүт эмүүчүлөрдүн уруктанган жумурткасы
 - а) тышкы чейрөдө өрчүйт;
 - б) жумуртка тұтұғундө өрчүйт;
 - в) жатындын бетинде өрчүйт.
3. Сүт эмүүчүлөрдүн сүт бездері:
 - а) ургаачы жаныбардың төш бөлүгүндө болот;
 - б) ургаачы жаныбардың төш же курсак бөлүгүндө болот;
 - в) ургаачы жаныбардың курсак бөлүгүндө болот.

Сөздүк дептерине жазып ал.

Жатын, түйүлдүк, түйүлдүк тону, бооздук, сүт бездері, жыртқыч тишиң кескелдирик.




Суроого жооп тап. Сүт эмүүчүлөрдүн байыркы сойлоп жүрүүчүлөрдөн келип чыккандығын кантип далилдөөгө болот?

Туура жооптор: 1в, 2а, 3б.

53-§ Сүт эмүүчүлөрдүн түрлөрү: жумуртка туучулар, баштыкчалуулар, тондуулар

Сүт эмүүчүлөр түзүлүү, көбөйүү жана баласынын өрчүү өзгөчөлүктөрүнө карай жумуртка туучулар, баштыкчалуулар жана тондуулар топторуна бөлүнөт.

Жумуртка туучулар, же клоакалуулар балдарын тирүү туубастан жумуртка тууп көбөйөт. Сүт бездеринин өрчүгөндүгү, денесинин жүн же кыл менен капиталгандығы менен алар сүт эмүүчүлөргө окшойт. Бирок аларда чыныгы сүт эмүүчүлөр үчүн мүнөздүү белгилер начар өрчүгөн. Алсак, мәэси башка сүт эмүүчүлөрдүкүнө караганда кыйла жөнөкөй түзүлүштө, эмчектери өрчүбөгөн, денесинин температурасы төмөнүрөөк (26° тан 36° ка чейин) болот. Алардын түзүлүшүндө сойлоп жүрүүчүлөргө мүнөздүү бир топ өзгөчөлүктөр (мисалы, клоаканын болушу, жумуртка тууп көбөйүшү) бар. Жумуртка туучу



103-сүрөт. Жумуртка туучу сүт эмүүчүлөр:
1 – өрдөк тумшук; 2 – ехидна.

сүт эмүүчүлөргө өрдөк тумшук жана ехидналар кирет (103-сүрөт). Алар Австралия материгинде жана ага жакын аралдарда тараалган.

Өрдөк тумшуктун өрдөктүкүнө окшош жазы, узун мүйүз тумшугу бар. Денеси жүн менен капиталган. Ал дарыянын жээктөрингеди уясында жашайт. Бут манжаларынын арасындагы сүзгүч жаргакчалары жардамында жакшы сүзөт. Өрдөк тумшук жумуртка тууп, басып жатат. Бирок жумурткадан чыккан балдарын сүтү менен багат. Үрпесү болбогондуктан сүтү сүт бездеринен жүнүнүн сыртына агып чыгат, балдары сүттү жалашып азыктанышат.

Ехидна – көрүнүшү кирпиге окшош жаныбар. Денеси узун кылдар менен капиталган. Ургаачысы бир жумуртка тууп, аны курсагындагы баштыкчасында алып жүрөт. Анын баласы да энесинин курсак терисинин үстүнө агып чыккан сүттү жалайт.



104-сүрөт. Баштыкчалуулар сүт эмүүчүлөр:
1 – кенгуру; 2 – баштыкчалуу чычкан; 3 – коала.

Баштыкчалуулар жумуртка туучуларга караганда бир топ татаал түзүлгөн. Алар баланы тириү туушат; клоакасы болбойт. Эмчектери өрчүгөн, дene температурысы салыштырмалуу жорогу (37°C ка чейин), жатыны өрчүбөгөн же өтө күчсүз өрчүгөн. Ошондуктан жаңы туулган балдары абдан кичине жана алсыз болот. Мисалы, бою 2 м келген кенгуру баласынын узундугу болгону 3 см гана келет. Ургаачысы жаңы туулган баласын кыйла убакытка курсак баштыкчасында алып жүрөт (104-сүрөт).

Баштыкчалуулар Австралия материгинде жана ага жакын жаткан аралдарда, айрым түрлөрү Борбордук жана Түштүк Америкада жашайт. Алардын 270 ке жакын түрү белгилүү. Алардан кенгуру, коала, баштыкчалуу чычкан, баштыкчалуу карышкырлар көпчүлүккө белгилүү. Кенгуру узун жана күчтүү арткы буттары менен секирип аракеттенет, алдыңкы буттарынын жардамында чөптөрдү, чөп-чардан турган тамагын оозуна салат.

Тондуулар жумуртка туучуларга жана баштыкчалууларга караганда кыйла жогору түзүлгөн. Алардын уруктанган жумурткасы ургаачысынын жатынында өрчүйт. Тондуулар майда чычкандан тартып алп пилдерге чейин түрдүү сүт эмүүчүлөрдү, ошонун катарында дээрлик бардык бакма айбандарды өз ичине алат.

1. Жумуртка туучулар кандай түзүлгөн?
2. Өрдөк тумшук кандай күн көрөт?
3. Баштыкчалуулар кандай түзүлгөн?
4. Жумуртка туучулар, баштыкчалуулар каерлерде тараалган?
5. Тондууларга мүнөздүү болгон өзгөчөлүктөр кайсылар?



1. Ехиднанын баласы:
 - а) жүнүнө илешип жашайт;
 - б) сүт бездеринен ағып чыккан сүттү жалайт;
 - в) сүт бездеринин үрпүсүн эмет.
2. Өрдөк тумшуктун тумшугу:
 - а) узун жана ички;
 - б) узун жана жазы;
 - в) узун жана жоон.



- Жаныбарлар менен алардын өзгөчөлүктөрүн жуптап жаз.
- | | |
|------------------|--------------------------------|
| а) ехидна; | 1) абдан кичине бала тууйт; |
| б) өрдөк тумшук; | 2) жумурткасын баштыкчалуулар; |
| в) кенгуру. | 3) жумурткасын басып жатат. |

Сөздүк дептеринде жазып ал.

Өрдөк тумшук, ехидна, кенгуру, баштыкчалуулар, жумуртка туучулар, тондуулар.



Суроого жооп тап. Эмне себептен жумуртка туучу жана баштыкчалуу сүт эмүүчүлөр Австралия жана Түштүк Америка материктегинде гана тараалган?

Табышмакты тап жана анда келтирилген маалыматтарды түшүндүрүп бер.

55. Тикен тондуу делден кулак,
Устү боз да, асты ак.


Туура жооптор: 1б, 2в.

Жуптук жооптор: а-2, б-3, в-1.

54-§

Колканаттар жана кемирүүчүлөр түркүмдөрү

Колканаттар түркүмү. Колканаттар – учууга ылайыкташкан сүт эмүүчүлөр. Алдыңкы буттары өзгөрүп канатка айланган (105-сүрөт). Алдыңкы бут сөөктөрүнүн аралыгына жана арткы буттары менен денесинин капиталдары ортосуна жука тери жаргакча тартылган. Бул жаргакча жаныбар учканда көтөрүү бетин пайда кылат. Бирок алдыңкы буттарынын биринчи манжасы менен арткы буттарынын манжалары эркин болот. Алар конгондо бул манжалары менен үнкүрдүн керегесине, даректарга жармашып алат же аларга акырындык менен чырмашып чыгат.



105-сүрөт. Колканаттар:

- 1 – сары жарганат; 2 – така тумшук жарганат; 3 – дардагай сары жарганат;
- 4 – кадимки түнчүл жарганат; 5 – чоң жарганат.

Жарганаттардын көздөрү сокур болуп, жакшы көрө алышпайт. Бирок алар түнкүсүн да эч нерсеге урунбай, уча алышат; курт-кумурскаларды оозу менен кармат алат. Мейкиндикте болжол алуу өзгөчөлүгү алардын ультра үндү таратышы жана аны кайра кабыл алышы менен байланыштуу. Абадагы жаныбар мурду жана оозунан бөлүп-бөлүп ультра үн чыгарат. Үн анын жолундагы нерседен жаңырык сыйктуу кайтат. Кулагы ошол кайткан үн толкундарын кабыл алышы натыйжасында табылгасын издең табат же тоскоолду сезет. Кан соруучу жана зыянкеч курт-кумурскаларды кырып, пайды келтириет. Жарганаттарды эл жашаган пункттарга үйүр алдыруу үчүн далдоо жерлерди бузbastыгыбыз жана жаны далдоо жерлер жаратуубуз керек.

Кемириүүчүлөр түркүмү. Алардын жырткыч (кылкыима) тиштери болбойт. Кашка тиштери узун жана курч болот. Катуу азыкты курч кашка тиштери менен кесе тиштейт да, азуу тиштери жардамында эзип майдалайт. Алардын кашка тиштери тынымсыз жешилип турат, бирок мокобойт. Анткени кашка тиштеринин арт жагында эмалы жок. Астынкы жана үстүнкү кашка тиштеринин бири-бинине сүрүлүшү натыйжасында тиштер курчуйт. Алар жаныбардын жашоосу бою өсүп турат.

Кемириүүчүлөр – кенири тараалган, көп түрдүү, өтө тукумчул жаныбарлар (106-сүрөт). Көпчүлүк түрлөрү бир жылда бир нече жолу көбөйөт. Ошондуктан кээ бир жылдары алардын саны өтө тез көбөйүп, чоң зыян келтириет. Турак-жайларга жакын жерлерде чычкан, боз келемиштер, чөлдөрдө сары чычкан көп кездешет. Сары чычкан колония болуп, ийиндерде жашайт. Тоо этектеринде жана чөлдөрдө ири кемириүүчүлөрдөн бири – жайра (чүткөр) жашайт. Анын денеси узун ийнелер менен капиталган.

Көпчүлүк кемириүүчүлөр – зыянкеч жаныбарлар. Чычкандар жана келемиштер кампаларда сакталып жаткан дан жана тамак-аш продуктуларын жеп жана өнөр жай товарларын кемирип, чоң зыян келтиришет. Келемиштер өлөт (чума) оорусун да таратышы мүмкүн.

Кемириүүчүлөрдөн пайдалуулары да бар. Ондатра, нутрия, суур, чаар сары чычкан жана тыйын чычкандарга териси үчүн ан ууланат. Ондатра менен нутрия баалуу мех берет. Америка алардын мекени саналат. Республикасында да бул жаныбарлар көбөйтүрүлө турган

**106-сүрөт. Кемириүүчүү сүт эмүүчүлөр:**

- 1 – үй чычканы; 2 – көк суур; 3 – чаар сары чычкан; 4 – сур коён;
5 – боз келемиш; 6 – ондатра.

мех өндүрүлүүчү чарбалар түзүлгөн. Тоолордо көк суур кездешет. Анын териси башка суурлардыкына караганда жогору бааланат; майынан элдик дарыгерликте дары-дармектин ордуна колдонулат. Азыркы күндө алардын саны өтө азайып кеткендиктен көк суур «Кызыл китең»ке киргизилген.



1. Колканаттардын канаты кандай түзүлгөн?
2. Жарганаттар абада кандай болжол алышат?
3. Кемириүүчүлөрдүн тиштери кандай түзүлгөн?
4. Кемириүүчүлөр кандай күн көрүштөн?
5. Кемириүүчүлөр адамдын жашоосунда кандай мааниге ээ?
6. Кайсы кемириүүчүлөр колдо багылат?



1. Колканаттар табылгасын абада:
 - a) алдыңкы буттарынын эркин манжалары менен кармайт;
 - б) арткы буттун манжалары менен кармайт;
 - в) оозунун жардамында кармайт.
2. Кемириүүчүлөрдүн кашка тиштери:
 - а) өсүп жана жешилип турат;
 - б) тынымсыз алмашып турат;
 - в) акырындык менен мокоп барат.



Кемириүүчүлөрдү мүнөздүү өзгөчөлүктөрү менен жуптап жаз.

- а) чычкандар; 1) өлөт оорусун таратат;
- б) келемиштер; 2) «Кызыл китең»ке киргизилген;
- в) ондатра, нутрия; 3) кампа зыянкечтери;
- г) көк суур. 4) баалуу мех берет.

Сөздүк дептерине жазып ал.

Колканаттар, жарганаттар, ультра үндүн жардамында болжол алуу, кемириүүчүлөр, чычкандар, келемиштер, чаар сары чычкандар, ондатра, нутрия, суур.



Суроого жооп тап. 1. Колканаттардын скелети менен булчундарынын түзүлүшүндөгү кайсы өзгөчөлүктөр алардын канаттуулар сыйктуу учушуна жардам берет? 2. Эмне себептен колканаттардын кулак калканы кен болот?

Табышмактарды тап жана аларда келтирилген маалыматтарды түшүндүрүп бер.

- | | |
|--|---|
| 56. Канаты бар, күш эмес,
Сүт эмизет, уй эмес. | 57. Узун күйрүк торпогум,
Тынчтык бербес чоркогум. |
| 58. Узун кулак ким болду?
Жыртык эрин ким болду?
Кышта чечип отурат,
Жайынданагы боз тонду. | Кытыратат түнү-күн,
Соргокпу деп коркомун. |

Туура жооптор: 1в, 2а.

Туура жуптуктар: а-3, б-1, в-4, г-2.

55-§

Жырткыч сүт эмүүчүлөр түркүмү

Карышкыр сымалдар уруусуна карышкыр, чөө, түлкү, корсак жана енот сымал ит кирет (107-сүрөт). Алар жытты жакшы сезет; табылгасын андып жүрүп кармайт. *Карышкырлар* жыл бою жуп-жубу менен жашайт. Күндүзү далдаада жашынып, түнкүсүн ан уулайт. Күчтүү жана шамдагай болгондуктан өзүнөн да чоң жаныбарларга ан уулаши мүмкүн. Алар үй жаныбарларына да кол салышат. Жаныбарларды жегендөн көрө көбүрөөк жара салып, кыраан келтирец. Ошондуктан алардын санынын көбөйүшүнө жол койбостук керек. Ургаачысы 3–4 төн 13 көчейин көзү жумук кызыл эт бөлтүрүк туйт. Бөлтүрүктөр 35–40 күнгө чейин энесин эмет, кийин эркек жана ургаачы карышкыр алып келген эттин бөлүктөрү жана жарадар жаныбарлар менен тамактана башташат. Алар 15 жылга чейин жашашат.

**107-сүрөт. Карышкыр сымалдар:**

1 – енот сымал ит; 2 – чөө; 3 – карышкыр; 4 – тұлқу.


Тұлқу чөл жана талааларда, тоо жана тоо алдыларында, ал турғай айыл жана шаарлардың айланасында жашайт. Жайда тұлқулөр ийиндеринде жашап, 4–5 көзү жумук бачики тууйт. Күзүндө алардың бүлөсү тарап кетет. Жұнұ калың жана жылуу, қышында чәэнге кирбейт. Қемириүүчүлөр жана күрт-кумурскалар менен тамактанып, айыл чарбасына пайда берет. Жай, күз айларында жер-жемиштерди да жей берет. Кәэде бакма канаттууларга да кол салышшат. Тұлқуге анын меки үчүн аң ууланат.

Мышык сымалдар уруусу (108-сүрөт). Алардың ийилиңки келген күрч тырмактары атайдын кабына кирип турат. Табылгасын апчып кармап, кийин тиштери менен жулкушат. Қөпчүлүк мышык сымалдар жытты жакшы сезбейт, бирок абдан мыкты угат. Табылгасын далдаа жерден андып, басып калат. Бул урууга жолборс, гепард, кабылан, сүлөөсүн, илбирс жана мышыктар кирет. **Жолборс** Түштүк Азия жана Ыраакы Чыгышта тараалган; донуз, бугу сыйктуу ири жаныбарларга аң уулайт. Өзбекстандың дарыя өрөөндөрүндө *жапайы токой мышыгы*, бийик тоолуу аймактарында *илбирс*, *сүлөөсүн* кездешет. Саны өтө азайып кеткендиктен алар «Өзбекстан Республикасынын Кызыл китебине» киргизилген.



1

2



3

4

108-сүрөт. Мышик сымалдар:

1 – жолборс; 2 – арстан; 3 – гепард; 4 – ягуар.

Суусар сымалдар уруусуна таандык жырткычтардын буттары кыска, денеси ичке болуп, жылчыктарга кириүгө ылайыкташкан. Өзбекстанда кашкулак, суусар, кундуз, ач күзөн, ласка жана норка кездешет. *Кашкулактар* токойлуу тоолордо, чытырман токой жана талааларда кездешет. Ийиндерин жарларга жана дөңсөөлөрдүн капталдарына салышат; түнкүсүн ууга чыгышат. Ар түрдүү курт-кумурскалар, кемирүүчүлөр, ошондой эле күбүлгөн мөмөлөр жана өсүмдүктөрдүн жер асты түйнөктөрү менен тамактанышат.

Аюу сымалдар уруусу. Аюулар — күчтүү жана ири жаныбарлар (109-сүрөт). Өзбекстандын тоолорунда *күрөң аюу* кездешет. Ал өсүмдүк тамыр жана ёркүндөрү менен тамактанат, кәэде курт-кумурска жана суурларды кармап жейт, жайында мөмөлөр менен тамактанат. Аюу тамак азайган кыш мезгилиnde чээнге кирет. Арктика муздуктарында *ак аюу* жашайт. Анын салмагы 800 кг келет. Ак аюу суда мыкты сүзөт жана чумкуйт; негизинен тюлендер жана балыктар менен тамактанат.



1



2

109-сүрөт. Аюу сымалдар:

1 – күрөн аюу; 2 – ак аюу.



1. Карышкырлар кандай жашайт?
2. Тұлқұлөр кандай жашайт?
3. Мышык сымалдар табылгасын кандай кармашат?
5. Суусарлардың денеси кандай түзүлгөн?
6. Аюулар кандай жашайт?



- | | |
|---|--|
| 1. Карышкыр табылгасын:
а) далдаа жерде андыйт;
б) жытынан сезип, андыйт;
в) куугунтуктап кармайт.

3. Кашкулак ийинин:
а) дараптардың көндөйүнө жана суунун жәэктерине салат;
б) дөңсөөлөрдүн капиталдарына, жарларга салат;
в) суунун жәэгине жана түздүктөргө салат. | 2. Мышык сымалдар:
а) табылганы андип кармайт;
б) жытты жакшы сезет;
в) табылгасын куугунтуктайт. |
|---|--|



- Жырткыч жана мүнөздүү белгилерин жуптап көрсөт.
- | | |
|--|---|
| а) карышкырлар;
б) тұлқұлөр;
в) мышык сымалдар;
г) суусарлар;
д) аюулар. | 1) буттары кыска, денеси ичке;
2) кышында чәэнге кирет;
3) жыл бою жуп болуп жашайт;
4) кышында ийинге кирбейт;
5) тырмактары кабына кирип турат. |
|--|---|

Сөздүк дептериңе жазып ал.

Карышкырлар, тұлқұлөр, мышык сымалдар, суусар сымалдар, кашкулак, аюу сымалдар, күрөн аюу, ак аюу.



Суроого жооп тап. Эмне себептен ак аюунун кулак калканы күрөн аюунукуна караганда кичине, ал эми жүнү болсо ак болот?

Табышмактарда келтирилген маалыматтар кайсы жаныбарларга тиешелүү?

- | | |
|--|---|
| 59. Көпшөк жүндүү, мурутчан,
Чычкан андип, уулайт ан. | 60. Тилке гүлдүү тону бар,
Киши коркор түрү бар. |
|--|---|

Туура жооптор: 1в, 2а, 3б.

Туура жуптуктар: а-3, б-4, в-5, г-1, д-2.

56-§

Деңиз сүт эмүүчүлөрү: калак буттуулар жана кит сымалдар түркүмдөрү

Калак буттуулар түркүмү. Калак буттуулар – мойну кыска, алдыңкы буттары сүзгүч калакка айланган ири жаныбарлар. Алар көп убактысын сууда өткөрүшөт; эс алуу жана көбөйүү үчүн гана кургакка чыгышат. Аларга тюлень, деңиз мышыгы жана морждор кирет (110-сүрөт). Гренландия тюлени Арктика деңиздеринде жашайт. Кургактыкта калак буттары жардамында сойлоп кыймыл жасайт. Арткы буттары аркага чоюлган болуп, сүзүү үчүн гана кызмат кылат. Денеси орой, кыска жана сейрек жүн менен капталган. Көпчүлүк тюлендердин кулак калканычы болбрайт; балыктар, моллюскалар жана рак сымалдар менен та-мактанат. Кышында тюлендер жээkkе жакын келишип, тегиз муздуукча чыгып алышат. Ургаачылары бирден ири, көздөрү ачык бала тууйт. Тюлендин баласынын териси калың ак тыбыт жүн менен капталган. Тыбыт жүн аны сууктан коргойт жана ак муздун үстүндө байкатпайт. Тыбыт жүндөрү төгүлүп, орой жүн менен алмашкандан кийин баласы сууга түшүп сүзө баштайт.

Деңиз мышыгы Алыскы Чыгыш деңиздеринде жашайт. Жайдын башында алардын үйүрлөрү көбөйүү үчүн арал жээктериине чыгышат. Ургаачысы кара жүн менен капталган бир бала тууйт. Балдары чоңоюп, сүзө баштаганда, алар кайра деңизге кайтат.



110-сүрөт. Калак буттуулар:


1 – Гренландия тюлени; 2 – морж; 3 – түндүк деңиз мышыгы.

Тюлень жана моржго териси жана майы, деңиз мышыгына баалуу териси үчүн аң ууланат. Морждун кылкыйма тиштери пилдин сөөгү сыйактуу жогору бааланат. Алардын саны азайып кеткендиктен азыркы күндө аларга аң уулоого тыюу салынган.

Кит сымалдар түркүмү. Кит сымалдар – таптакыр сууда жашоого өткөн сүт эмүүчүлөр; алар эч качан кургакка чыкпайт; сууда көбөйүштөт. Түзүлүшү сууда жашоонун таасиринде дагы да көбүрөөк өзгөргөн. Алар күйругу жана алдыңкы сүзгүчтөрү жардамында сүзүштөт; арткы сүзгүчтөрү болбайт. Бул түркүмгө киттер, кашалоттор жана дельфиндер кирет (111-сүрөт).

Көк кит – сүт эмүүчүлөрдүн арасынан эң ириси, узундугу 30 м, салмагы 150 т жана андан көп. Тиштери болбайт; майда планктон организмдер, негизинен, рак сымалдар менен азыктанат. Аябай чоң ооз көндөйүндө үстүнкү жаагынан ылдый қарай көптөгөн түп жагы бүгүштүү ийилчээк мүйүз пластиналар – *киттин мурууттары* асылып турат. Кит оозун чоң ачып, ага суу толтуруп алат. Сууну мүйүз пластинкалар аркылуу өткөрүп, ага иләэшип калган жаныбарларды жутат. Суткасына 2–4 т тамак жейт. Көк кит сыйактуу майда жаныбарлар менен тамактанган башка киттер да муруттуу, б. а. *тишсиз киттер* деп аталат.

Тиштүү киттерге болсо *дельфин* жана *кашалоттор* кирет. Алардын ооз көндөйүндө абдан көп конус сымал бирдей түзүлүштөгү тиштери болуп, алар азыкты кармап туруга гана жардам берет. Дельфиндердин узундугу 3 м ге чейин болот. Жемин издең табуу үчүн ультра үндөрдөн пайдаланышат. Баш мээси татаал түзүлгөн.



Өз ара үн сигналдары аркылуу байланышат. Бирөөсү балыктын үйүрүн тапса, башкалары да заматта ошол жерге чогулат. Кырсыкка жолуккан дельфин кооп сигналдары аркылуу башкаларын жардамга чакырат. Аларды колго үйрөтүү оной. Дельфиндерге ан уулоого тыюу салынган.

1. Калак буттуулар сууда жашоого кандайча ылайыкташкан?
2. Тюлень кандай жашайт?
3. Дениз мышыгы кандай жашайт?
4. Кит сымалдар суулуу чөйрөгө кандай ылайыкташкан?
5. Көк кит кандай тамактанат?
6. Дельфиндер кандай жашайт?



1. Калак буттуулар жашоосунун көп бөлүгүн сууда өткөрүшөт:
 - а) тамактануу үчүн гана кургактыкка чыгышат;
 - б) тамактануу жана эс алуу үчүн гана кургактыкка чыгышат;
 - в) эс алуу жана көбөйүү үчүн гана кургактыкка чыгышат.
2. Тишилиз киттер:
 - а) майда рак сымалдар менен тамактанышат;
 - б) ири жаныбарларга кол салышат;
 - в) негизинен балыктар менен тамактанышат.
3. Дельфиндер менен кашалоттор:
 - а) тишилиз киттерге кирет;
 - б) тиштүү киттерге кирет;
 - в) майда рак сымалдар менен тамактанышат.



Жаныбар жана ага мүнөздүү болгон белгилерин жуптап жаз.

- | | |
|----------------|-------------------------------------|
| а) дельфиндер; | 1) эң ири сүт эмүүчү; |
| б) тюлендер; | 2) башы денесинин 1/3 бөлүгүнө тен; |
| в) көк кит; | 3) башы тумшукка окшош созулган; |
| г) кашалоттор; | 4) узун кылкыйма тиши болот; |
| д) морждор. | 5) денеси кыска, жоон кылдуу. |



Сөздүк дептеринде жазып ал.

Калак буттуулар, гренландия тюлени, дениз мышыгы, морж, кит сымалдар, көк кит, кашалот, дельфин.



Суроого жооп тап. Калак буттулардын кулак калканы кургакта жашаган сүт эмүүчүлөргө салыштырмалуу өтө кичинелиги, ал эми кит сымалдарда кулак калканынын таптакыр болбостугу алар жашоосунун кайсы өзгөчөлүктөрү менен байланыштуу?

Туура жооптор: 1в, 2а, 3б.

Жуптук жооптор: а-3, б-5, в-1 г-2, д-4.

57-§

Түяктуу сүт эмүүчүлөр

Ача түяктуулар түркүмү. Ача түяктуулардын манжалары бир же эки жуп болуп, түяктар менен қапталган. Алар кепшөөчүлөр жана кепшебөөчүлөр топторуна бөлүнөт.

Кепшөөчү ача түяктуулар – буттары кыйла узун, карыны төрт камералуу, чөп жечү жаныбарлар (112-сүрөт). Адатта өсүмдүк курамында кыйын сицириле турган клетчатка көп болот. Кепшөөчүлөрдүн кардында жашаган майда микроскоптук жаныбар-



112-сүрөт. Кепшөөчү ача түяктуулар:
1 – жейрен; 2 – жираф; 3 – кулжа; 4 – зубр.

лар – бактериялар менен инфузориялар алардын эришине жардам берет. Ача туяктуулар баштап азыкты жакшы чайнабастан туруп жутат. Азык карында микроорганизмдер таасириде женил синириле турган абалга келет. Мындай азык карындан ооз көндөйүнө кайра чыгарылат жана азуу тиштердин жардамында мыктылап чайналып (кешелип), кайра карынга жутулат.


Кепшөөчүлөргө уй, кой, зубр, бөкөн, жейрен, бугу жана башка көптөгөн ача туяктуулар кирет. Адатта алардын баштарында бир жуптан мүйүзү болот. Бул мүйүздөр жаныбарлардын өмүрү бою өсүп турат. Багыш жана бугу сыйктуу жаныбарлардын мүйүздөрү жылда оошуп, ордуна жаңысы өсүп чыгат.

Жейрен (газель) Өзбекстандын чөлдөрүндө жалгыз, жуп-жуп же 30 га чейин жаныбарлардан турган үйүр болуп жашайт. Ал чөл шарттарына жакшы ылайыкташкан; конур түстө болгондуктан айланы-чөйрөдө көзгө чалдыкпайт.

Жейрендин эти абдан даамдуу болгондуктан, ага аң ууланган. Өзбекстанда жейрендер коруктарда гана сакталып калган. Кепшөөчү ача туяктуулардан бухара бугусу (хангүл) Кызылкум коругунда жана Термезге жакын жердеги Пайгамбар аралында өстүрүлүүдө. Устюрт платосунда бөкөндөр кездешет.

Кепшебөөчү ача туяктуулардын кылкыйма тиштери күчтүү өрчүгөн, карындары камералуу эмес; моюну, буттары жана куйругуу кыска. Аларга донуздар (жапайы чочколор) жана суу айгырлары (бегемоттор) кирет (111-сүрөт).

Донуз кыйла ири жаныбар; денесинин узундугу 280 см ге чейин, салмагы 200–240 кг га барат. Европа жана Азия материкитеринде тарапланган. Өзбекстанда тоолуу район жана чытырман токойлордо кездешет. Өсүмдүк тамырлары менен түйнөктөрүн чукуп алыш жайт;



113-сүрөт. Кепшебөөчү ача туяктуулар:


1 – суу айгыры (бегемот); 2 – 4 – донуздар (2 – эркеги 3 – ургаачысы; 4 – торопою).

күбүлгөн мөмө, курт-кумурска жана башка майдың жандыктар менен азыктанат. Ўйр болуп жашайт. Торопою чаар түстө. Алар бакма чокконун тукум башысы саналат.

Бегемоттор тропик Африкада тараалган.

Сыңар туяктуулар түркүмү. Бул жаныбарлардын буттарында бирден же үчтөн манжалары болот, бирок алардын үчүнчүсү гана жакшы өрчүлгөн. Жаныбарлардын денесинин салмагы негизинен ошол манжага түшөт. Карыны жөнөкөй түзүлгөн, бирок сокур ичегисинин өсүндүсү абдан узун болот.

Сыңар туяктуулар ачыкта жашай турган жаныбарлар болуп, аларга жылкы, эшек, керик, тапир жана куландар кирет (114-сүрөт).



114-сүрөт. Сыңар туяктуулар:

1 – Индия кериги; 2 – Пржевальский жылкысы; 3 – кулан; 4 – зебралар.

Жапайы жылкы – Пржевальский жылкысы XX кылымдын ортолоруна чейин Борбордук Азия (Монголия жана Кытай) чөлдөрүндө жашаган; учурдаө корук жана зоопарктарда гана сакталып калган. Дене узундугу 230 см, бою 130 см, салмагы 300 кг келет. Бакма жылкы кырылып кеткен жапайы жылкы – тарпандан, бакма эшек Африка жапайы эшегинен келип чыккан.

Тапирлердин бир нече түрлөрү Түштүк Америкадагы жана Түштүк-Чыгыш Азиядагы токайлордо жашайт. **Керик** тропик Африкада жана Түштүк Азияда тараган.

1. Туяктуу сүт эмүүчүлөр кандай түзүлгөн?
2. Ача туяктууларга мүнөздүү белгилер кайсылар?
3. Кепшөөчүлөрдүн карыны кандай түзүлгөн?
4. Кепшебөөчү ача туяктуулар кандай түзүлгөн?
5. Сынар туяктуулар чөйрөсүнө кандай ылайыкташкан?



1. Кепшөөчүлөрдүн карынында:
 - а) азық микроорганизмдердин таасиринде эрийт;
 - б) азық кайра чайналат (кепшелет);
 - в) өсүмдүктүн клетчаткасы эрийт.
2. Бухара бутусу:
 - а) Гисар коругунда өстүрүлөт;
 - б) Зерафшан коругунда өстүрүлөт;
 - в) Кызылкум коругунда өстүрүлөт.
3. Сынар туяктуулардын:
 - а) биринчи жана үчүнчү манжалары күчтүү өрчүгөн;
 - б) сокур ичегисинин өсүндүсү узун болот;
 - в) карыны эки камерадан турат.

Жаныбар жана анын өзгөчөлүктөрүн жуптал жаз.

- | | |
|------------|---------------------------------|
| а) жайрен; | 1) коруктарда гана калган |
| б) хангул; | 2) бакма жылкынын тукум башысы; |
| в) донуз; | 3) камыш зарда кездешет; |
| г) тарпан. | 4) чөлдөрдө жашаган. |

Сөздүк дептерине жазып ал.

Ача туяктуулар, кепшөөчүлөр, жайрен, хангул, кепшебөөчүлөр, донуз, ача туяктар, Пржевальский жылкысы, тарпан, керик.



Суроого жооп тап. Сынар туяктуулардын туягынын өрчүгөндүгү жана буттарынын узун болушу алар жашоосунун кайсы өзгөчөлүктөрү менен байланыштуу болушу мүмкүн?

Туура жооптор: 1а, 2в, 3б.

Туура жуптуктар: а-4, б-1, в-3, г-2.

58-§

Приматтар түркүмү. Сүт эмүүчүлөрдүн мааниси

Приматтар, же маймылдар – сүт эмүүчүлөрдүн арасынан эң жогорку түзүлүштөгү жаныбарлар («приматтар» сөзү да «алгачкылар» деген маанини билдириет). Бул түркүмгө 200 дөн ашуун түр кирет. Көпчүлүгү калың тропик токойлордо жашашат. Манжалары узун, эки бутундагы баш манжалары калган манжаларга карма-каршы жайлышкан. Манжалардын мындайча жайлашуусу аларга бутактарды бекем кармоо жана майда нерселерди кармап туруу мүмкүнчүлүгүн берет. Алардын манжаларында башка жаныбардыкы сыйктуу ченгел эмас; жазы тырмактары болот. Буттары жүрүү менен бирге азыкты кармоо, жүндөрүн тазалоо жана тароо милдеттерин да аткарат. Бетинде жана кол-буттарынын алакандарында жүнү болбойт.

Маймылдардын көздөрү башынын алдыңкы жагында жайлышкандыктан алар эки көзү менен тең карашат. Ошондуктан алар буюмдардын көлөмүн, ага чейин болгон аралыкты жана түстү башка жаныбарларга салыштырмалуу өтө мыкты баамдашат. Көздүн мындай касиети бутактан-бутакка секирип жашаган маймылдар үчүн айныкса чоң мааниге ээ. Манжалары, жүнсүз алакандары жана таманы негизги сезүү органдары саналат.

Баш мәэси башка сүт эмүүчүлөрдүкүнө караганда кыйла ири. Баш мәэ чоң жарым шарларында бырыштардын көп болушу себептүү жүрүм-туруму да татаал жана көп түрдүү болот. Алар үйүр болуп жашашат. Күчтүү эркеги үйүргө жетекчилик кылат.


Тропик Америкада жашаган маймылдардын таноолору жазы, кийругу узун болгондуктан аларга жазы мурундуу маймылдар дейилет. Алар кийруктары менен куду буттары сыйктуу дарактын бутагында асылып туршу мүмкүн. *Жөргөмүш маймыл* узун буттары менен колдорунун жардамында дарактарга илешип алгандыктан ушундайча аталып калган.

Африка жана Түштүк Азияда жашаган кууш мурундуу маймылдардын мурун таноолору кууш болуп, кемирчек тосмо менен экиге бөлүнгөн; кийругу даракта асылып жүрүүдө мааниге ээ эмес. Айрым түрлөрүнүн кийругу кыска же таптакыр болбойт.

Приматтардын арасынан адам сымал маймылдар эң ириси жана

жогорку түзүлүштө. Аларга Африкада жашаган *горилла* жана *шимпанзе*, Калимантан жана Суматра аралдарында тараплан *орангутанг* кирет (115-сүрөт). Алардын күйругу болбойт; алдыңкы буттары жана манжасынын арт жагына бир аз таянган абалда арткы буттарында аракет жасайт. Баш мәэси күчтүү өрчүгөндүктөн, жүрүм-туруму да татаал. Эсте сактоосу күчтүү, жөнөкөй эмгек куралдарын жасай алат жана алардан пайдаланууну билет. Шимпанзе жыгач жардамында жапайы аары уясындагы жылчыктарды кенитет; даректан сыйндырып алыш, жалбырагынан тазаланган чыбык менен тар жылчыктардан күрт-кумурска жана алардын личинкаларын чукуп алат, ичке жыгач менен тишин тазалайт. Бет булчундары жардамында өздөрүнүн ички сезимдерин: коркконду, ачууланганды, канаттанганды ж. б. билдириет. Бул жагынан алар адамдарга окшойт.

Сүт эмүүчүлөрдүн мааниси. Чөп жечүү сүт эмүүчүлөрдүн өсүмдүктөрдүн жана башка жаныбарлардын жашоосундагы мааниси чоң. Алардын кыгы кыкчыл конуздар, чиркейлер, сөөлжандар, жер дүлөйлөр жана бактериялар үчүн азық болот. Кык чиригенде то-пурак өсүмдүктөр үчүн азық заттарга байыйт. Тыйын чычкандар, токой келемиштери, талаа чычкандары, донуздар жана башка сүт



115-сүрөт. Приматтар:

- 1 – жашыл мартышка; 2 – гиббон; 3 – ак мандай капуцин; 4 – шимпанзе;
5 – горилла; 6 – орангутанг.

эмүүчүлөр өсүмдүктөрдүн уруктарын таралуусуна жардам беришет. Топуракта жашаган сүт эмүүчүлөр (момолой, сары чычкан) ийин казып, топуракты жумшартышат. Курт-кумурскаларды кырат. Жырткычтар ооруга чалдыккан жаныбарлар жана алардын тарпы менен тамактангандыктан табигый санитарлар болуп эсептелет.

Сүт эмүүчүлөр адамдын жашоосунда чоң мааниге ээ. Жапайы сүт эмүүчүлөргө мехи (ондатра, түлкү) жана эти (бөкөн) үчүн аң уланат. Сүт эмүүчүлөрдөн келемиштер, чычкандар, сары чычкандар тамак-аш продуктуларын жеп же оору таратып, зиян келтириет. Жырткыч сүт эмүүчүлөр чүчөк курттарды таратат.

Баалуу саналган, аз калган же жоголуп бара жаткан сүт эмүүчүлөрдү сактап калуу максатында атайын коруктар түзүлөт; алардын тизмеси “Кызыл китеңке” киргизилет. Өзбекстандын “Кызыл китебине” сүт эмүүчүлөрдүн 24 түрү киргизилген.



1. Приматтардын жогорку түзүлүш белгилери кайсылар?
2. Кууш мурундуу маймылдар кандай жашашат?
3. Жазы мурундуу маймылдар каерлерде таралган?
4. Адам сымалдардын адамга окшош белгилери кайсылар?
5. Сүт эмүүчүлөр кандай мааниге ээ?



1. Баш манжанын башкаларына карама-каршы жайлашканы:
а) жүндөрүн тазалоо мүмкүнчүлүгүн берет;
б) майда нерселерди кармап туруу мүмкүнчүлүгүн берет;
в) бутактан-бутакка секирип өтүүгө жардам берет.
2. Маймылдардын манжалары, алаканы жана таманы:
а) негизги сезүү органдары болуп саналат;
б) жүргөндө таянычтын милдетин аткарат;
в) негизги кармоочу органдары болуп эсептелет.
3. Маймылдар негизинен тропиктик токойлордо:
а) жуп-жуп болуп жашашат;
б) башка жаныбарлар менен бирге жашашат;
в) үйүр болуп жашашат.



Маймыл менен ал таралган жердин аттарын жуптап жаз.

- | | |
|---------------------|----------------------------------|
| а) жөргөмүш маймыл; | 1) Суматра, Калимантан аралдары; |
| б) горилла; | 2) тропик Америка; |
| в) орангутанг. | 3) тропик Африка. |

Сөздүк дептериңе жазып ал.

Приматтар, кууш мурундуу маймылдар, жазы мурундуу маймылдар, жөргөмүш маймыл, орангутанг, шимпанзе, горилла.



Суроого жооп тап. Адам сымал маймылдар жашоосунун кайсы өзгөчөлүктөрү адамдарга оқшоп кетет?

Туура жооптор: 1б, 2а, 3в.



Туура жуптуктар: а-2, б-3, в-1.

59-§ Сүт эмүүчүлөр классындагы айыл чарба жаныбарлары

Мал чарбачылыгы калкты тамак-аш продуктулары (сүт, эт, май жана башкалар), женил өнөр жайды чийки заттар (жұн, тери, мех), айыл чарбасын әмгек жаныбарлары (жылкы, өғүз, әшек, теө) жана органикалык жер семирткичтер менен камсыз қылат.

Бодо мал. Азыркы бодо малдар байыркы Азия жана Европа материктеринде кенири тараплан, мындан 3–4 кылым мурда кырылып кеткен турдан келип чыккан. Акыркы тур 1627-жылы Польшада өлгөн. Тур биздин эрадан 7000 жыл мурда Грецияда колго үйрөтүлгөн. Бодо малдын породалары чарбачылыкта пайдалыну өзгөчөлүктөрүнө карай үч негизги топко: сүт, эт-сүт жана эт багытындагы породаларга бөлүнөт (116-сүрөт).

Сүттүү породалар бодо малдардын негизги бөлүгүн түзөт. Өзбекстанда *Кара чаар Холмогор*, *Ярославль* породалары, *Кызыл талаа*, *Бушуев* жана башкалар багылат. Алар жылына 4000 л, айрымдары 6000 л жана андан көп сүт берет. Эт-сүт багытындагы породалар көп сүт берүү менен бирге эткээл жана эти даамдуу келет. Швейцариянын *Симменталь*, Россиянын *Кострома* породалары эт-сүт



116-сүрөт. Сүттүү бодо мал породалары:
1 – Холмогор породасы; 2 – Ярославль породасы.

багытындагы порода саналат. Симменталь породосы жылына 4000 л ге чейин сүт берет. Эт багытындагы породалар негизинен эт үчүн өстүрүлөт. Салмагы жана бат жетилиши менен сүттүү породалардан жогору турат. Эттүү Шортгорн зоот уюнун орточо салмагы 650 кг, букаларыныкы 1000 кг дан да көп. Букачалардын салмагы бир суткада 1 кг га көбөйөт. Өзбекстанда *Швииц, Казакстан ак башы, Санта-Гертруда, Герефорд* жана *Шортгорн* породалары өстүрүлөт.

Бодо малдардан сүт жана эт менен бир катарда тери да алынат. Териден бут-кийимдер, тери-галантарея буюмдары жасалат. Күшканалардагы калдыктарынан ар түрдүү препараттар, клей, самын жана башка продуктулар өндүрүлөт.

Кой чарбасы. Койлор жапайы кой – муфлондордон келип чыккан. Койлор мындан 8 мин жыл илгери колго үйрөтүлгөн. Койлор жүнүнүн сапатына карай ичке жүндүү, орточо жүндүү жана кылчык жүндүү породаларга бөлүнөт (117-сүрөт).

Ичке жүндүү койлордун жүнү бирдей узундуктагы (8–10 см) тыбыттан турат. Ичке жүндөн (руно) назик кездемелер токулат. Түндүк Кавказда, Волга боюнда жана Казакстанда өстүрүлгөн *меринос* породасынан 10–12 кг ичке жүн алынат.

Кылчык жүндүү койлордун жүнү кылдан жана тыбыттан турат. Бул койлор да өз кезегинде тулупка жарактуу тери, каракөл көрпө, эт-май жана эт-жүн багытындагы породаларга бөлүнөт. Романов породасындагы койлор тулуп үчүн эң жакшы тери берет. Каракөл көрпөсү 1–3 күндүк козулардын терисинен алынат. Каракөл көрпө




117-сүрөт. Койдун породалары:
1 – каракөл кою жана анын козусу; 2 – Гисар кою.

көбүнese кара түстө болот; көк күрөн, сур, ак жана башка түстөгүлөрү айрыкча жогору бааланат. Эт-май багытындагы койлордон Өзбекстанда *Гисар койлору* өстүрүлөт. Мындей койлордун салмагы 150 кг га, күйргүнүн салмагы 25 кг га барат.

Жылкычылык. Бийик тоолуу жерлерде жана айыл чарбасында жардамчы жумуштарды аткарууда жылкылар негизги жумушчу күч саналат. Ат спорту дүйнөлүк көлөмдө жайылууда. Жылкылар эт жана сүт алуу үчүн да өстүрүлөт. Алардын сүтүнөн дарылык манаге ээ болгон кымыз даярдалат. Жылкылардын канынан дары препараттар жана сывороткалар даярдоодо пайданылат.

Жылкылар биздин эрадан 3000 жыл илгери колго үйретүлгөн. Европанын талааларында мурда жашап, азыркы күндө жок болуп кеткен *тарпандар* бакма жылкылардын теги саналат (118-сүрөт). Жылкылар оор жүк тартуучу, мингич, чегилүүчү (жорго), эт жана



118-сүрөт. Жылкылар:

- 1 – жапайы жылкы – тарпан; 2 – Владимир жылкысы;
- 3 – тасқактуу Орлов жылкысы; 4 – Карабайыр.

кымыз үчүн өрчүтүлүүчү породаларга бөлүнөт. Оор жүк тарткан жылкыларга *Владимир*, мингич жылкылардан Өзбекстанда чыгарылган *Карабайыр*, Тажикистан жана Түркмөнстандын *Лакай*, *Ахалтака* породаларын, чегилүүчү жылкылардан *Орлов* жоргосу менен *Орус жоргосун* көрсөтүүгө болот.

1. Бодо малдар чарбада пайдаланышына карай кандай породаларга бөлүнөт?
 2. Өзбекстанда бодо малдын кандай породалары өстүрүлөт?
 3. Койлордун кандай породалары бар?
 4. Өзбекстанда койлордун кайсы түрлөрү багылат?
 5. Жылкылардан кандай максаттарда пайдаланылат?
 6. Жылкылардын кандай породалары бар?
1. Азыркы бодо малдар биздин эрадан 7000 жыл илгери:
 - а) байыркы Польшада колго үйрөтүлгөн;
 - б) байыркы Европада колго үйрөтүлгөн;
 - в) байыркы Грецияда колго үйрөтүлгөн.
 2. Койлор мындан 8000 жыл мурда:
 - а) колго үйрөтүлгөн муфлондон келип чыккан;
 - б) колго үйрөтүлгөн алкардан келип чыккан;
 - в) байыркы Индияда колго үйрөтүлгөн.
 3. Жылкылар мындан 3000 жыл илгери:
 - а) бакма Пржевальский жылкысынан келип чыккан;
 - б) колго үйрөтүлгөн тарпандан келип чыккан;
 - в) колго үйрөтүлгөн куландан келип чыккан.

Бодо мал породаларын алардын багыты менен жуптап жаз:

- | | |
|------------|--------------------------|
| а) сүт; | 1) Кострома, Симменталь; |
| б) эт; | 2) Кара чаар, Бушуев; |
| в) эт-сүт. | 3) Шортгорн, Швиц. |

Сөздүк дептериңе жазып ал.

Бодо мол, мал чарбасы, кой чарбасы, каракөлчүлүк, жылкы чарбасы, мингич ат, тур, муфлон, тарпан.

Табышмактар кайсы жаныбарларга тиешелүү?

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 61. Чарба ичинде шайтан, | 62. Күндүзү чөп жемек, |
| Сакалы узун султан. | Кечинде сүт бермек. |
| | |
| 63. Адамдардын жан досу, | 64. Кулагы узун — коён эмес, |
| Дан тараткан жоргосу. | Төрт түяктуу — ат эмес. |

Туура жооптор: 1в, 2а, 3б.

Туура жуптуктар: а-2, б-3, в-1.

Табышмактардын жооптору

- | | | |
|--------------------------------|----------------------|--|
| 1. Кадимки амёба. | 22. Конуздар. | 44. Жумуртка. |
| 2. Жашыл эвглена. | 23. Кык конузу. | 45. Жумуртка. |
| 3. Вольвокс. | 24. Чегиртке. | 46. Колибри. |
| 4. Инфузория туфелька. | 25. Көпөлөк. | 47. Чабалекей. |
| 5. Түзсуз суу гидрасы. | 26. Көпөлөк. | 48. Сагызган. |
| 6. Медуза. | 27. Тыт жибек курту. | 49. Булбул. |
| 7. Планария. | 28. Бал аарылар. | 50. Чабалекийедин уясы жана балапандары. |
| 8. Боор курту. | 29. Бал аары. | 51. Илегилек. |
| 9. Бодо мал тасма сымал курту. | 30. Кумурскалар. | 52. Короздор. |
| 10. Киши аскаридасы. | 31. Кумурскалар. | 53. Короз. |
| 11. Сөөлжан. | 32. Чиркей. | 54. Короз. |
| 12. Сөөлжан. | 33. Бүргө. | 55. Кирпи. |
| 13. Жыланач үлүл. | 34. Балык. | 56. Жарганат. |
| 14. Тишсиз. | 35. Балык. | 57. Чычкан. |
| 15. Тишсиз. | 36. Бака. | 58. Коён. |
| 16. Дарыя рагы. | 37. Курбака. | 59. Мышик. |
| 17. Дарыя рагы. | 38. Жылан. | 60. Жолборс. |
| 18. Ала жөргөмүш. | 39. Жылан. | 61. Эчки. |
| 19. Чаян. | 40. Жылан. | 62. Уй. |
| 20. Жашыл конуз. | 41. Жылан. | 63. Жылкы. |
| 21. Курт-кумурскалар. | 42. Таш бака. | 64. Эшек. |
| | 43. Таш бака. | |

Зоология терминдеринин көрсөткүчү (*-сүрөттөргө шилтеме)

- Африка төө күшү 158*
Актиниялар 27, 28*
Акулалар 115*
Аллигаторлор 137
Арстан 184, 185*
Аркар 191*
Археоптерикс 151, 152*
Аурелия 28*, 29
Амёба 13
Акыра 5*, 191*
Аскарида 38*, 39*
Айры күйрүк 163*
Ач күзөн 185
Алма мөмөчүлү 94*
Аралык ээси 35, 37, 41
Азия чегильтекеси 83*, 94
Ак амур 118*
Ак аюу 185, 186*

Ак капитал дельфин 188*, 189
Ак күү 154
Ак сла 118, 119
Ак бальк 118*
Бал аары 88, 89*, 90
Банкив тооктору 166*
Безек митеси 19*
Безек чиркейи 95*
Биологиялык күрөш 95, 96
Битиния 50*
Биттер 95*
Бий 70
Балдар чүчөк курту 42
Баткак ташбакасы 135*, 137
Бройлер 167
Булбул 153
Бүргөлөр 95*
Бөкө 92*

Бертме нематодасы 42
Бейён 70*
Бакалоорлор 54, 57, 62, 107*
Бекен 6, 191*
Боор курту 34, 35*
Бака 121*-123
Бакткетер 154, 157
Бегемот 192*
Баштыкчалуу карышкыр 179
Баштыкчалуулар 178, 179
Баштыкчалуу чычкан 178*, 179
Боз келемиш 182*
Бут тинтүүрлөрү 67
Бодо мал тасмасы 35, 36*
Вольвокс 16*
Гавиалдар 137
Геккон 132

- Гиббон 195*
 Гидра 23*, 24*
 Гидроид полиптер 21
 Гигант акула 116
 Гепард 184, 185*
 Гермафродит 31, 33
 Горилла 195*
 Гренландия тюлени 187*
 Гүл май 118
 Гусеница 80*, 81*
 Дафния 65*
 Дардагай сары жарганат 180*
 Дениз тайчасы 113*
 Дениз ташбакасы 137
 Дрейсене 59*
 Донуз 191, 192*
 Енот сымал ит 184*
 Европа туру 6
 Ехидна 178*
 Жаян балық 118*
 Жылуу кандуулар 9,
 Жору 163*
 Жалган күрөк түмшук 117*
 Жалган буттуулар 11, 13
 Жумуртка туучулар 179
 Жумуртуу күрттар 38, 39
 Жыланач үлүл 55*
 Жашыл бездер 64
 Жашыл конуз 70*, 71*
 Жашыл эвглене 15*, 16*
 Жырткыч тиштүү кескелдириктер 176*
 Жарганат 150*
 Жарганаттар 180
 Жүзүм үлүлү 55*
 Жөжөлүү канаттуулар 151
 Жолборс 184, 185*
 Заргалдак 153
 Зебралар 192*
 Зигота 26
 Зубр 6, 191*
 Ийнелик 82
 Ийнеликтер 82, 83*
 Илбирс 184
 Император пингвини 161
 Инфузориялар 19*
 Инди кериги 192*
- Илегилек 143, 147*, 148, 155
 Ийик сымал кескелдирик 132
 Кета 112, 118
 Карышырлар 183, 184*
 Кашкулак 185
 Кекилик 153
 Кальмар 59*
 Камчатка крабы 65*
 Кенелер 71
 Капуцин 195 *
 Кобра 5*, 134*
 Каракатица 59*
 Капуста көпөлөгү 47*, 86
 Каркурлар 149
 Касатка 189*
 Кайра 150
 Кашалот 188*, 189
 Кемирүүчүлөр 181, 182*
 Кенгуру 178*, 179
 Кета 112, 118
 Кит акула 116
 Коала 178*, 179
 Колорадо конузу 94*
 Коралл полиптери 27, 28*
 Креветкалар 65*
 Күрп167
 Көө 95
 Көлбар жылан 133
 Көк кит 5*, 182*
 Көк суур 182*
 Карга 149, 156*
 Кунас 149, 154*, 161
 Күйкө 163*
 Курт 34, 35*, 36*, 41, 42
 Көк ийнелик 82
 Кадимки амёба 11*, 13*
 Калкан түмшук жылан 134*
 Карга 151
 Каргалар 149
 Кызыл китең 6, 158
 Кыргый 163*
 Кызыл төш 150*
 Кыргоол 153
 Кара балық 118
 Кара жылан 133*, 134*
- Кара айры күйрук 163*
 Кара күрт 70*
 Кара чыйырчык 153
 Кара чыртылдак 83*
 Кум буума жыланы 133
 Кундуз 185
 Курт 80*, 81*
 Кол канаттар 180
 Күрөн аюу 185, 186*
 Корук 6
 Кооз ийнелик 82*
 Кадимки түнчүл жарганат 180*
 Куркулдай 150*
 Курбака 128
 Кантала 83*, 95
 Каптал сыйыктар 102*, 110
 Көк чымчык 153, 156*
 Көлчүкчү үлүл 53*, 54
 Лещ 118
 Лангусттар 65
 Ланцетник 98*, 99, 100
 Латимерия 118
 Латча 185
 Лейшмания 16
 Лосось сымалдар 118
 Морж 187*, 188
 Медуза 28*, 29
 Мальпиги түтүкчөлөрү 77*
 Манта 115*
 Мантис 53, 54, 57
 Мартышка 195*
 Майна 153
 Маймылдар 195
 Медузалар 28*, 29
 Мидия 59*
 Миссисипи крокодили 137*
 Мите 95
 Мозаикалуу көрүү 65
 Морж 187*, 188
 Май балық 118
 Муфлон 198
 Мурутчан балық 118
 Манжа канаттар 118, 128
 Муздак кандуулар 9.
 Медицина сүлгүү 51*

- | | | |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Негизги кожоюн 35, 37, 41 | Стеллеров ую 6 | Үй чычканы 182* |
| Нанду 158 | Така түмшүк 180* | Финна 36, 41, 42 |
| Нереида 50* | Тарпан, 6, 194* | Фораминифералар 13 |
| Нил крокодили 137* | Ташбака 136*, 137 | Хангул 6 |
| Нозема 19 | Термиттер 83, 95 | Хасва 83 |
| Норка 185 | Тикен балык 113* | Хордалуулар 9, |
| Нутрия 181 | Тикен күйрүк скат 115* | Циклоп 24, 42, 65* |
| Ным курту 65* | Тикендүү акула 115 | Циста 13, 15, 34 |
| Осетралар 117* | Тилярия 114 | Чөл агамасы 132 |
| Окунь 113 | Тирүү туугуч 55* | Чон жарганат 180* |
| Омарлар 65 | Токой мышыгы 184 | Чаар карга 153 |
| Ондатра 181, 182* | Тоок сымалдар 154 | Чабалекей 156* |
| Орангутан 195* | Трахеялар 68*, 69 | Чекилдек айман чегиртке |
| Омурткасыздар 9 | Тридакна 59 | 83* |
| Өрдөк 154, 160* | Трипаносома 16 | Чаян 70*, 71 |
| Өрдөк түмшүк 178* | Тртитондор 128 | Чаар жылан 134 |
| Планария 31, 32*, 33 | Түфелька 18*, 19 | Чөө 184* |
| Планктон 65 | Түлкүлөр 183, 184* | Чымчык 151, 156* |
| Пржевальский аты 6, 192* | Түлөө 62, 130 | Чымчык сымалдар 156 |
| Протоавис 151 | Тыт жибек курту 86*, 87* | Чыйырчыктар, 156* |
| Радиалдуу симметрия 23 | Тотулар 153 | Чөл ташбакасы 136* |
| Регенерация 25, 33, 125 | Тищис 56, 57*, 58 | Чортон 118* |
| Сагызган 156* | Тыйын чычкан 181 | Чочко тасмасы |
| Сары жарганат 180* | Тондуулар 179 | Шамдагай кескелдирик 129, |
| Сегиз аяк 59* | Тоодак 158* | 130* |
| Саламандралар 128 | Торгой 153 | Нурлуулар 13 |
| Сары жалын 132 | Таан 156* | Шакылдак жылан 133 |
| Сары чычкан 182* | Талаа бактеги 160* | Шимпанзе 195* |
| Суксун 160* | Уялтуу канаттуулар 151 | Эктодерма 24* |
| Суу жылан 133 | Улуттук парк 6 | Электр скат 116 |
| Сүусар 185 | Угор 112 | Эму 158 |
| Соно 92* | Устрица 59* | Эндодерма 24* |
| Сур коён 182* | Үүл медузасы 28*, 29 | Эхинококк 41* |
| Сүлөөсүн 184 | Үкү 163*, 164 | Эчки эмээр 132 |
| Сазан 102*, 103* | Күкүк 150 | Этчили жашыл чымын 92* |
| Систематика 9, | Үй чымыны 90, 91* | Ягуар 185* |

МАЗМУНУ

Алгы сөз	3
1 ГЛАВА. Жаныбарлар дүйнөсү жөнүндө жалпы маалымат	4
1-§. Зоология предмети жана анын милдеттери	4
2-§. Жаныбарлар организминин түзүлүшү, алардын классификациялоо	7
2 ГЛАВА. Бир клеткалуулар, же эң жөнөкөй жаныбарлар	11
3-§. Жалган буттуулар классы	11
4-§. Шапалактуулар классы	14
5-§. Инфузориялар жана споралуулар классы	18
1-лабораториялык машигүү. Туфельканын түзүлүшү, кыймылды жана дүүлүгүшү	21
3 ГЛАВА. Көп клеткалуу жаныбарлар: ичеги-көндөйлүгүлөр тиби	23
6-§. Гидроиддик полиптер классы: түзсүз суу гидрасы	23
7-§. Дениз ичеги-көндөйлүгүлөрү	27
4 ГЛАВА. Жалпак жана жумуру курттар типтери	31
8-§. Жалпак курттар тиби: кирпичелүү курттар классы	31
9-§. Жалпак курттар тиби: соргучтуулар классы жана тасма сымал курттар	34
10-§. Жумуру курттар тиби: киши аскаридасы	38
11-§. Мите курттардын көп түрдүүлүгү	41
5 ГЛАВА. Муунактуу курттар тиби	45
12-§. Сөөлжандын тышкы түзүлүшү, нерв системасы жана өрчүшү	45
13-§. Сөөлжандын ички түзүлүшү	48
2-лабораториялык машигүү. Сөөлжандын тышкы түзүлүшү жана рефлекс пайда кылышы	52
6 ГЛАВА. Моллюскалар тиби	53
14-§. Курсак буттуу моллюскалар классы	53
15-§. Кош капкалуу жана баш буттуу моллюскалар класстары	56

7 ГЛАВА. Муунак буттуулар тиби	60
7.1. Рак сымалдар классы	60
16-§. Дарыя рагынын тышкы түзүлүшү жана көбөйүшү	60
17-§. Дарыя рагынын ички түзүлүшү	63
7.2. Жөргөмүш сымалдар классы	66
18-§. Ала жөргөмүштүн түзүлүшү жана жашоосу	66
19-§. Жөргөмүш сымалдардын көп түрдүүлүгү	70
7.3. Курт-кумурслар классы	73
20-§. Жашыл жалтырак конуздун тышкы түзүлүшү	73
21-§. Жашыл конуздун ички түзүлүшү	76
3-лабораториялык машыгуу. Курт-кумурскалардын тышкы түзүлүшү	79
22-§. Курт-кумурскалардын көбөйүшү, өрчүшү	79
23-§. Толук өзгөрбөй өрчүгөн курт-кумурскалар	82
24-§. Толук өзгөрүп өрчүгөн курт-кумурскалар: кабырчык канаттар түркүмү	85
25-§. Жаргак канаттар түркүмү: бал аарылар	88
26-§. Кош канаттар түркүмү	91
27-§. Курт-кумурскалардын келип чыгышы жана мааниси	94
8 ГЛАВА. Хордалуулар тиби	98
28-§. Ланцетник – төмөнкү түзүлүштүү хордалуу жаныбар	98
8.1. Балыктар	101
29-§. Тышкы түзүлүшү, скелети, сүзгүч тарсылдагы	101
4-лабораториялык машыгуу. Балыктардын тышкы түзүлүшү жана кыймыл-аракети	105
30-§. Балыктардын ички түзүлүшү	106
31-§. Нерв системасы жана сезүү органдары	109
32-§. Балыктардын көбөйүшү жана өрчүшү	112
33-§. Балыктардын көп түрдүүлүгү: кемирчектүү балыктар классы	114
34-§. Сөөктүү балыктар классы: негизги системалык топтору жана мааниси	117
8.2. Жерде-сууда жашоочулар классы	120
35-§. Сүү бакасынын тышкы түзүлүшү, скелети	120
36-§. Баканын ички түзүлүшү	123
37-§. Жерде-сууда жашоочулардын көбөйүшү, өрчүшү жана көп түрдүүлүгү	126

8.3. Сойлоп жүрүчүлөр классы	129
38-§. Шамдагай кескелдириктин түзүлүшү, көбөйшү жана өрчүшү	129
39-§. Сойлоп жүрүчүлөрдүн көп түрдүүлүгү:	
кабырчыкуулар түркүмү	133
40-§. Таш бакалар, крокодилдер түркүмдөрү	136
8.4. Канаттуулар классы	139
41-§. Көк көгүчкөндүн тышкы түзүлүшү	139
42-§. Көк көгүчкөндүн скелети, булчундары	142
5-лабораториялык машигуу. Канаттуулардын тышкы түзүлүшү жана күш жүндөрү	145
43-§. Канаттуулардын ички түзүлүшү жана сезүү органдары	146
44-§. Канаттуулардын көбөйшү, өрчүшү жана келип чыгышы	149
45-§. Канаттуулардын сезондук кубулуштарга ылайыкташуусу	153
46-§. Канаттуулардын көп түрдүүлүгү:	
оазис жана чөл канаттуулары	156
47-§. Суу жана жәэқ канаттуулары	159
48-§. Жырткыч канаттуулар	163
49-§. Канаттуулар чарбасы	166
8.5. Сүт эмүүчүлөр классы	168
50-§. Бакма иттин тышкы түзүлүшү, скелети жана булчундары	168
51-§. Иттин ички түзүлүшү	171
52-§. Сүт эмүүчүлөрдүн көбөйшү, өрчүшү жана келип чыгышы	175
53-§. Сүт эмүүчүлөрдүн түрлөрү: жумуртка туучулар, баштыкчалуулар, тондуулар	177
54-§. Колканаттар жана кемирүүчүлөр түркүмдөрү	180
55-§. Жырткыч сүт эмүүчүлөр түркүмү	183
56-§. Дениз сүт эмүүчүлөрү: калак буттуулар жана кит сымалдар түркүмдөрү	187
57-§. Туяктуу сүт эмүүчүлөр	190
58-§. Приматтар түркүмү. Сүт эмүүчүлөрдүн мааниси	194
59-§. Сүт эмүүчүлөр классындагы айыл чарба жаныбарлары	197
Табышмактардын жооптору	201
Зоология терминдеринин көрсөткүчү	201

УЎК:59=811.512.154

28.6

M13

M13

Мавланов О.

Зоология 7-класс: жалпы билим берүүчү мектептердин 7-классы үчүн окуу китеbi/О. Мавланов. - Ондолгон жана толукталган экинчи басылышы - Ташкент.: «O'zbekiston milliy ensiklopediyasi» Мамлекеттик илимий басма үйү, 2017.-208 б.

КБК 28.6ya72

Ochil Mavlonov

Zoologiya

Umumiy o'rta ta'lif mакtablarining
7-sinfi uchun darslik

Qirg'iz tilida

«O'zbekiston milliy ensiklopediyasi»
Davlat ilmiy nashriyoti
Toshkent, 2013

Которгон
Редактору
Компьютерде
даярдаган
Корректор

А. Зулпихаров
А. Зулпихаров
У. Сапаев
А. Анваржонова

Басууга уруксат этилди 10.08.2017. Форматы. 70x90 1/₁₆
«Таймс» гарнитурасы, 11 кегл. Шарттуу басма табагы 15,21.
Басма табагы 15,17.762 нускада басылды. Заказ № 13-119

«O'zbekiston milliy ensiklopediyasi» Мамлекеттик илимий басма үйү.
Ташкент, 100011, Навоий көчөсү, 30.

Өзбекстан басма сөз жана маалымат агенттиги
«O'zbekiston» басма-полиграфиялык чыгармачылык үйүнүн
басмаканасында басылды. Ташкент, 100011, Навоий көчөсү, 30-үй.

Ижарага берилген окуу китебинин абалын көрсөтүүчү жадыбал

№	Окуучунун аты, жөнү	Окуу жылы	Китептин алынгандагы абалы	Класс жетекчи-синин кол	Китептин тапшырылгандыгы абалы	Класс жетекчи-синин колу
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Окуу китебин ижарага бергенде жана окуу жылынын аягында кайтарып алганда жогорудагы жадыбал класс жетекчиси тарабынан баалоонун төмөнкү критерийлеринин негизинде толтурулат

Жаңы	Окуу китебин пайдаланууга алгачкы жолу берилгендеги абалы
Жакшы	Мукабасы бүтүн, китептин негизги бөлүгүнөн ажырабаган. Бардык барактары бар, жыртылбаган, көчпөгөн, беттеринде жазуу-чийүүлөрү жок.
Канааттандырлык	Мукабасы ээзилген, бир аз чийилип, беттери тытылган, китептин негизги бөлүгүнөн ажыраган түрү бар, пайдалануучу тарабынан канааттандырларлуу ремонттолгон. Көчкөн барактары кайра ремонттолгон, айрым беттери чийилген.
Канааттандырсыз	Мукабасына чийилген, ал жыртылган, негизги бөлүгүнөн ажыраган же таптакыр жок, канааттандырсыз ремонттолгон. Беттери жыртылган, барактары жетишпейт, чийип, боёп ташталган, окуу китебин калыбына келтириүүгө болбойт.